




5.7.246

5.6.71

T. 9.



LEZIONE
DI FISICA
SPERIMENTALE.

1.2

1.2

LEZIONI
DI FISICA
SPERIMENTALE

DEL SIGNOR
ABATE NOLLET,

DELL' ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI PARIGI
DELLA SOCIETA' REALE DI LONDRA
DELL' ISTITUTO DI BOLOGNA
E MAESTRO DI FISICA DI S. A. R.

IL DELFINO.

TRADOTTE DAL FRANCESE.

TOMO SECONDO.

Libreria de' PP. Minori di S. Giuseppe di France



IN VENEZIA, MDCCLI.

Presso GIAMBATISTA PASQUALI.

Con Licenza de' Superiori.

Extrait de la correspondance de M. de la Harpe



LEZIONI

DI

FISICA SPERIMENTALE.



LEZIONE V.

Sopra il Moto composto, e sopra le Forze centrali.

PRIMA SEZIONE.

Del Moto composto.

Chiamaſi *Moto composto*, quello d'un corpo determinato a muoverſi da più cagioni o potenze, le quali operano ſecondo direzioni differenti; tal è, eſempigravia, il moto d'un battello, che mantienſi nella direzione del canale A B, e ubbidisce nello ſteſſo tempo alle due potenze C, D, *Figura 1.*

Siccome il moto ſemplice ha le ſue leggi, coſì ha le ſue ancora il moto composto; e poſſono tutte riferirſi ad una ſola, la quale è annunciata

A 3 nella

6 LEZIONI DI FISICA

nella Proposizione seguente, e della quale elleno son tutte conseguenze.

Legge del Moto composto.

Quando un corpo è messo in moto da più potenze che operano nel medesimo tempo, e secondo differenti direzioni, o stassene in equi'librio, ovver piglia un moto che seguita la proporzione o relazione che hanno tra loro le potenze per la velocità; e riceve una direzione media tra quelle delle potenze, alle quali ubbidisce.

Imperocchè quando due potenze oprano nel medesimo tempo sopra un mobile, o elle sono direttamente opposte come A, E, Fig. 2. ovver le loro direzioni fann'angolo insieme, come B M, ed F M, C M, e G M, ec. poichè se si unissero, come si vede in N, egli è evidente, che concorrerebbono nella medesima direzione, e ne risulterebbe un moto semplice, la cui velocità sarebbe il prodotto delle due forze: di maniera che se l'una delle due fosse capace di tirare o di spingere il corpo M in N, ambedue insieme che suppongonsi eguali, lo farebbono andare sino in K.

Se le due potenze sono opposte nella medesima linea, il mobile sopra il quale elleno adoperano, rimane in equilibrio fra esse, in caso d'egualità; imperocchè non è possibile ch'egli vada nello stesso tempo a destra e a sinistra; e perchè volgerebbersi egli piuttosto a una parte che all'altra, se dall'una prova tanta resistenza, quanta soffre impulsione dall'altra?

Ma se le potenze sono ineguali, il mobile ubbi-

S P E R I M E N T A L E. 7

bidisce alla più forte delle due, secondo la lorò differenza; vale a dire, che se E è verso *a* come 3 è verso 2, il corpo M ubbidisce alla prima, come se il suo valore fosse 1, differenza di 3 e 2. Così essendo le potenze direttamente contrarie, ne risulta o la quiete, od il moto semplice, ma ritardato.

Quando le potenze sono dirette in tal maniera che facciano angolo, o (ch'è la stessa cosa) che le lor direzioni s'incrocicchino nel mobile, come B*b*, F*f*, allora il moto si compone in velocità e in direzione, e l'una e l'altra si misura per la diagonale del parallelogrammo, co' lati del quale sono espresse le potenze. Spiegheremo ciò, considerando separatamente nella Fig. 3. le due potenze C, G, ed il mobile M della Fig. 2.

Supponiamo dunque, che il corpo M sia tirato nel medesimo tempo da due forze C, G, che noi facciamo eguali esprimendole con due linee della medesima lunghezza; che ciascuna di queste linee sia divisa in sei spazj eguali, e distinti con cifre e con lettere. Immaginiamoci, che CM sia un regolo, sul quale si fa il moto dall'insù all'ingiù, mentre esso regolo si muove parallelamente a se stesso sulla linea MG. Egli è certo, che essendo il regolo mobile pervenuto alla cifra 2, della linea MG, il corpo M farà disceso d'una pari quantità, è ch'ei non farà nè nel punto 1, nè nel punto *a*, ma in *b*; similmente nel tempo che il regolo giungerà alla cifra 2, il corpo M discenderà ancor uno spazio, e si troverà nel punto K. Lo che continuando sempre all'istesso modo, durante il moto parallelo del regolo sopra MG, si vede che il mobile M averà passato successiva-

8 LEZIONI DI FISICA

mente per tutti i punti della linea Mn diagonale del parallelogrammo MGC , i cui due lati GM , CM , esprimono la relazione delle potenze.

La lunghezza di questa diagonale Mn , dà la velocità del moto composto, che come si vede, non è mai così grande come la somma delle due velocità che la fan nascere: imperocchè Mn non eguaglia MG , e MC prese insieme. E se queste due forze concorressero a spingere il mobile in una medesima direzione, elleno gli farebbono fare più strada di quel che ne fa quando lo sollecitano ad andare verso due punti differenti. Ma mentre così ubbidisce all'una ed all'altra nel tempo medesimo, arriva per una strada più corta al termine delle due tendenze.

Questa medesima linea diventa più corta, secondo che le direzioni delle potenze fanno tra esse un angolo meno acuto, imperocchè nel caso, che queste potenze oprassero secondo le linee HM , DM , Fig. 2: la Diagonale sarebbe MI , più lunga che non fora LM , od OM , se le loro azioni fossero espresse per GM , CM , ovver per BM , FM .

Di tutte le posizioni, che possono prendere tra esse due forze che adoperano nel medesimo tempo sopra un mobile, una sola ve n'ha che rende le loro azioni reciprocamente indifferenti: cioè quando le lor direzioni fanno tra esse un angolo retto, come CM , GM , Fig. 3. Imperocchè quella che opera orizzontalmente, tende a condur il mobile alla distanza G , e gli è indifferente che sia condotto in G , o in N o, in tutt'altro punto preso in questa linea. Parimenti quella che opera verticalmente, esige che il mobile arrivi ad

una

S P E R I M E N T A L E. 9

una distanza eguale ad MC , e questa distanza dall'alto al basso trovasi per tutto nella linea Cn . Così quando l'una e l'altra forza adopera nel medesimo tempo, ciascuna d'esse esercitafi sopra 'l mobile; come se fosse libero dalla parte dell'altra: elleno in sostanza né s'ajutano, né si nuocono.

Ma non è già così, se l'angolo che queste due potenze fanno tra esse, è ottuso o acuto, nel primo caso elleno si distruggono in parte, e nell'altro s'ajutano scambievolmente. Se, per esempio, le due forze fanno fra esse l'angolo RPQ Fig. 5. il mobile viene in S , e la potenza PQ è diminuita della quantità TQ , od St ; ed al contrario, se le potenze sono dirette in tal maniera che facciano tra esse un angolo simile a VXY Fig. 6. il mobile viene in u , e la potenza XY è accresciuta d'una quantità eguale a Zu , o γy ,

La diagonale di cui parliamo, dà pure la direzione del moto composto; imperocchè se si applica a qualunque altro parallelogrammo il raziocinio che fatto abbiamo, quando sonfi per noi supposte le potenze eguali fra esse, come i due lati d'un quadrato perfetto, si vedrà che questa linea non resta egualmente distante dall'una e dall'altra potenza, fuorchè nel caso d'egualità; e che quando le forze sono ineguali fra esse, la diagonale è più inclinata a quella delle due che è la più grande, come veder si può considerando la *Figura 4.*

Da questi principj ne segue, che se si fa l'angolo di direzione delle potenze, ed il loro grado di forza; si conosce altresì l'effetto, ch'elleno debbono produrre sul mobile, cioè il suo grado di

IO LEZIONI DI FISICA

di velocità, e la strada ch'egli dee tenere. Imperocchè vedesi dalle Figure 3, 4. 5. e 6. che se si esprime il valore delle potenze, e la lor direzione con linee che si congiungano da un capo, fondando un parallelogrammo su cotesti due primi Jatti, la diagonale darà quello che si cerca.

Segue in oltre, che se conoscesi l'effetto comune di due potenze sopra un medesimo mobile, e lo stato dell'una delle due, voglio dire la sua direzione ed il suo grado di forza, si può giudicare del valore e della posizione dell'altra. Se io so, per esempio, che un mobile è stato portato da P in S Fig. 5. per l'azione di due forze una delle quali è espressa per PR, tiro la linea SQ parallela e eguale a PR; e terminando il parallelogrammo, vedo che PQ è l'altra potenza maggiore che la prima, e che fa con esso lei l'angolo di direzione RPQ.

Noi verremo qui accoppiando le prove d'esperienza alle spiegazioni ed alle ragioni che abbiamo esposte; e per procedere con ordine, considereremo prima gli effetti di due potenze direttamente contrarie, e vedremo poi come si compone il moto prodotto da due forze, le direzioni delle quali s'incrocicchiano nel centro del mobile.

Supponiamo in oltre che la ragione mutua delle forze resti costante: cioè che per tutto il tempo ch'elleno oprano sopra 'l mobile, non avvenga ad una delle due alcun cambiamento, che la faccia più o men differenziarsi dall'altra, in guisa che s'elleno sono eguali sul bel principio, questa egualità perseveri fino al fine: lo che può benissimo sussistere con diminuzioni cagionate dalla resistenza de' mezzi, o da sfregamenti, purchè que-



S P E R I M E N T A L E. II
queste alterazioni sieno eguali da ambedue le parti.

PRIMA ESPERIENZA. PREPARAZIONE.

La Fig. 1. rappresenta una tavola rotonda, la quale porta nella sua circonferenza delle carrucole che si rispondono, come A, B; si fan passare per la girella d'esse due corde C A E, C B D, che da una parte s'attengono al mobile C, e che dall'altra sostengono un peso di piombo, D, E.

E F F E T T I .

Sei due pesi sono eguali il corpo C resta in equilibrio, per tutto dove si trova nella linea A B; se il peso E pesa 2. oncie, e D ne pesa sol una, il corpo C è trasportato verso A, come se E pesasse un'oncia, e non vi fosse alcuna resistenza in D: lo che si riconosce esponendo sotto la sua caduta una piccola conca piena di terra molle, nella quale egli fa uno sprofondamento, che si può misurare e paragonare.

S P I E G A Z I O N I .

Si chiama *equilibrio* in generale lo stato d'un corpo che viene sollecitato di muoversi per due versi opposti con forze eguali; questa doppia tendenza non può avere il suo effetto a cagione che
le

12. LEZIONI DI FISICA

le forze che la producano quinci e quindi sono eguali; laonde quanto dura tale egualità tanto resta il mobile in quiete. Questa è pure la ragione per la quale il corpo C della nostra esperienza resta per tutto dove si trova, nella linea che unisce le due potenze, quando i pesi E e D sono eguali.

Ma se l'uno de' due viene a crescere, l'equilibrio è subito rotto ed il mobile ubbidisce al più forte. Non gli ubbidisce tutta volta se non quanto egli eccede il più debole; imperocchè la resistenza di questo non è annichilata, sussiste sempre; ed il suo effetto è di consumare una forza contraria ed eguale alla sua; perciò quando il mobile C è trasportato dal peso E, ciò non può essere se non per la quantità onde quest'ultimo supera il primo.

APPLICAZIONI.

Tutti i corpi che sono stretti, o ritenuti fra una potenza, ed un punto d'appoggio, sono altrettanti esempj che rappresentano quello che abbiamo qui provato colla precedente esperienza: imperciocchè sappiamo per la terza legge del moto semplice, che la reazione è eguale all'azione od alla compressione: così quando un falegname strigne un pezzo di legno tra il suo panco, e l'uncino, lo fissa tra due potenze eguali; la medesima cosa si dee dire d'un pezzo di ferro ritenuto nella morfa d'un fabbro; d'una corda tesa tra due punti fissi; d'un battello attaccato ad un paletto per resistere alla violenza della corrente ec.

Due pesi eguali sono in equilibrio, e per conseguenza.

SPERIMENTALE. 13

seguenza restano in riposo a' due capi d'una corda che abbraccia una carrucola, finchè questa corda è eguale da una parte e dall'altra; imperocchè allora ciascun peso è tanto tirato in su dal suo antagonista, quanto in giù dalla sua propria massa. Ma se la corda diventa più lunga da un lato che dall'altro, l'equilibrio più non sussiste; il peso della quantità eccedente è una nuova potenza che aiuta a discendere de' due pesi quello che è il più basso. Quest'è una cosa, alla quale si dee por mente, quando si fabbricano macchine per trar dell'acqua, per cavar pietre, ec. da sotterranei profondissimi, o per alzare de' pesi ad altezze considerabili; se si tralasciasse di mettere in conto il peso delle corde, si cadrebbe spesso in errore; imperocchè coteste corde sono d'ordinario pesantissime, e quand'elleno sono stese per tutta la loro lunghezza, molto aggiungono alla resistenza che si vuol vincere; di ciò può uno accorgersi sensibilmente, quando tira da una grande profondità una secchia piena d'acqua; gli ha da fare più sforzo, quando la secchia comincia a salire, che quando è per giungere all'alto.

II. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

La macchina che è rappresentata con la *Figura* 8. è un piano verticale d'un piede cubico, elevato sopra una base: in *H* è un punto fisso, al quale è attaccato un filo che passa sopra una carrucola *G*, e che porta nella sua estremità un piombo *F*. La carrucola *G* è mobile sopra due fila di
leto-

14 LEZIONI DI FISICA

letone, tefe parallelamente da H in I , ed ella tirafi con un filo che paffa fopra una carrucola fiffata in I .

E F F E T T I.

Quando tirafi la carrucola da G in I , il pefo monta per la diagonale FI .

S P I E G A Z I O N I.

Il Corpo F è meffo in moto da due potenze, una delle quali efige, ch'egli s'alzi d'un'altezza eguale a FG ; e l'altra, che egli s'avanzi d'una lunghezza eguale a GI . Imperocchè il punto fiffato che ferma il capo del filo in H , e che cagiona l'elevazione del mobile F , debbe confiderarfi come una potenza eguale a quella che tira la carrucola mobile verfo il punto I . Se quefte due forze aveffero i loro effetti fepparatamente, il piombo percorrerebbe fucceffivamente le due linee FG , e GI ; ma perchè elleno operano nel medefimo tempo, e fono eguali fra effe, il mobile s'avanza del pari, ed a mifura ch'egli monta, lo che fa ch'egli muovefi nella diagonale FI .

Quefta efperienza fa molto ben vedere quello che abbiamo dato come una fuppozione nella *Fig. 3*. Imperocchè il filo FG che tiene il piombo fofopefo, rappresenta il regolo mobile, che fi può confiderar come divifo in fei parti eguali, e che fcema di lunghezza a mifura ch'egli s'avanza fopra ciafcuna delle fue parallele segnate ful piano: è la fteffa cofa che il corpo F afcenda avan-

SPERIMENTALE. 15

zandosi sul filo, o che questo filo alla cui estremità il corpo è fissato, scemi di lunghezza: se egli scema dunque d'una parte, quando sarà giunto alla prima parallela, il piombo sarà in *a*: se di nuovo egli scema d'una parte, avanzandosi alla seconda parallela, il piombo si troverà in *b*, è così di mano in mano, fin a tanto che il mobile abbia percorsa tutta la linea FI.

APPLICAZIONI.

I voli che s'imitano nelle Rappresentazioni Sceniche dell'Opera, e negli altri Spettacoli s'eseguiscano per via d'una meccanica molto simile a quella, che impiegata abbiamo nella Sperienza qui spiegata: s'avverte solamente di proporzionare i pezzi agli sforzi che debbono sostenere, e per nascondere più che si può le corde agli occhi dello spettatore, si fanno con fila di letone assai sottili, e in assai numero, per conciliare ad un tratto la forza e la flessibilità.

L'uso insegna a un barcaiuolo, ch'egli non dee per la più corta linea dirigere il suo battello sul fiume, per arrivare al punto men lontano della riva opposta; egli sa, che se tendesse da *P* in *R*, Fig. 1. arriverebbe in qualche luogo più sotto, come in *S*; si dirige più tosto verso *T*, e la forza della corrente lo rimena a poco a poco al punto prefisso facendogli descrivere una linea curva.

La ragione di quest'effetto presentasi da sè medesima, quando si pon mente, che il battello spinto in una direzione che non è quella della corrente, compone il suo moto delle due forze, delle

16 LEZIONI DI FISICA

le quali egli prova l'azione: quindi vedesi che quando una delle due cresce, convien che l'altra cresca a proporzione, se si vuol conservare lo stesso effetto. Se il crescimento dell'acque rende il corso più rapido, è di mestieri faticar di più, per giungere al medesimo termine; ovvero bisogna dirigere il battello a più alto segno, e così vediamo fare ai barcaioli oppostati su i porti per lo pubblico passo.

I pesci ci somministrano un esempio di moto composto considerabilissimo; quando vogliono andare da una banda o dall'altra per fianco, battono d'un colpo l'acqua colla coda; non cedendo il fluido così presto come è battuto, serve di punto d'appoggio al corpo del pesce per voltarli a dritta o a sinistra: Ma quando l'animale vuole progredire innanzi, questo moto è ognor preceduto da due colpi della coda medesima dati in un subito, e per contrarj versi: il corpo piglia allora un moto composto di due impulsioni, egli non va nè a dritta nè a sinistra, ma in una direzione che tiene il mezzo fra l'una e l'altra.

Questa maniera di andare innanzi per via di moti obliqui ed opposti gli uni agli altri, si può ancora osservare nella maggior parte de' rettili, come i serpenti, le biscie, le vipere ec. l'uso di cotesti animali di servirsi di questi due moti, e di combinarli insieme, dà loro facilità non solamente di fuggire con grande prestezza, ma anche d'ingannar quelli che li perseguitano, con la destrezza d'un andamento tortuoso.

Gli uccelli, e la maggior parte degl'insetti alati, compongono i loro voli, quando debbono far qualche giravolta; battono l'aria con un'ala o più
for-

fortemente o più frequentemente che con l'altra; e ciò si può agevolmente osservare nel guatar il volo d'una farfalla; l'irregolarità de' suoi moti è un effetto ed una prova sensibilissima dell'azione ineguale delle sue ali.

L'arte imita in qualche maniera questo natural meccanismo, onde gli animali compongono i loro moti. Noi vediam tutto di arrivare su la Senna de' battelli di fieno, che non hanno altri motori, che la corrente del fiume, ed un piccolo remo corto, un po' largo, che un uomo fa muovere continuamente da dritta a sinistra, appresso a poco come la coda d'un carpio che nuota avanzando.

Ma un'imitazione ben perfetta e curiosa di questi moti composti, è l'apparato mirabile e il servizio marinaresco d'una galera, ove si vede il buon ordine e l'uso, onde impiegansi con incredibil destrezza, più ordini di remi per variare le velocità, e le direzioni del vascello secondo l'uopo occorrente.

III. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

ABCD, Fig. 9. è un picciolo trucco, ad un capo del quale sollevasi perpendicolarmente un palchetto, che porta due ali che si girano, E. F., a cadauna di quest'ali è sospeso un martello d'avorio che si muove liberamente attorno del punto G. Si dirigono i martelli come si vuole, girando più o meno le ali che li portano, e si regolano le loro velocità con quella proporzione

Tom. II.

B

che

18 LEZIONI DI FISICA

che si desidera, facendoli cadere per archi più o meno grandi, ma sempre nel tempo istesso sopra una palla d'avorio situata in H.

E F F E T T I.

Quando i martelli hanno velocità eguali, e le ali sono egualmente inclinate alla linea HI, la palla dopo la percossa, segue quest' ultima direzione. Se i due colpi sono ineguali, o le direzioni differentemente inclinate, la palla descrive una linea, che si scosta più o meno da HI, come HB, HK, secondo la ragione e proporzione delle forze, che l'hanno determinata a muoversi.

S P I E G A Z I O N I.

Quest' esperienza si deve spiegare, siccome la precedente: un de' martelli che operasse solo, spingerebbe la palla nella sua direzione; ella andrebbe verso M, o verso N; ma quando oprano tutti e due nel medesimo tempo, come non è possibile che un medesimo mobile portisi in un tratto verso due opposti punti, la palla così percossa piglia un moto che partecipa delle due velocità, e delle due direzioni. Quello che con quest' esempio di più si vede, è, che queste due forze una volta impresses da cause che quindi cessano d'oprare, hanno il medesimo effetto, e compongono il moto del mobile, come se le loro azioni fossero continue; imperocchè s'è dovuto osservare, che i due colpi di martelli oprano sulla nostra palla ciò che le due fila tirate nel medesimo

SPERIMENTALE. 19
desimo tempo han fatto sul piombo della secon-
da esperienza.

APPLICAZIONI. .

Quello che si getta per la portiera d'una carrozza che corre, o su la riva quando si è in una barca trasportata dalla corrente, ovvero di fianco correndo a cavallo, non arriva mai al termine che un si è prefisso, se si bada alla sola impulsione del braccio. Imperocchè oltre di questa, si deve ancora far caso del moto della carrozza, della barca, o del cavallo, che è comune al mobile ed alla mano: saonde quando si salta fuori d'una carrozza o d'una barca, che sieno in moto, si deve prevedere che si cadrà al di sotto del sito, che si ha di rimpetto nel momento che si sbalza fuori. Ma non si dee già credere che gli accidenti che in simil caso occorrono, nascan perchè il movimento composto diventando più obliquo, non porta il corpo abbastanza lungi, sì che si tocchi terra, o si scani la ruota; imperocchè veder si può dalla Fig. 3. che se la linea *MC* rappresenta il corpo della vettura, l'estremità *n* della diagonale n'è tanto discosta quanto il punto *G*; ma il mal viene, perchè non si prende tutta la velocità, ehe si crede, avendosi per punto d'appoggio un piano che non è fisso, ed il moto del quale occasiona bene spesso un'inopinata caduta.

Un nocciolo schiacciato obliquamente, e che scampa dalle dita, è un altro familiarissimo esempio del moto composto di due impulsioni, i cui effetti sussistono, quantunque le cause abbiano

20 LEZIONI DI FISICA

cessato d'oprare. Questo fatto ne riduce a memoria un altro che è men comune ; ma che è non per tanto notissimo a' Giocatori di trucco. Se colla mano in taglio si urta una palla fuor del piano del suo Equatore, che è perpendicolare al tapeto, sul quale ella è posta, sfugge da bella prima innanzi, come il nocciolo schiacciato obliquamente da due lati ; ma quel che par singolare, si è, che dopo d'aver così avanzato otto o vero dieci pollici, ella ritorna, aggirandosi verso il luogo ond'è partita,

Questo fatto si spiega facilmente, quando si fa attenzione, che colpendo la palla di trucco nella sopradetta maniera, le si fan prendere due sorte di moto: uno cioè in linea retta, ch'ella ha seguitato da prima, ed un altro di rotazione sopra se stessa, per un verso contrario al suo moto diretto. Quest'ultimo moto non si scorge finchè la palla non tocca il tapeto, o vi sdrucchiola sopra con troppa velocità ; ma quando il moto diretto è rallentato pegli sfregamenti, sì ch'ella viene a posar sul tapeto, il moto di rotazione che falli per contrario verso, la rimena verso il luogo ond'ella è partita ; imperocchè non è possibile ; che una palla giri sopra un piano, senza mutar luogo s'ella tocca cotesto piano con l'Equatore della sua rotazione ; quando non si suppongano delle superficie senza sfregamenti, il che non trovasi nello stato naturale.

Sin qui considerato abbiamo il moto composto di più forze, che fra lor conservano una relazione costante ; esaminaremo adesso, in qual maniera si componga il moto, quando queste relazioni si cambiano. Quando, c'empigrazia, di due po-
tenze

Fig. 8.





Fig. 9.



S P E R I M E N T A L E. 21

tenze che operano nel medesimo tempo, l'una diventa più forte o più debole, ovvero (lo che si riduce alla stessa cosa) quando avendo un mobile ricevute due impulsioni che compongono il suo moto trovansi delle cause straniere o accidentali, che diminuiscono o aumentano una delle due, come se, per esempio *Fig. 8.*, il filo *FH*, della seconda Esperienza, in vece di accorciarsi sempre d'una parte, a misura che arriva a ciascuna delle parallele; scemasse d'una, e poi di due ec. o al contrario.

Si è potuto osservare per le prove, e per gli esempi da noi riferiti, che il moto composto si fa sempre in linea retta, ogni volta che il mobile ubbidisce a due potenze che perseverano nella medesima relazione fra esse; o sia che niun cambiamento ricevano, o che i cambiamenti sieno eguali o proporzionali quinci e quindi; perchè gli effetti di cadaun istante *m b*, *b k*, *k l*, ec. *Figura 3.* e *4.* s'incontrano nella stessa direzione, e la loro somma produce la diagonale *M n*. Ma così non è, se la relazione delle potenze si cambia: il prodotto di ciascun tempo infinitamente piccolo, è una linea retta che il mobile descrive sempre in conseguenza della legge stabilita di sopra; ma ciascuna di coteste linee ha la sua direzione particolare, secondo lo stato attuale delle potenze, come si può vedere dalla *Figura 10.* Imperciocchè, se il mobile *M* è spinto orizzontalmente da una forza, la cui azione sia eguale in tutti gli istanti, e nel medesimo tempo egli ubbidisce ad un'impulsione dall'insù all'ingiù che sempre maggiormente cresce, come gli spazi *Ma. a b*, *b c* ec. nel primo tempo il corpo *M* arriverà

22 LEZIONI DI FISICA

rà in 1, sul fine del secondo al punto 2, poscia al punto 3 ec. Ciascuna di queste linee, come si vede, è una piccola diagonale; ma della serie loro, si forma una curva, la quale varia, come la relazione mutua delle potenze: questa teoria si renderà sensibile colle due Esperienze che seguono.

IV. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

La macchina rappresentata dalla *Figura 11*, è formata di due piani elevati verticalmente, de' quali l'uno ABC, più sporgente dell'altro, è tagliato di profilo in porzione di circolo cominciando dall'alto, e lascia in questa parte una spezie di grondaia AB tra esso, e l'altro piano che è più scostato. Quest'ultimo è diviso da Bin Din in tre parti eguali, e da B in Cin in tre parti ineguali, che vanno crescendo, come 1; 3, 5. Negli angoli, che formano tra esse le linee di divisione, si son fissati alcuni anelli perpendicolarmente al piano, ed il tutto sostiene da una base che si mette di livello per mezzo di tre viti,

EFFETTI.

Lasciasi cadere una palla di metallo per la grondaia AB, ed ella descrive la curva BEF, passando per li anelli.

SPIE-

S P I E G A Z I O N I .

Quando la palla è arrivata dal punto A al punto B, per l'arco di cerchio ch'ella descrive, ha acquistata una certa velocità con la quale scappa nella direzione BD; ed in conseguenza della prima legge del moto semplice ella seguirebbe coteſta linea, se niente le si opponesse, ma questa palla è pesante, ed il peso, come appresso vedremo, è una forza, la cui direzione è dall'alto al basso, e che dà al mobile una velocità accelerata; laonde, quando la palla è giunta al punto B, e cessa d'essere sostenuta dalla grondaja, trovasi sottomeſſa a due potenze, l'una ch'è la sua velocità acquistata discendendo dal punto A, l'altra ch'è il suo proprio peso. La prima che ha la sua direzione verso D, è uniforme; la seconda che è diretta verso C, è accelerata: così non essendo gli spazj, che questa palla percorre discendendo, eguali tra essi, nè in una proporzione od ordine costante, con quei ch'ella percorre progredendo innanzi; il cambiamento di direzione ch'ella prova ad ogni istante: gli fa descrivere la curva BEF.

A P P L I C A Z I O N I .

Eſempj innumerabili fan vedere, che la gravità de' corpi cambia il moto loro, quando non son diretti com'essa; ella è una forza che ha il suo effetto, come ogni altra in caſo ſimile; e quando ella non ſcorgeſi, ciò è perchè l'altra

24 LEZIONI DI FISICA

potenza che opera nel medesimo tempo sopra il mobile, è molto più grande.

Una palla di calibro tirata lungi settanta passi non sembra essersi abbassata; se un ne giudica dalle apparenze, direbbe ch'ella ha seguitata la sola impulsione della polvere, e che il suo peso non c'è entrato per niente nel di lei moto, poichè ella pare essersi mantenuta nella vera direzione del cannone.

Ma conviene por mente a due cose; la prima si è, che la velocità della palla in una tale distanza, è sì grande, che il suo peso non la farebbe discendere, se non d'una quantità piccolissima, s'ella si lasciasse liberamente cadere durante un simil tempo: imperciò questa caduta non deve essere più notevole, quando un'altro moto trasporta il mobile, la seconda (e questa è la ragion più forte) si è, che le canne dell'armi da fuoco sono più grosse verso la loro culla, che nella sboccatura, di maniera che la linea di mira GH , e la vera direzione della palla, s'incrocicchiano per istrada, come si può vedere dalla *Fig. 12*. Laonde, quando si crede diriger la palla in H , ella dirigesì veramente in I ; e se si tira ad una convenevole distanza, e l'impulsione della polvere sia proporzionata al peso della palla, e l'angolo formato dalla linea di mira, e la direzione della canna interiore sia in una buona proporzione; l'effetto del peso farà gir basso il colpo la quantità d' IH , e si toccherà mercè d'un moto veramente composto lo scopo prefisso, non avendosi riguardo fuorchè al moto semplice impresso dalla polvere infiammata.

Tutti

SPERIMENTALE. 25

Tutti i fusili dunque alzano il colpo, e quando un si lamenta di ciò, non si ha da intendere, che si lamenti, se non di quelli che l'alzano troppo; imperocchè, se la canna fosse per tutto della medesima spessezza, il raggio visuale sarebbe parallelo alla direzione della palla; il peso del piombo farebbe di necessità abbassar il colpo, e l'arme così male costrutta porrebbe chi tira in necessità d'aver riguardo all'effetto della gravità.

Tutti i corsi d'acqua che non sono perpendicolarmente all'Orizzonte, ci fanno ancor vedere de' moti composti in linee curve; mercè di quelle forze, le cui azioni non restano costantemente nel medesimo ordine in tutti gl'istanti. L'acqua che cade da una grondaja, esempigrazia, parte orizzontalmente con una velocità ch'ella acquista discendendo dal tetto, e questa velocità da se stessa è uniforme; ma nel medesimo tempo ella tende a muoversi dall'alto al basso, con una forza, che cresce in tutti gl'istanti. Da questa doppia tendenza nasce una curva, che un corso d'acqua successivo rappresenta agli occhj, e la sua estremità ove terminasi la caduta, portasi avanti tanto più lungi, quanto la velocità orizzontale è maggiore, lo che osservar si può quando il defluvio è più abbondante; imperocchè, essendo allora più considerabile la massa dell'acqua, ell'è altresì meno ritardata dagli sfregamenti, o dalla resistenza dell'aria.

V. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Sopra due corde di minugia forte e parallelamente tese da un capo all'altro della camera, si fa sdrucciolare la tavoletta LM, *Figura 13.*, la quale tirasi per via d'una funicella che passa su la carrucola di tramando N; nel mezzo di questa tavoletta mobile v'è un foro, o sia un capo di cannoncino, ov'è inserito un piccolo cilindro di legno duro, e che può moverfi da giù in su senza uscire; di sotto sta un martello sospinto da una molla che si tende, quando fassi passar il manico del martello per la chiocciola L, dov'è ritenuto da una chiavetta O. Quest'ultimo pezzo s'attiene ad una cordicella di due o tre piedi di lunghezza, ch'è attaccata come le due corde al muro; mettesi una palla d'avorio e di calibro nel piccolo cannoncino, e tirasi la tavoletta più uniformemente che si può, e con una velocità capace di farle percorrere otto o dieci piedi in un secondo.

EFFETTI.

Quando la tavoletta ha percorso in circa il terzo del suo cammino, la chiavetta ritenuta dalla cordicella alla quale ell'è attaccata, fa operar l'ingegno o la molla, donde è spinto il martello: ed allora il colpo dato per di sotto al piccolo cilindro, comunicasi alla palla d'avorio; questa sbalza dal cannoncino, e si solleva; e va a ricadere

S P E R I M E N T A L E. 27

dere per una linea curva su la tavoletta che ha continuato ad avanzare, mentre la palla era in aria.

S P I E G A Z I O N I.

Se la tavoletta *ML* restasse in quiete, mentre il martello imprime la sua impulsione, è manifesto, che la palla si solleverebbe perpendicolarmente per la linea *Pp*; è certo ancora, che se la palla avesse solo un moto comune con la tavoletta, non uscirebbe, come non esce la tavoletta, dalla direzione orizzontale; ma s'ella parte co' due moti insieme, la legge del moto composto vuole, ch'ella prenda una direzione media, e che sollevi per una linea obliqua all'Orizzonte, qual è *PQ*, o *PR*. Una volta ch'ella è determinata a moverli in una di queste linee, continuerebbe via via così in conseguenza della prima legge del moto semplice, se la sua gravità non vi mettesse ostacolo. Questa potenza, che risiede stabilmente in lei, e che ognor la sollecita a discendere, l'allontana sempre più dalla direzione ch'ella ha; e però che gli spazi ch'ella percorre da su in giù, van sempre crescendo (lo che spiegheremo più precisamente ragionando delle leggi della gravità) avviene che nel tempo ch'ella averebbe consumato in percorrere la linea *PR*, giunge al punto *S* per la linea *PTS*, e la tavoletta che non ha interrotto il suo movimento, ritroyasi sotto la palla nel fin della sua discesa.

A P.

APPLICAZIONI.

L'Esperienza che abbiamo poc'anzi spiegata , somministra risposte alle seguenti dimande.

1. A qual forte di pericolo farebbe esposto un mozzo di nave , il quale si lasciasse cadere dall' alto al basso della gabbia , mentre il vascello è alla vela ? correrebbe egli il rischio di cader nel mare , o pur la sua caduta stramazzerrebbe sul ponte .

2. Che avverrebbe di una melarancia , cui studiasse un uomo che corre a cavallo , di scagliare perpendicolarmente all' Orizzonte ? la velocità del cavallo lascerebbe indietro ?

3. Supponendo che la terra giri sul suo asse in ventiquattr' ore , e che un cannone , o un mortajo collocato sotto l' equatore , avesse un moto d' Occidente in Oriente , che appresso a poco corrispondesse a ducento cinquanta pertiche per secondo , la palla che venisse tirata perpendicolarmente , seguirebbe questa direzione , tanto ascendendo , che discendendo ?

Segue dalle precedenti Spiegazioni , che il mozzo caderebbe a piedi dell' albero per una linea che parrebbe verticale a quelli che fossero sul vascello ; ma la di cui curvità scorgerebbesi benissimo , se si stasse sul lido : imperocchè è vero che tal caduta farebbe parallela all' albero ch' è diritto ; ma i differenti punti dell' albero , ai quali corrisponderebbe il mozzo , cadendo , farebbono più avanzati gli uni che gli altri nella direzione orizzontale , e la loro serie troverebbesi in una linea curva , perchè la caduta si fa con una velocità
acce-

SPERIMENTALE. 29

accelerata, lo che facilmente s'intenderà, se prendasi per l'albero la linea Mf della *Figura* 10. gli spazj intercetti fra le lettere $M, a, b, c; d, e, f$ per lo cammino che percorre il mozzo in tempi eguali cadendo, e la linea Mc , od $f6$, per lo spazio orizzontalmente scorso dal vascello.

La melarancia, e la palla di cannone, farebbono precisamente nel caso della palla d'avorio della nostra ultima Esperienza, e farebbono com'essa, cioè nè l'un nè l'altro de' detti corpi caderebbe in dietro; e se accidentali cagioni non vi ponessero impedimento, la melarancia arriverebbe nella mano del Cavaliere, e la palla nella imboccatura del cannone donde fosse partita; di che è facile accorgersi, applicando a queste due supposizioni le ragioni, delle quali ci siam serviti, per spiegare il moto della palla d'avorio.

Quantunque cotesti effetti possano con tutta sicurezza dalla teoria dedursi, non si debbono non per tanto attendere in pratica; perchè nel momento che spiccasi il mobile, viene regolato il suo moto in conseguenza delle due impulsioni, tali quali sono nel primo instante della sua mossa; ma ordinariamente succede, che avanti la sua caduta, il piano mobile che ha da riceverlo, cambi o nella velocità, o nella direzione; ovver che il mobile incontri ostacoli, che alterano le corrispondenze delle impulsioni, onde il suo moto è composto: in simili casi, bastano gli *appresso a poco*, ed hannosi quasi sempre o se mancano, le cagioni si presentano da sè medesime.

II. Se.



II. SEZIONE.

Delle Forze Centrali.

Tutto quello che abbiamo insegnato intorno al Moto semplice nelle precedenti Lezioni; e quello che poc'anzi esposto abbiamo del Moto composto, fa vedere che non vi ha moto alcuno, che sia naturalmente diretto in linea curva; un corpo determinato una volta a muoversi, o per una sola cagione, o per molte insieme, tende sempre a perseverare nello stato, in cui egli è, e questo stato consiste nel passare con una certa velocità da un termine ad un altro per la via più corta, ch'è una linea retta. Se veggiamo per tanto un mobile descrivere una linea curva col suo moto, considerar dobbiamo il cammino ch'egli fa, quasi una serie di movimenti non interrotti, ma le cui direzioni particolari si mutano ogni istante, e formano tra loro angoli molto ottusi: in quella guisa che si suole considerare un circolo, od una linea curva, come un aggregato di linee rette infinitamente corte, e insensibilmente inclinate fra esse; tale sarebbe la linea 1, 2, 3, 4, 5, 6, della *Figura 10.* se le parti intercette tra questi numeri non avessero una lunghezza sensibile.

Questa serie continuata di moti in linee rette, l'aggregato delle quali forma una curva.

non

S P E R I M E N T A L E. 31

non può dunque essere l'effetto d'una sola determinazione; molte eziandio non basterebbono, quando non cambiassero continuamente relazione fra esse, come spiegato abbiamo e provato nella Sezione precedente.

Ma queste relazioni o proporzioni possono cambiarsi, non solo quanto al grado di forza, ma quanto alla varietà della direzione delle potenze; e questo è lo scopo di una nuova considerazione, a cui ci rimane di ragguagliare il moto composto.

Supponiamo dunque che il mobile A, Fig. 14. sia sollecitato a muoversi da due potenze che sien tra esse come le due linee AC: e AB; sì per l'intensità, come per le direzioni: vale a dire, che le lor forze sieno come 1 a 3, e le lor direzioni facciano tra loro un angolo retto nel punto A. Egli è certo che il moto composto comincerà da A d, e che continuerebbe sino in D, se niente si cambiasse; ma se le due potenze al fine di questo primo tempo si ritrovano disposte fra esse, come nel principio; se per esempio, la tendenza verso D rimanendo qual ella risulta dal moto composto, l'altra potenza dirigasi verso H, il moto si comporrà di nuovo, ed il mobile giungerà in e: e se simil cosa pure avviene, che l'una delle due potenze si diriga in I, si vedrà il mobile giungere in f e di là in g, e poscia in h, se il punto K ed il punto L diventano successivamente i termini della potenza ch'era da principio A C.

Ciò che qui abbiám supposto, trovasi realmente nel moto d'una fionda, o di qualunque altro corpo, che si faccia girare all'estremità d'una
cor-

corda; imperocchè la mano passando successivamente per li punti C, H, I, K, L, fa passar la corda per le linee A c, d H, e I, ec. e però che si suppone che cotesta corda sia sempre della medesima lunghezza, ella rappresenta una potenza, che sol varia quanto alla sua posizione. Se si considereranno come infinitamente piccole le linee A d, de, ef, fg, ec. percorse dal mobile, la loro serie sarà una curva, tal quale descriver si vede a tutti i corpi che trovansi in simil caso.

Tutti i corpi che circolano come la pietra d'una fionda, fanno dunque uno sforzo continuo per non più circolare, poichè se fosser liberi, scapperebbono per qualcheduna delle piccole linee rette, ch'eglino ad ogni instante cominciano, come d D, od e E, che *tangenti* si nomano. Quest'è una conseguenza della prima legge del moto, confermata dall'esperienza; imperocchè se la corda si rompe, o del tutto si allenta, quando la fionda è in d, la pietra da lei portata non continua il suo moto per li punti e, f, g, ec. ma seguita la linea d D, e tutta la destrezza e perizia del fromboliere consiste in ben stimare la tangente, che si dirizza allo scopo.

Ma tendere a scappar per la tangente, e fare sforzo per allontanarsi dal centro del moto circolare, sono due espressioni, che si possono tener per sinonime; imperocchè è evidente che se il mobile A, in vece di andare da d in e, e da e in f, continuasse da d in l, e da l in m; vie più si scosterebbe sempre dai punti I, K; dunque in generale si può dire che tutti i corpi che si fan muovere in linea curva, tendono ad allontanarsi dal

SPERIMENTALE. 33

dal centro del loro moto; e che quando questa tendenza non ha il suo effetto, avviene perchè sono ritenuti, o spinti verso cotesto centro da una forza contraria.

Queste due forze che producono il moto circolare, o in linea curva, e che di continuo sollecitano il mobile, una ad appressarsi, l'altra ad allontanarsi dal centro, nomansi *forze centrali*; e per distinguerle l'una dall'altra, si chiama la prima *forza centripeta*, e la seconda *forza centrifuga*.

Le forze centrali sono direttamente opposte l'una all'altra, imperocchè quantunque la forza centrifuga abbia la sua direzione per la tangente, convien badare, che il raggio che rappresenta la forza centripeta; se fosse prolungato, verrebbe tagliato da cotesta tangente in una serie di punti che van sempre scostandosi dal centro: rendiamo la cosa sensibile per mezzo d'una *Figura*.

Supponiamo per esempio, che il mobile M *Fig. 15.* sia portato dal raggio B C, su la lunghezza del quale egli possa scorrere, è certo che se si fa girare questo raggio attorno del centro C, tutti i punti compresi tra M e B, passeranno successivamente col mobile sopra tutti quelli della tangente M D; e per conseguenza il corpo M obbedendo alla sua forza centrifuga, sdrucchiolerà direttamente da M in B. Per questa ragione la corda d'una frombola riman tesa, mentre si fa girare; e quando si fa circolare parimenti un bicchiero pien d'acqua, il fluido non si versa, ma fa piuttosto sforzo contro il fondo del vaso. Passiamo alle sperienze, e facciamo prima vedere ;

Tomo II.

C

che

34 LEZIONI DI FISICA

che le forze centrali hanno luogo in tutte le forme di materie, fluida, o solida che sia, purchè il loro moto si faccia in linea curva.

PRIMA ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

La macchina che è rappresentata con la Fig. 16. è una tavola triangolare, sodamente fermata sopra tre piedi, che si possono mettere a lieva con alcune viti. Verso la sommità del triangolo essi perpendicolarmente elevato uno stipite di legno diritto, il quale porta una ruota verticale, che si rivolge con un manico girevole, o d'altra guisa: questa ruota mercè d'una corda e di due piccole carrucole di rincontro, conduce due grandi carrucole orizzontali A B, che hanno i lor assi di ferro, e sono collocate negli altri due angoli della tavola: queste carrucole hanno più bastoncelli, di diametri differenti; e sul piano superiore di queste carrucole si fermano i varj pezzi che servono alle sperienze di questa specie.

Per quella che abbiain tra mani, s'attacca sopra una delle due carrucole A, o B, un sostegnetto o braccio mobile C D: un filo di ferro teso da un corpo all' altro, infila due palle d'avorio d' eguale grossezza, che s'attengono l'una all'altra per mezzo d'una seta lunga 5. pollici, e che possono scorrere con una grande facilità sul filo di metallo che le porta. Si mette una delle due palle nel mezzo, e l'altra a tal distanza quanto può permettere la seta a cui s'attengono.

EF-

Fig. 14.





Fig. 10.



E F F E T T I.

1. Quando si fa girare la gran ruota, e s'impri-
me un movimento circolare al braccio che sta at-
taccato ad una delle due carrucole A, o B, la
palla E descrive un circolo e trascina seco lei,
quella che è nel centro del moto.

2. Se si taglia la seta che lega le due palle, e si
ricomincia l'esperienza, la palla F resta nel cen-
tro, e scatta l'altra sola.

3. Se in una terza prova, sendo le palle lega-
te come nella prima, si collocano a distanza egua-
le dal centro da una parte e dall'altra, non smuo-
vonfi del loro sito nè l'una nè l'altra, per
quanta sia la velocità, con la quale si fan gi-
rare.

S P I E G A Z I O N I.

Quando il braccio o sostegnetto mobile gira
orizzontalmente, il filo di ferro che è teso da un
capo all'altro, forma colla sua rivoluzione un
piano circolare, di cui egli è il diametro, e tut-
ti i punti compresi nella sua lunghezza, dal mez-
zo fino alle estremità C, e D, descrivono altret-
tanti circoli concentrici. Ma la palla E per conse-
guenza si trova in uno di questi circoli ch'ella
pur descrive; cotesto moto le dà una tendenza ad
allontanarsi dal centro della sua rotazione, per la
tangente; e come ch'ella è portata da un raggio
che si muove egli pure con lei, ella scorre su la
di lui lunghezza, siccome abbiamo spiegato con
la Fig. 15. Ciò che la fa muovere così, è una

C 2

for-

36 LEZIONI DI FISICA

Forza reale, perchè la vince su la resistenza non sol della sua propria massa, che per la sua inerzia rimane per quanto può nella distanza nella quale è stata posta, ma se la resistenza eziandio d'un'altra massa che non circola, e che da una pari tendenza non è sollecitata ad uscir dal luogo suo: come appare quando si taglia la seta; imperocchè essendo allora il centro della palla F nel centro stesso della rotazione, non vi può essere forza centrifuga che nelle sue parti, che effettivamente girano; ma in un corpo sferico ed omogeneo, qual è la palla della nostra esperienza, le parti corrispondenti hanno delle forze centrifughe eguali e direttamente contrarie, per conseguenza in equilibrio: elleno sono le une verso l'altre come le due palle E & F legate insieme con una seta, e poste a distanze eguali dal centro del loro moto; ma faremo più a tiro di far intendere quest'equilibrio, quando avremo insegnato come si dee misurare la forza centrifuga.

II. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

In vece del sostegnetto, e delle due palle d'avorio, di cui ci siam serviti nell'esperienza precedente, se ne colloca un altro che nel mezzo della sua lunghezza porta una picciola conca piena d'acqua, alla quale comunicano due tubuletti di vetro inclinati G, H, e gonfiati in forma di palla nelle altre due estremità, come si vede dalla *Figura 16.*

EF-

EFFETTI.

Facendo girare questo sostegno, e ciò ch'egli contiene, l'acqua si solleva dalla conca per li tubuletti; e riempie le due pallottole che sono ne' capi.

SPIEGAZIONI.

Avanti che s'imprima il moto di rotazione, l'acqua stassi a livello della conchetta, nella parte inferiore de' tubi; perchè coteste colonnette del fluido fanno col loro peso equilibrio a quelle che corrispondono, nella conca, all'orifizio d'essi tubuletti. Ma quando coteste piccole porzioni d'acqua vengono a girare con una certa velocità, la forza centrifuga maggior ch' il loro peso il qual tiene in esse luogo di forza centripeta, le porta verso la palla cava. A misura che una parte ascende, un'altra le succede per far equilibrio all'acqua del vase; e successivamente tanta quantità se ne solleva, quanta basta per empire e il tubo e la palla.

APPLICAZIONI.

Queste due prime esperienze chiaro provano quello che da principio abbiamo asserito: che tutt' i corpi indistintamente, in qualunque stato ch'esser possano, acquistano una forza centrifuga girando; la connessione delle parti, o la loro fluidità, niente altera in questo effetto; tal specie di forza è come la velocità ripartita a tutte le parti.

38 LEZIONI DI FISICA

ticelle di materia che circolano, o piuttosto ella altro non è che la loro velocità medesima considerata in tale circostanza.

Le girandole, e le trottole, con le quali si divertiscono i fanciulli, possono qui essere chiamate come argomenti di dottrina al proposito nostro; infatti cotesti familiari esempj ci fan vedere che la forza centrifuga mettesi in equilibrio con sè medesima, ne' corpi, l'asse de' quali od il centro di gravità non circolano; come abbiamo di sopra insegnato, mettendo la palla d'avorio nel centro della rotazione; in simil caso il mobile ha solo il movimento circolare, senza alcun libramento, quantunque paia talvolta in quiete, facilmente si conosce che le sue parti tendono a scostarsi dal centro, e che son interamente ritenute dalla loro aderenza naturale; imperocchè se sopra vi si fa cadere qualche fluido, presto si dissipa, e abbandona la superficie solida con la quale gira. Le ruote delle carrozze e delle sedie da posta gittano il fango da lungi, e la mola dell'aguzza coltelli vuoterebbe la doccia, nella quale ella in parte s'immerge, e farebbe un'asperzione continua e incomoda, se non si ponesse cura di fermar l'acqua di soverchio trasportata con un pezzo di cuoio o di cappello, che fassi girare su la sua superficie.

I Soli, che si fann'apparire ne' fuochi artificiali, più grandi e più belli diventano mercè del loro moto di rotazione; imperocchè il salnitro infiammato si spande per un infinito numero di tangenti, e forma un piano più esteso, di quel ch'egli esser potrebbe, se ardesse senza girare.

Si

Si può trar profitto maggiore dalla nostra seconda sperienza, con applicare all' elevazione dell'acque o alla loro evacuazione, il principio di cui ella è la prova; un simil mezzo è stato già tentato con buon esito; ed io non dubito, che in parecchie occasioni se ne potrebbero ricavar grandi vantaggi. La famosa tromba d'Assia per attrar acqua, fatta nota agli eruditi, sotto l' titolo di *Rotabilis Suctor* (a), che M. Papin inventò, e di cui poi si valse in pratica con diversi cambiamenti, altro in somma non era che un tamburro, o cilindro cavo, immerso nell' acqua, e nel quale si facean girare alcune braccia od ali ficcate in un asse; facendo questo moto di circular l' acqua, le dava una forza centrifuga, che facevala innalzare per un canale o tubo fatto a bella posta nella circonferenza del tamburro. Molti pure hanno fabbricate alcune tali trombe, nelle quali la forza centrifuga è ingegnosamente applicata. Alcune se ne trovano appresso Ramelli; e nella raccolta delle macchine approvate dall' Accademia delle Scienze (b) Attenendosi a cotesto principio si son pure inventati de' mantici da fucine (c) e certe specie di cribri, o vagli, per mondare il formento; la parte principale di queste macchine è sempre un asse corredato di braccia, od ali, che si fan girare in un tamburro, ben vede chicchessia, che se vi ha un buco, od un cannone aperto, nella circonferenza del tamburro, ed un altro nell' un de' lati, presso al centro del moto, necessario è che segua uno scorrimento d' aria continuo per lo primo; imperocchè mentre

C 4 la

(a) Acta Lips. Jun. 1689. (b) Tom. 6. p. 112.

(c) Ibid. Tom. 5. p. 41.

40 LEZIONI DI FISICA

la forza centrifuga cagiona un'evacuazione per la circonferenza, il peso dell'aria a cui nulla più s'opponne allora, dee riempire il tamburro per il centro.

M. Desaguilliers approfittandosi di queste due determinazioni, che si possono partecipare a i fluidi mercè di simili macchine, n'ha fatta costruire una (a), con la quale egli s'è proposto di cambiar l'aria della camera d'un ammalato, di rinovar eziandio quella de' sotterranei, o de' luoghi che diventano infetti per il soverchio numero o per lo cattivo stato delle persone, che ivi dimorano: come le Sale di spettacoli, i Refettori di Comunità, le Infermerie ec. Le sperienze che si son fatte a Londra nella camera bassa del Parlamento; han fatto vedere che l'autore non si era ingannato nelle sue mire, e che coteSta invenzione apporta vere utilitadi.

Se si volesse adoprare de' tubi, o cannoni inclinati, come nella nostra esperienza, è vero che vi si troverebbe l'istesso inconveniente che nella vite d'Archimede. Non si potrebbero applicare se non ad elevazioni d'acqua mediocri, perchè esigerebbono una troppo grande lunghezza; ma vi faranno ben de' casi, ne' quali quest' inconveniente non nuocerà. Si sa, che il buon esito delle macchine è dovuto alle circostanze, e che quella che per certi versi non è la migliore, deve bene spesso essere preferita per altre ragioni, che la vincono.

La forza centrifuga è un mezzo di cui spesso mi servo per raccorre insieme il liquore ne' miei termometri, quando o qualche scossa, od altra

ca-

(a) Trans. Phil. n. 437.

SPERIMENTALE. 41

cagione l'ha difunito in più parti. Essendo che questo picciol sinistro interrompe l'uso dell' istrumento, e può succedere a tutti quelli che han de' termometri, penso di dover qui dire il rimedio ch'io ci apporto, e ch'è facile e semplicissimo. Bisogna tenere il termometro per la sommità della sua tavoletta, e girarlo un po presto cinque o sei volte, di modo che la palla si trovi nella circonferenza del cerchio che le si fa descrivere, ed il suo tubo nel raggio. Il liquor separato acquista una forza centrifuga, che lo riunisce quanto prima al rimanente.

Si fa buona parte degli effetti, che un moto simigliante produce negli animali; e vediam sovente de' giovanetti trastullarsi con far girare de' volatili domestici, dopo d'aver loro posto sotto l'ala il capo, per addomentarli, com'essi dicono; ed in fatti cotesti animali restano immobili nel luogo dove si pongono dopo questo esercizio. Ma è probabilissimo che questo sia non tanto effetto d'un sonno, quanto effetto d'uno sfordimento cagionato dalla turbazione impressa a' loro sensi, e finchè dura la quale, ricever non possono quelle impressioni le quali li determinano ne' loro ordinarij movimenti.

So, senza ombra di dubbio alcuno, che un animale può morire quando mettesi soverchio ad una tal prova. Io ho attaccato per le zampe di dietro un valido coniglio ad una corda, la quale ho fatta rapidamente girare da due uomini, ver cento girate continue in circa, e quando ei cessò, la bestia non era morta, ma non potè reggersi su' piedi, e spirò da lì a poco. Un gatto che si fe girare alla stessa maniera, non morì, ma vomitò

42 LEZIONI DI FISICA

tò assai ; e tuttochè non avesse ricevuta percossa alcuna gli si videro nella gola delle gocce di sangue . L' economia animale si scompone senza dubbio in tal caso , perchè la forza centrifuga determina i fluidi a portarsi verso la testa , il corso lor naturale è interrotto da questo straniero moto, e le lor funzioni cessano .

Il giuoco dell' anello , quel del dondolo , e dell' altalena , sarebbono pericolosi per la stessa ragione , se la posizione del corpo non oviassse agli accidenti ; se in vece di stare assiso , o in una situazione che mette i vasi appresso a poco paralleli all' asse della rotazione , si stasse collocato in manierachè la lunghezza del corpo fosse perpendicolare a cotesto asse medesimo , certa cosa è che presto ne seguirebbe lesione alla persona ; forse anche potrebbe tentar questo mezzo , per redintegrare il corso degli umori nelle membra attaccate da paralisia . Sono stato in questo pensamento prevenuto da un dotto uomo ; ma però che ne degli nè io facciamo professione o studio ordinario di anatomia nè di medicina , lasciassi a quei dall' arte il giudicare quanto valga questa congettura , e qual uso se ne può fare .

La forza centrifuga non essendo altro che lo sforzo d' un corpo , che procura di continuare il suo moto per la tangente della curva che se gli fa descrivere : misurar si debbe come il moto medesimo , dalla massa e dalla velocità ; così di due mobili che circolano con velocità eguali , quello ha più di forza centrifuga che ha più di materia ; così parimenti , quando le masse sono eguali questa medesima forza non può differire se non per lo grado di velocità .

Per

SPERIMENTALE. 43

Per conoscere il grado di velocità d' un corpo che circola, convien badare a due cose; 1. alla grandezza della sua rivoluzione; 2. al tempo ch' egli impiega nel farla.

Chiamasi *rivoluzione*, la curva che il mobile descrive, contando dal punto ond' egli parte fino che s' incontri in questo medesimo punto, od in faccia, sopra una linea che passi nel centro. Tal è il circolo che comincia in A Fig. 17. e che finisce nel medesimo punto, ovvero la spirale A E D che comincia e finisce su la medesima linea D C, Figura 18.

Il tempo che scorre, mentre il mobile fa un rivolgimento intiero, chiamasi *tempo periodico*. La velocità è tanto maggior, quanto il tempo periodico è più corto, e più ampia la rivoluzione: così il mobile A andrebbe con più di velocità che il mobile D; se l' uno e l' altro percorresse nel medesimo tempo il circolo nella di cui circonferenza egli si sta: ovvero se avendo tutti e due da fare il medesimo rivolgimento, come A, F, l' ultimo facesse il suo giro più presto che l' altro. Siccome si misura un circolo dal suo raggio, così la rivoluzione circolare stimasi per la distanza del mobile dal centro; per conseguenza se la distanza di C in D, è una volta più piccola che di C in A, si debbe conchiudere che la rivoluzione circolare dal mobile A è una volta più grande, che quella di D.

Computandole forze centrifughe di due corpi, abbiam dunque da considerare tre cose, la massa la distanza dal centro, ed il tempo periodico.

III. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Sopra una delle due carrucole orizzontali A, ovvero B della macchina rappresentata con la *Figura 16.* si pianta un sostegnetto *Figura 19* su cui son fermati quattro tubi di vetro inclinati al piano, e che nel mezzo si congiungono. In ciascun tubo del primo pajo, sono racchiusi due liquori, che hanno pesi differenti; nel primo, dell'acqua comune e dell'olio di terebintina colorato; e nel secondo, dell'olio di tartaro con dello spirito di vino. Quei del secondo pajo sono pieni d'acqua con una piccola palla di rame in uno, e una di soghero nell'altro. Quando ogni cosa è in quiete, i due liquori più leggieri stanno nella parte più elevata de' tubi che si racchiudono, e ciascuna delle picciole palle occupa altresì il luogo che conviene al suo peso; quella di metallo resta a basso, e quella di soghero nell'alto del suo tubo. Ma quando si mette in moto la macchina:

EFFETTI.

Lo spirito di vino e l'olio di terebintina cedono i loro luoghi all'acqua, e discendono nella parte inferiore de' loro tubi; la palla di rame si porta alla cima del suo, e quella di soghero per contrario discende dall'alto al basso.

SPIE-

S P I E G A Z I O N I .

Per lo moto di rotazione impresso al sostegnetto, ogni porzione de' tubi, e ciò ch'ella contiene, descrive un circolo, e acquista una forza centrifuga; il primo suolo d'acqua che tocca l'olio di terebentina esercita dunque contro questo liquore, tutta la tendenza ch'egli ha per allontanarsi dal centro del suo moto; questo sforzo sarebbe inefficace, se la forza centrifuga dell'olio fosse eguale a quella dell'acqua; poichè essendo sostenuto da una colonna dello stesso liquore appoggiata all'estremità del tubo, nulla farebbevi che lo costringesse a cedere il suo luogo: ma egli è men pesante, e l'acqua, in conseguenza del suo eccesso di massa, preval contro l'olio, e lo precipita a poco a poco imperocchè ciò che succede tra i due primi suoli, succede nè più nè meno in tutti gli altri: quindi è che l'olio e lo spirito di vino trasportansi di luogo, non per uno sforzo positivo dal canto loro (imperocchè il moto circolare dà pure della forza centrifuga a questi due liquidi;) ma perchè questa forza in essi non adegua quella dell'acqua; ed essendo la materia impenetrabile, e non bastando il luogo necessario a contener la colonna d'acqua, per comprendere seco altresì quella dell'olio, il luogo più lontano dal centro viene occupato da quel dei due liquori, che ha più di forza per impadronirsene.

Devesi similmente spiegare lo smovimento di sito delle due palle; per tutto dov'elle s'attrovano ne' loro tubi, ciascheduna, corrisponde
ad

46 LEZIONI DI FISICA

ad un volume d'acqua, la cui massa è differente dalla sua, nel più o nel meno. Questa inegualità fa nascere un eccesso di forza centrifuga nell' uno de' due volumi che si toccano; ed in questa maniera la palla di soghero più debole che l'acqua, è costretta a discendere; il rame, per contrario, prevale e s'innalza al di sopra di tutti i volumetti d'acqua corrispondenti.

APPLICAZIONI.

Vedesi dunque da questi effetti, che la forza centrifuga cresce come la massa de' corpi, quando le velocità sono eguali, e che la forza centripeta d'una materia, può essere l'effetto della forza centrifuga d'un'altra, che le circola con esselei d'intorno. Il Contadino che vaglia il suo grano, ce ne porge un esempio, il quale ha meritato l'attenzione de' Filosofi: qualor egli vuole riunir in un luogo la paglia ch'è col grano mescolata, per purgarnelo, imprime a tutta la massa un moto circolare, e tosto si vedono le parti più leggiere portarsi al centro del moto; perchè le più pesanti hanno più di forza per andare alla circonferenza.

Osservasi pure, che tutti i corpi che ondeggiano sopra d'un'acqua, la quale gira, raccolgonsi verso il centro del suo moto; quindi è, che con tanta cura si schivano tutti i siti del mare e de' gran fiumi, dove l'acqua mostra di avere un movimento simile; imperocchè una funesta Esperienza ha fatto vedere, che ivi per lo più si perisce.

Ma

S P E R I M E N T A L E. 47

Ma quello che avviene per un eccesso di massa, avverrebbe pure per una maggiore velocità: un corpo circondato da una materia circolante, benchè fosse più grave di coteſta materia, cederebbe nulladimeno alla sua forza centrifuga, se essa materia girasse molto più presto di lui; di maniera che, per esempio, il grado di velocità nell'una, la vincerebbe sul più di massa nell'altro. I turbini, o vortici di vento che sollevano la polvere e la rena, ce ne porgono un esempio ed una prova; imperocchè osservar si può, che questi corpi molto più pesanti che l'aria, nella quale s'aggirano, sono in maggior quantità nel centro del vortice, quando il turbo comincia, e non hanno per anche acquistata tutta la velocità del fluido.

Il Descartes prendendo le mosse da questo principio, aveva ingegnosamente immaginato, che spiegar si potrebbe meccanicamente coteſta forza centripeta de' corpi, che nomasi *gravità*, supponendo attorno del nostro globo un vortice di materia sottilissima, la cui velocità fosse assai grande: imperocchè (diceva egli) questa materia, a causa della rapidità del suo moto, avrebbe molto di forza centrifuga; e tutti gli altri corpi ch'ella incontrasse come fluttuanti, avendone molto meno di essa, farebbono costretti di cederle in tutti gl'istanti, finchè fossero giunti nel luogo più basso, cioè nel centro del moto, od avessero incontrato qualche ostacolo invincibile che gl'impedisse d'andarevi.

Questo filosofo studiando di convalidare il suo raziocinio con alcuni fatti, per rendere la sua
ipo-

ipotefi più verifimile, indicò una molto curiofa Esperienza, che non dobbiam facilmente credere aver egli mai efeguita al fuo tempo, ma chè lo fu dapoì, e che noi qui riferiremo;

VI. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

A. Fig. 22., è un globodi crystallo pien d'acqua, con la quale s'è introdotto un poco di fpirito di terebintina colorato. Questa palla è fof tenuta ne' poli da due pilastrini, o colonnette biforcate in punta. ficchè vi può fopra girare liberamente, quando mettesi in moto la gran ruota verticale B, che comunica per mezzo d'una corda incrocicchiata con la carrucola o rotella C, affiffa all'un de' poli; il piano che fof tenna i due pilastrini o foftegnetti del globo, può alzarfi ed inclinarfi più o meno col mezzo di due cerniere D, D, ed'una vite F che ferve a tenerlo fermo all'altezza che fi vuole; il tutto regge fopra una tavola a treppiedi, che fi mette di livello con alcune viti.

EFFETTI.

1. Quando fi fa girare il globo ful fuo afse collocato orizzontalmente, lo fpirito o l'olio di terebintina, che occupava un piccolo fegmento del globo nella parte fuperiore, dividefi in un gran numero di piccoli globuletti, che nuotano nella maffa d'acqua rinchiufa con effi, e che a poco a poco in un con effa ricevono un moto di

10-

SPERIMENTALE. 49

notazione: veggonsi poscia ristrignerfi sempre più, e formare attorno dell'asse della rotazione comune un gomitol, od involucro, o direm meglio un solido, la cui figura è ordinariamente cilindrica.

2. Dacchè si cessa di far girare il globo di vetro, il cilindro formato dalle parti d'olio colorato, si dilata in prima nell'estremità, e poscia nel resto della sua lunghezza, sino a tanto che venendo il moto a cessare nell'acqua, tutto l'olio si raduna, per la sua leggerezza, nella parte superiore del globo, dov'egli era avanti l'Esperienza.

3. Se si ricomincia il moto di rotazione, e s'inclina l'asse del globo, quando le particelle di olio ivi son raccolte; elleno portansi a poco a poco al polo più elevato, e vi stanno finchè dura quest'inclinazione.

4. Quando, in vece d'olio colorato, mettesi nell'acqua una picciola palla di cera; ella è trasportata nell'asse dal moto di rotazione, e segue di lei lo stesso, che di ciascuno de' globuli d'olio; vale a dire, che se l'asse è Orizzontale, ella stassi per tutto dove s'attrova nell'a lunghezza dell'asse e s'egli è inclinato, il polo più elevato è quello dov'ella s'avvia.

5. Un globulo d'aria, che alla palla di cera si sostituisce, fa veder la stessa cosa; ma se quando esso globulo è nell'uno de' poli, si fermi o si rallenti il moto del globo di vetro, avvien talora che cotesta particella d'aria portasi verso il centro della sfera,

6. Se si mette nel globo una pallottola di cera, che pesi un po' più dell'acqua per qualche

grano di piombo cacciato nel centro, e facciasi poi ella circolare lentamente in distanza d'alcuni pollici dall'asse; raddoppiando allora la velocità, si vede coteſta piccola maſſa, tuttochè più peſante d'un pari volume d'acqua, diſcendere nell' aſſe, ed ivi rimanere coſtantemente, girando ſopra ſè ſteſſa; ed allorchè ſ' inclina l' aſſe della rotazione, in luogo di portarſi al polo più elevato, come la precedente, piglia una ſtrada contraria. Queſta Esperienza è difficile anzi che nò, e delicata, e richiede in chi la pratica un poco d'uſo e deſtrezza; ma quand' anche in dieci volte che un la fa riuſciſſe una ſol volta, queſto baſta per provare il principio, a cui queſto fatto ſ'appoggia.

S P I E G A Z I O N I.

Per ben intendere tutti queſti fatti, biſogna concepire da bella prima la maſſa d'acqua chiusa nel globo di vetro, come ſe foſſe compoſta d'inaumerabili ſuoli fluidi tenuiſſimi, ſoprapoſti l' uno all' altro, e che van ſempre decreſcendo di diametro ſino al centro.

Quando ſi mette il globo di vetro in moto, la ſuperficie ſolida traſcina per lo ſfregamento quella del fluido, che la tocca immediatamente; e però che l'olio colorato è una parte di eſſa, queſti è traſportato dal ſuo luogo, al primo giro che ſi fa del globo. Il ſuo traſportamento fa ch' egli ſi divida; imperocchè venendo più baſſo che prima egli non era, eſigge la ſua leggerezza, che ſalga di bel nuovo; incontra nel ſuo moto l'acqua agitata che lo ſepara, e ciaſcuna
di

SPERIMENTALE. 51

di coteste parti premuta egualmente da tutti i lati dal fluido che la circonda, prende una figura globulosa. Continuando il globo a girare, comunicasi il moto di suolo in suolo a tutta la massa dell'acqua, di maniera che ella si muove poi come un solido; voglio dire, che tutte le parti serbano girando situazioni costanti fra esse. Quindi, siccome tutti i punti della superficie del vetro C, D, E, F, G, *Figur. 23.*, contando da un polo all'altro, additano tante circonferenze di circoli paralleli, parimenti può uno rappresentare a sè medesimo tutti i segmenti d'acqua che a detti circoli corrispondano, come tanti piani circolari, che girano parallelamente sul medesimo asse AB.

Ora se noi considereremo i nostri piccioli globuli d'olio dispersi nell'acqua, vedremo che ciascuno d'essi è sollecitato ad approssimarsi al centro non della sfera comune, ma del circolo particolare nel quale si trova. Quello ch'è in *a*, per esempio, e che gira in quel parallelo, ha bensì, in conseguenza del suo moto circolare, una forza centrifuga, per cui tende verso F, e con la quale trasporterebbesi certamente insieme coll'acqua, se il globo fosse aperto in questo luogo; ma è rinchiuso, e corrisponde di continuo ad un volume d'acqua che ha più massa di lui, e che girando con una velocità quasi eguale alla sua, gli contrasta il sito più elevato, con una forza centrifuga prevalente; lo che lo costringe a cedere sino al centro del moto, dove tal forza è nulla. Ciascuna particola d'olio soggiace all'istesso evento nel segmento d'acqua, ov'ella incontra; perciò tutte vengono a schierarsi nel cen-

52 LEZIONI DI FISICA

to della loro rivoluzione particolare, come le cifre 1, 2, 3, 4, 5, 6, ec. e quest'effetto cessa, subito che la cagione non sussiste più; cioè a dire, che l'olio vi sale per la sua leggerezza rispettiva, quando l'acqua perde la forza centrifuga cessando di girare.

Finchè l'asse della rotazione è orizzontale, e che il moto è uniforme in tutta la massa del fluido, le particelle d'olio schierate nell'asse conservano costantemente la forma d'un cilindro; e per qual ragione avrian da pigliare altra figura? Lo esige forse la figura del vetro, comel'ha creduto un Fisico de' nostri ultimi tempi? questa opinione è insostenibile, non sol perchè è smentita pianamente dall'Esperienza; ma ancor perchè non si trova niente nella teoria delle forze centrali, nè nell'altre leggi del moto, che la favorreggi.

In fatti, quando un corpo più leggiero che l'acqua, è spinto verso l'asse della rotazione comune a tutta la massa; è forse la parte del fluido a lui soprastante che lo sollecita a cadere? o non è piuttosto quella che gli soggiace, che tende a cambiarlo di luogo? Qual parte ha dunque in quest'effetto la superficie del vaso e la di lui figura? Qual ch'ella esser possa quand'il vaso è pieno, io non ci veggo, fuorchè un punto d'appoggio che ritiene il fluido, ma che non muta niente nella direzione delle parti inferiori.

Ma se il discorso lasciasse qualche apparenza di dubbio in tale quistione, sarebbe sempre decisa chiaramente dall'Esperienza. Se la sfericità del vetro fosse capace di convertire per la sua reazione le forze centrifughe particolari di cias-

cun

S P E R I M E N T A L E. 53

cun circolo, in una forza centripeta^m comune, come è stato preteso; dimando, perchè non si vede alcun segno di questa conversione, quando si fan girare con l'acqua delle particelle d'olio, od altra materia leggiera: perchè cotesti corpi, portandosi all'asse, non aspettano mai una figura, che possa far credere ch'eglino tendono ad un medesimo centro? per qual ragione una palla di cera, una bolla d'aria ec. indifferentemente restano in tutti i punti dell'asse, ove s'incontrano.

In fine, per terminar di convincere quelli, che ancor avessero qualche dubbio, mutiamo vasi, mettiamo il nostro fluido in un emisfero, in un cono, in un cilindro: se l'inclinazion delle pareti entrasse per qualche cosa negli effetti, noi vedremmo senza dubbio i corpi leggieri portarsi verso la base dell' emisfero, e del cono, e restare nel cilindro indifferentemente dovunque trovassersi: questa differenza (se ci fosse) darebbe in vero qualche credito all' opinione da noi combattuta; ma il fatto sta, che una simile differenza non vedesi, e fin coloro che più vorrebbon trovarcela, han dovuto concedere, che non ci si trova, ogni volta che ho io lor ripetute quest' Esperienze con tutta l' attenzione, e la cura possibile.

Dopo che han ciò confessato i miei Avversarj, ben poteva io credere, essere le mie prove vittoriose. Con tutto ciò fa mestieri ch'io risponda ad un' altra loro obbiezione. Oppongono esperienza, a esperienza, e dicono: una bollicella d'aria ritorna dal polo verso il centro della sfera, dunque è colà spinta da una forza ch'esser

54 · LEZIONI DI FISICA

non può, se non la forza axifuga, convertita in centripeta per reazione.

Quando il moto è uniforme nel fluido, una palla di cera, una particella d'olio ec. rimane in tutti i punti dell'asse indifferentemente, e per quanto tempo dura il moto uniforme; se la bolicola d'aria lascia il polo per andare verso il centro della sfera, questi è un gioco di mano, che sol può illudere chi non vi pon mente, o chi è troppo nella sua opinione preoccupato; in fatti ciò solo succede, quando si rallenta il moto del globo di vetro; ed eccone la ragione...

Siccome il moto si comunica dalla superficie del vetro alla massa dell'acqua per lo sfregamento, così nè più nè meno si rallenta; ma questi sfregamenti tanto più d'effetto hanno, quanto le superficie a più picciol volume d'acqua corrispondono: quindi è, che la parte del liquido contenuta sotto la superficie solida CH, perde il suo moto molto prima che quella ch'è sotto G, o sotto F; la velocità dunque comincia a scemare ne' poli; e li paralleli, che più s'avvicinano all'Equatore, conservano la loro più lungo tempo che gli altri.

Quando la bolla d'aria è nell'asse in qual luogo che si voglia, ivi è ritenuta dalla forza centrifuga dell'acqua; ma questa forza va scemando come il moto circolare, più presto nel polo che altrove; la bolla d'aria che ivi si trova, esce ben presto dal luogo ch'ella occupa a cagion della sua grande leggerezza; l'inclinazione delle pareti del vetro la conduce obliquamente; ma però che procedendo così, ella incontra in paralleli più vicini all'Equatore, e ne qua-

quali il moto, e per conseguenza la forza centrifuga s'è conservata, vien'ella tosto rispinta verso l'asse, e più vicino al centro, che non era avanti che fosse smossa dal suo luogo.

Con quai fondamenti potrebbesi mai pensare, che questa bolla d'aria in caso simile, abbia una determinazione precisamente fissata nel centro? Avvien per verità, che colà ella sen vada talora; ma quest'è un effetto di qualche accidente, e. g. librazione, o scotimento nel fluido, difetto di posizione nell'asse ec. imperocchè per lo più ella non se ne va a cotesto termine, ovvero l'oltrepassa.

Il moto del fluido più presto rallentato ne' poli che altrove, è altresì la vera cagione, per la quale l'olio schiarato in cilindro attorno dell'asse, dilatasi nell'estremità, tosto che si ferma il moto del vetro.

Finalmente, quando inclinasi l'asse della rotazione, i corpi che ivi si trovano, portansi al polo più elevato, o a quel che lo è meno, secondo che sono opii leggieri, o più pesanti del fluido. Lo che ben prova ancora, che dal centro ai poli non provano alcuna forza, che li solleciti a restare nel centro, e che son ritenuti nell'asse per la forza centrifuga, appresso a poco come farebbono in un tubo, nel dilungo del quale avessero libertà di moverfi.

Rimane a dire, come una palla di cera, resa più pesante dell'acqua, possa essere protrusa al centro, ed ivi ritenuta per la stessa azione, che colà guida un altro corpo più leggiero che il fluido medesimo: produce forse la stessa causa due contrarj effetti?

56 LEZIONI DI FISICA

Se veggiamo andarsene al centro del moto comune un corpo che circola con un fluido, infallibilmente ciò avviene, perchè egli ha meno di forza centrifuga che il fluido; ma tale eccesso di forza in questo, può provenire o dalla sua massa, o dalla sua velocità. Nel caso presente, a cagion della velocità, l'acqua ha questo vantaggio sopra la palla di cera: quand'ella si tiene alcuni pollici distante dall'asse, s'aumenta tutt'in un tratto il moto dell'acqua, che non comunica già subito quest'aumentazione di velocità al picciolo corpo solido; l'eccesso di velocità ch'ella ha sopra di lui per alcuni istanti, supera il suo eccesso di massa ch'è poco notabile; perciò la forza centrifuga del fluido divenuta più grande che quella della picciola palla ondeggiante, mercè questo accrescimento di velocità, caccia quest'ultima fin nell'asse. Tosto che ivi ell'è girata in se stessa, e prendendo le sue parti forze centrifughe direttamente opposte fra esse, il suo peso può solo operare secondo la direzione da un polo all'altro.

APPLICAZIONI.

Da queste illazioni, e da questi effetti si vede che il pensamento del Cartesio circa la causa fisica della gravità, è meno adeguato che ingegnoso imperocchè se fosse vero, che i corpi cadessero verso la terra, per la forza centrifuga d'un vortice fluido, come l'olio o la palla di cera della nostra Esperienza; la lor tendenza non sarebbe sempre diretta al centro del globo, come ce l'additano i più noti fenomeni della gravità; ma a differenti

renti punti dell'asse, lo che dalle precedenti Esperienze si fa manifesto.

Il Sig. *Hughens* guidato dalla sola scorta della teoria, avea veduta questa difficoltà, prima che l'esperienza l'avesse resa sensibile. Trovata egli insostenibile l'ipotesi d'un solo vortice, pensò che il fluido, alla forza centrifuga del quale dovevasi attribuire la discesa de' corpi gravi, formasse un gran numero di vortici, le cui rivoluzioni si facessero per tutti i versi. Questo nuovo sistema non è stato molto più del primo felice: l'insufficienza del primo, ch'è per altro semplicissimo, è già provata: l'altro potrebbe forse soddisfare alla spiegazion de' fenomeni; ma come mai ammetteremo una materia; il di cui moto si fa in tutte quante le direzioni, senza distruggerfi? averà ella su gli altri corpi forza ed azione, senza punto sentirne in sè? e s'ella s'urta e si sospigne per contrario verso come sussisterà il suo moto?

Quest'ultima opinione sopra la causa della gravità, patì molte contradizioni, e diede motivo a parecchi esami molto curiosi; ma per quanto ingegnose sieno state le ragioni portate in suo favore, bisogna concedere, che non sono state forti a bastanza, e che non hanno decisa la questione: poichè l'Academia delle Scienze la propose per argomento del premio dell'anno 1728.

Tra le Dissertazioni mandate all'Academia, quella che fu coronata, suppone nel vortice due soli moti, le direzioni de' quali s'incrocicchiano ad angoli retti; vale a dire, che l'uno ha per asse un de' diametri dell' Equatore, e che l'altro si fa su i poli di questo medesimo circolo, come l'acqua del nostro globo di vetro.

Il

58 LEZIONI DI FISICA

Il Sig. Bulfingero, autor di questa nuova ipotesi, volendo come il Cartesio, rendere sensibile la propria idea con qualche fatto, ha avuta quasi egual fortuna: egli ha escogitato e proposto un mezzo (*Figura 24.*) per far girare nel medesimo tempo il globo di vetro su due assi, che si tagliano ad angoli retti; ma qui non stava l'effettuale: bisognava che la massa d'acqua contenuta in questo globo, prendesse i due moti che si suppongono nel vortice; ma questo è quello che non succede, nè può succedere; io son sicuro del fatto, per aver con tutto lo studio fatta l'esperienza, e ripetuta più volte alla presenza di persone perspicacissime e attentissime. Coll'applicare un segno alla superficie esteriore del globo di vetro, si vede che queste due rotazioni non hanno luogo, se non rispetto solamente al globo medesimo; ma che relativamente a qualche punto fisso, prelo fuori, o dentro della sfera, l'una delle due rotazioni si riduce ad una spezie di moto che descrive un 8. di cifra, e la cui risoluzione intera per conseguenza si fa per due contrari versi in riguardo agli oggetti che sono fuori o dentro del globo: dal che si scorge che l'acqua contenuta in cotesto vase, non riceve nel medesimo tempo due moti di rotazione; come si potrebbe credere, e come taluno ha preteso: imperocchè il moto si comunica dal globo al fluido ch'ei racchiude, mercè lo sfregamento della superficie interiore: ma quantunque questo globo giri per due versi, i punti differenti della sua superficie non descrivono circoli che si tagliano ad angoli retti. Non si dee dunque rimaner sorpreso, che, quando si vien al fatto, i corpi leggieri

S P E R I M E N T A L E. 59

ri mostrino la sola tendenza all'asse, come fan nell'esperienze d'una sola rotazione, e non già una direzione al centro della sfera, come talun s'era immaginato. Vedete le memorie dell'Accad. delle Scienze dell'anno 1741. p. 184.

Quantunque le ipotesi e le sperienze, che abbi-
am riferite, non abbiano il vantaggio di spie-
gare in modo che soddisfaccia, perchè tendano i
corpi fullunari a portarsi verso il centro della
terra; nulladimanco sappiamo, senza poterne du-
bitare, che una materia fluida che circola può
precipitare corpi più leggieri di lei, ed insieme
quelli che hanno più di massa. Se questo incon-
traffabile principio non è stato fin ora con tanto
fortunato esito applicato, che risolva pienamen-
te la quistione, non dobbiamo però disperare,
che avvenir ciò possa un giorno. Parmi più ra-
gionevole credere che potranno altri fare quel-
lo che noi non abbi-
am fatto, che riputare im-
possibile il da noi inutilmente fin ora tentato.

V. E S P E R I E N Z A.

P R E P A R A Z I O N E.

Su le due carrucole orizzontali della macchina
rappresentata colla Fig. 16. convien fissare le due
braccia o sostegni A, B, Fig. 2. e 21. le due
precedenti lettere indicano due scatole che libe-
ramente scorrono sopra due fila di metallo tese
parallelamente da un capo all'altro del sostegnet-
to, e delle quali variar si può il peso, con por-
vi dentro delle rotelle di piombo. C D, son due
altre

60 LEZIONI DI FISICA

altre scatole che sdruciolano verticalmente tra due fila parallele di metallo, sostenute e tese mercè di due paletti d'acciajo drizzati a guisa di forca: ed i queste pure si può variare il peso. Co-
 teste scatole sono congiunte fra esse per via di cordicelle, e di carrucole che si corrispondono: così che C non può avanzarsi verso l'estremità del sostegnetto, senza trasportare altrettanto la scatola D. Sotto ciascuna delle due prime scatole vi ha una piccola molla debolissima, che scorre sopra un appiccagnolo o laminetta i cui denti son quasi a fior del piano, e che impedisce non ritorni la scatola indietro quand'è avanzata. Il sostegnetto dal mezzo della sua lunghezza sino alla sua estremità, da una parte e dall'altra, è diviso in oncie, e linee per regolar la grandezza della rivoluzione di ciascuna scatola A, o B, con la lunghezza del raggio a capo del quale ell'è stata posta.

E F F E T T I.

1. Le due scatole A, B, d'egual peso, come pur l'altre due C, D: poste (le due prime) quattro pollici in distanza dal mezzo dei lor sostegnetti, e facendosi l'una e l'altra girare con velocità eguali, con metter la corda nelle golle delle due carrucole orizzontali, che sono eguali fra esse: cadauna d'esse scatole A, e B, corre nel medesimo tempo verso l'estremità del suo sostegnetto, e trasporta la scatola C, o D che le fa resistenza.

2. Il medesimo effetto succede, quando la scatola A pesa due volte altrettanto che l'altra, ma sì che

S P E R I M E N T A L E. 61

si che questa sia in capo ad un raggio una volta più lungo. Se per esempio A che pesa quattro oncie è nella cifra 4, bisogna collocar D che ne pesa due nella cifra 8.

3. Ma se rimanendo i pesi eguali, mettasi l'una delle due scatole in distanza di 4, e l'altra di 8, questa parte, e la prima resta al suo luogo, se non si accresce il moto.

4. Per ultimo essendo ogni cosa disposta come nel caso precedente, se si vuole che le due scatole A, e C, scappino nel medesimo tempo bisogna raddoppiare il contrapeso di quella che è ad una distanza doppia dal centro, e la cosa riesce.

S P I E G A Z I O N E .

Abbiain detto di sopra; che la stima delle forze centrifuge dipende da tre cose; dalla massa del corpo che circola, dalla sua distanza dal centro del moto, e dal tempo periodico della sua rivoluzione. Nelle sperienze poc' anzi, citate, i tempi periodici sono eguali: perchè le due carrucce orizzontali su le quali sono fermate le due braccia, o sostegni, e che distribuiscon loro l'azione del motore comune, sono tutte e due della medesima grandezza: il mezzo di ciascun braccio è sempre il centro della rivoluzione, e per conseguenza ne vien regolata la grandezza con la distanza che mettesi tra'l centro e la posizione della scatola: la massa del mobile farsi nota dal piombo ond'ella si grava; e puossi conoscere la quantità della forza centrifuga, dal valore del peso C, o D, ch'ella trasporta, e che deve essere considerato come una forza centripeta.

Nel

62 LEZIONI DI FISICA

Nel primo caso, e nel secondo, le forze centrifughe pajono eguali nei due mobili, poichè eglino trasportano nel medesimo instante resistenze eguali. E lo sono infatti: imperocchè da bel-la prima la massa, la distanza dal centro, il tempo periodico, tutto è uguale da una parte e dall'altra: dipoi le masse per verità e le distanze dal centro sono differenti; ma essendo in ragione reciproca, l'una compensa l'altra. Imperocchè ab-biam detto, e provato che la forza centrifuga cresce altrettanto per la velocità che per la massa: ora quì la velocità dipende dalla distanza dal centro, poichè i tempi periodici sono eguali: son due mobili, l'uno de' quali descrive un circolo una volta maggiore dell'altro nel tempo medesimo; e non è ciò, un andare con una doppia velocità? Perciò essendochè 2 di velocità, e 1 di massa equivale a 2 di massa e 1 di velocità, le forze centrifughe de' nostri due mobili sono eguali, quando le loro distanze dal centro sono in ragione reciproca del loro peso.

Nel terzo caso, la velocità è maggiore nell'undue; egli descrive un circolo più grande, nel tempo che l'altro ne percorre un più piccolo, la forza centrifuga deve dunque essere parimenti più grande: ed il quarto caso ci addita che quest'eccesso corrisponde a quello della velocità, poichè la forza che ne risulta, trasporta una resistenza doppia.

APPLICAZIONI.

Quando si è posta l'una delle due scatole A, o B della precedente esperienza, ad una certa distanza.

SPERIMENTALE. 63

stanza dal centro, se il dente dell'appicagnolo non la ritenesse salda, facilmente si capisce che il peso C, o D, trascinerebbe la per lo raggio, all'estremità del quale ella se ne sta. Si vede pure, che quando la si fa girare con bastevole rapidità la sua forza centrifuga la fa andare per un verso contrario, e che i denti dell'appicagnolo non han da far nulla. Ma tra questi due eccessi, vi è un certo grado di forza centrifuga, che farebbe un giusto equilibrio col peso D, e s'egli potesse sussistere, è cosa indubitata che il mobile continuerebbe le sue rivoluzioni, senza avvicinarsi nè allontanarsi dal centro.

Quest'è una cosa che diventa, evidentissima, quando un si riduce alla mente il terzo caso della prima esperienza. Due palle d'avorio, di pesi eguali, legate per un filo e collocate a distanze eguali dal loro moto, fanno reciprocamente equilibrio, e non si smuovono di luogo, per quanto velocemente girar si facciano, essendo le masse eguali, le lor forze centrifughe non possono crescere se non per la velocità; ma fin ch'elleno sono nel medesimo circolo, non si può aumentar quella d'una, senza aumentar nel medesimo tempo ed egualmente quella dell'altra; così le loro forze sono sempre eguali, e direttamente contrarie. In qualunque istante che si consideri dunque uno di questi mobili, egli è in equilibrio tra la sua forza centrifuga e quella del suo antagonista; e per questa egualità di forze opposte, egli si mantiene costantemente alla medesima distanza dal centro, o (lo che è la stessa cosa) le sue rivoluzioni son sempre simili tra esse.

I corpi celesti, hanno de' moti, che spiegar si
devo.

devono secondo questi principj. Se la luna gira attorno della terra, e gli altri pianeti attorno del sole, facendo rivoluzioni così ben regolate, che un Astronomo ne conosce la durata, e l'estensione esattissimamente; ciò è, perchè tutti questi luminari sono nel medesimo tempo da due potenze sollecitati; da un canto la forza centrifuga, che risulta dal loro moto quasi circolare, tende ad allontanarli dal centro di cotesta rivoluzione; dal canto opposto, eglino son ritenuti da una forza centripeta, accordata da tutti i Filosofi, con tutto che non convengano fra loro intorno alla natura della di lei cagione. Se una di queste due forze cessasse d'oprire, questi gran mobili verrebbero a precipitarsi nel centro del mondo; ovvero anderebbono a perdersi nell' immensità de' Cieli; ma simili timori nò, non li abbiamo; e non ci fermiamo in vane finzioni. L' Essere che colla sua sapienza ha ordinato l' Universo nella presente maniera, ha provveduto altresì alla durata delle opere sue, per mezzo di leggi, che dobbiam riputare infallibili, e nella loro infallibilità riposare.

Noi non ci diffonderemo d'avantaggio quì, intorno alla applicazione che si può fare delle forze centrali a' moti de' corpi celesti; poichè ne tratteremo a parte nella Lezione che riguarda il Sistema generale del mondo.

Dopo d'aver fatto conoscere, donde nascono le forze centrali; ed in qual guisa se ne dee fare il calcolo, io potrei esaminare i rispetti diversi, ch'elleno prender possono fra esse, e tutte le sorte di curve che da questi cambiamenti nascer possono: ma tai quistioni non v'è modo di trattarle
con

Fig. 19.




Fig. 21.



Fig. 16.






Fig. 17.





S P E R I M E N T A L E . 65

convenientemente senza servirsi di dimostrazioni geometriche, che da' più di coloro pe' quali io scrivo non verrebbero intese. Oltreacchè ciò farebbe un oltrepassare i confini prescrittimi in queste Lezioni, nelle quali non ho preteso insegnare, se non per via d'esperienza. Su quest'articolo io mi distenderò dunque brevemente, e contenterommi di far meccanicamente ed in parte scorgere gli effetti principali che avvenir debbono, quando le forze centripete e centrifughe non perseverano nel medesimo rapporto nel tempo d'una sola, o di più continuate rivoluzioni.

Per prendere una idea delle forme differenti che ricever può la curva di rivoluzione, per tali alterazioni, pigliamo un filo, cui ripiegheremo in sè medesimo, e di cui congiungeremo i due capi insieme con un gruppo. Sia egli ritenuto da una parte a un piuolo ficcato perpendicolarmente in qualche piano, e dall'altra mantengasi teso coll'estremità d'uno stilo di piombo, come vedesi nella Fig. 25. Lo stilo sarà il mobile; lo sforzo che si farà per tenere il filo teso, esprimerà la forza centrifuga; e la lunghezza del filo, o piuttosto, la distanza ch'egli terrà del piuolo dallo stilo, rappresenterà la forza centripeta.

Se si fa andare lo stilo di piombo sul piano attorno del piuolo, sì che il filo lo tenga sempre ad una distanza eguale, è evidente che la linea della sua rivoluzione sarà un circolo; poichè per tutto il tempo del suo movimento egli sarà stato all'estremità d'un raggio della stessa lunghezza; e con ragione giudicherassi, che un mobile faccia un rivolgimento perfettamente circolare, quan-

do le forze centrali non si mutano nel mentre ch'egli si muove.

Ma se mentre si fa andare lo stilo di piombo si scemerà la distanza che v'è tra l'uno e l'altro facendo prendere al filo la forma di un triangolo, come a, d, c , Fig. 25. o altrimenti; la linea di rivoluzione, in luogo d'essere la circonferenza d'un circolo, sarà tutt'altra curva, come $b c$, la cui natura dipenderà dalle proporzioni che si faranno messe tra i gradi di accorciamento del filo, e le loro durate. Quest' effetto farà capire che un mobile, le cui forze centrali variano fra esse durante la sua rivoluzione, descrive una curva relativa a' cambiamenti delle loro mutue proporzioni; e se ne potran dedurre le conseguenze seguenti.

1. Che se le proporzioni, che faranno state cambiate nel tempo della rivoluzione, si rimettano nel primo stato, avanti ch'ella sia terminata affatto, la curva che il mobile descriverà, qual ch'ella esser possa, rientrerà in sè medesima; e se le ragioni o proporzioni delle forze appresso varieranno, come hanno variato da bella prima, la seconda rivoluzione sarà perfettamente simile alla prima, ec.

2. Che se coteste proporzioni non si redintegrano, e la forza centripeta, per esempio, sia più debole sul principio della seconda rivoluzione, ch'ella non era nel cominciarsi della prima, la curva non sarà di quelle che rientrano in sè stesse; il mobile allontanandosi dal centro descriverà linee spirali più o men regolari, secondo il progresso della forza centrifuga, o la diminuzione della forza centripeta.

Fi.

Fig. 24.





Fig. 22.



S P E R I M E N T A L E. 67

Finalmente per dare un esempio delle curve regolari che possono risultare dalla variazione delle forze centrali; in vece di ritenere il filo, per un solo punto fisso attacchiamo due piuo li, F, f, Fig. 26. e facciam sempre muovere lo stilo in tal maniera, che il filo sia tanto teso quant'esser mai può; avremo, mercè la rivoluzione intera una spezie d'ovale, che i Geometri chiamano *Ellipsi*. Il carattere principale di questa curva è, che due linee tirate da' punti F, f, (che *fuochi* s'appellano) a qual punto si voglia della circonferenza, come FG, fG, ovver FL, fL, costesse due linee, dico, prese insieme, adeguano la lunghezza del grand' asse HL.

Un mobile descrive dunque un'ellipsi, allorchè per le variazioni delle forze centrali, la sua distanza dall'un de' due fuochi F, od f, scema e cresce regolarmente come le linee FH, FM, FG, ec. e reciprocamente quando se gli vede descrivere una simil curva, si può a buona equità conchiudere, che le forze centrali si mettono nelle proporzioni convenevoli, per collocare successivamente esso mobile in tutti i gradi di distanza, ond'essa curva procede.

Questi differenti moti si eseguiscono benissimo, con la stessa macchina, che precedentemente abbiamo adoperata, e che rappresentasi dalla Fig. 16. con aggiungervi ciò che segue.

VI. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

La Fig. 27. rappresenta una tavola rotonda che ha circa due piedi e mezzo di diametro, aperta nel centro con un foro rotondo, largo 3. pollici; questa tavola s'attacca solidamente e parallelamente sopra quella della macchina, Fig. 46. ma in modo tale che resti tra l'una e l'altra una distanza d' in circa un pollice, per lasciar libero il moto della carrucola orizzontale A, o B: nel centro di questa carrucola si ficca con delle viti una specie di *traguado*, o di regolo mobile sgheppo sul dilungo del quale scorre liberissimamente un forte girello incastrato R, che pesa circa 2. oncie, e sotto cui si è attaccata una penna da lapis. In S v' è un tamburro corredato d'una molla, e che tira a sè il girello R, per mezzo d'un cordoncino di seta che s'attiene da una parte al tamburro, e dall'altra a una lumaca che sta fissata al tamburro, e sopra la quale egli fa molti giri.

EFFETTI.

Quando si fa girare la carrucola orizzontale, il regolo si mette in moto; e mentre circola, il girello scorre da r in R, e la penna da lapis segna sopra un cartone che cuopre la tavola rotonda, una linea spirale che comincia in r, e che finisce in R.

SPIE-

SPIEGAZIONI.

Il girello R mosso circolarmente riceve una forza centrifuga: dacchè questa forza vien ad eccedere la potenza della molla che ritiene il mobile, questi s'allontana subito dal centro del suo moto. Egli sdrucchiola in linea retta su'l regolo; ma è una linea retta che si muove anch'ella, e tutti i punti della quale descrivono circoli concentrici. Perciò, passando il mobile per tutti i punti di questa linea, sul fine di' ciascuna rivoluzione si trova nella circonferenza d'un maggior circolo, che quello dov'egli era cominciandola, e da questo doppio moto nasce la spirale che trovasi segnata su la tavola dopo l'esperienza.

APPLICAZIONI.

Per via di linee simili a quella che abbiain testè data a conoscere, vengono al centro del moto tutti i corpi che circolano con altri, la forza centrifuga de' quali prevale. L'olio colorato del globo ripieno d'acqua, la paglia che si fa girare col grano per separarnelo, i corpi che ondeggiano sopra un'acqua la quale gira, ec. tutti cotesti mobili non vengono in linea retta al centro comune; ma circolando in tal maniera che la curva, cui descrivono rientrando al di sotto di sè medesima, diminuisce fino a zero l'estesa delle sue rivoluzioni; lo che è la stessa cosa che andare al centro per una linea spirale.

VII. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Rimangono le cose disposte come nell'esperienza precedente, eccettuato solamente che invece del tamburro con molla, si mette una carrucoletta, la quale gira orizzontalmente; e nel punto T, *Figura 28.* un'altra carrucoletta, l'asse della quale è altresì verticale. Di sotto il girello o scatollino V v'è altresì una carrucola, che gira sulla penna da lapis; ed un filo, le cui estremità sono insieme legate, come quello della *Fig. 25.* abbraccia le tre carrucole.

EFFETTI.

Quando si mette il regolo o bastone in moto con una sufficiente velocità, il mobile V descrive esattamente l'ellissi TVX, i cui due fochi sono TY; e se farà più rivoluzioni, e se farà sempre ripassando su la medesima linea.

SPIEGAZIONI.

La forza centrifuga del mobile tiene sempre il filo tanto teso, quanto lo può essere; ma a cagione delli due punti fissi TY, la sua distanza dal punto Y scema e cresce successivamente, e regolarmente, come quella del lapis dal punto F della *Fig. 26.* laonde la sua rivoluzione si fa puntualmente in una linea simile a quella di cotesta figura




Fig. 26.




Fig. 27.

SPERIMENTALE. 71

figura; e però che le circostanze restano le medesime; nel tempo delle rivoluzioni seguenti, il mobile continua altresì a muoversi, nella medesima ellissi.

APPLICAZIONI.

Tanto più importa di ben conoscere l'ellissi, e le sue proprietà principali, quanto che tutti i corpi celesti fanno le loro rivoluzioni in linee curve di questa specie; oggidì l'Astronomia, di gran lunga più illuminata, ch'ella non era ne' tempi più rimoti, non ammette più que' circoli eccentrici, ai quali s'era costretto di ricorrere, per spiegare certe variazioni che da lungo tempo s'osservano nelle distanze degli Astri: ed è un'opinione quasi universalmente ricevuta, che gli *afeli* e *perielj* de' pianeti primitivi, che gli *apogeo*, e *perigeo* della Luna sono necessarie sequele d'un moto elliptico; ma non anticipiam qui ciò che dovrem dire altrove intorno ai moti celesti contentiamoci d'aver stabiliti de' principj, che ripeteremo quando l'ordine delle materie esigerà che si spieghin da noi la forma, la durata, e le proporzioni ec. di coteste rivoluzioni, e che si studj di additarne le cause fisiche.

 LEZIONE SESTA:

Della Gravità, o sia del peso de' Corpi.

CHiamaſi *gravità*, o *peſo*, quella forza che fa cadere i corpi dall'alto al baſſo, quando alla loro caduta niente ſi oppone; o quando gli oſtacoli non ſono ſufficienti per ritenerli.

I Filoſofi non ſon fra lor d'accordo intorno alla cagione di cotal forza. I diverſi pareri, che queſta quiſtione ha fatto naſcere, poſſono in due claſſi noverarſi; gli uni riſguardano il peſo come un principio della natura, come una qualità inerente e primordiale de' corpi, che può non aver altra cagione, ſe non ſela volontà liberiffima del Creatore; e con ciò troncano tutte le difficoltà in un tratto: gli altri pretendono, ch'egli ſia l'eſſetto di qualche materia inviſibile; ma le prove, ſu le quali ſ'appoggiano (convien dirlo), ſoggiacciano a grandi obbiezioni, alle quali non ſembra che pienamente ſieſi per anche riſpoſto.

Dire con Ariſtotile, e co' ſuoi ſeguaci, che i corpi portandoli dall'alto al baſſo, ubbidifcono ad un principio che li fa cadere: non è dir coſa, che poſſa recar chiarezza alla mente, nell'oſcurezza di queſta materia.

Conſiderare col Neuton la gravità de' corpi ſul-
lunari come natural conſeguenza d'una gravita-
zio-

zione generale, che si osserva in tutta la natura, e di cui ha gli calcolate sì bene le leggi; è un abbandonar la causa per attenersi all' effetto.

Pretendere colla maggior parte de' Neutroniani d'oggidì, che questo peso de' corpi che ci son d'intorno, è solo un esempio particolare d'una tendenza o *attrazione* reciproca, che tutti gli esseri materiali naturalmente hanno gli uni verso gli altri, per la sola volontà di Dio; è introdurre in Fisica una novità che è passata per l'animo a Neuton, e prima di lui a parecchi Filosofi* ma la quale egli non ha voluto che a lui s'imputasse, se dobbiam credere alle sue proprie parole (a); ma eziandio attribuire con Gassendi; la discesa dei corpi a certi effluj d'una materia, che operi come quella della calamita; che altro è se non indicare una cagione molt'oscura, troppo indefinita, e la di cui esistenza non è appoggiata a verun che di certo?

Finalmente veduto abbiamo, ragionando delle forze centrifughe, quale sia stato il sentimento del Cartesio su tale quistione, in che manchevol sia la sua ipotesi, quello che fatto abbiano parecchi grand'uomini per renderla plausibile, per difenderla; e considerato bene il tutto pare che coloro i quai vorranno sol dare orecchio, sopra la fisica cagione della Gravità, a spiegazioni intelligibili nel medesimo tempo, e soddisfacenti, cercar non le debbono in alcun'opera, che fino al presente nota ci sia.

Atteniamci dunque a' Fenomeni; se la nostra
cu-

* Keplero, Frenicle, Roberval.

(a) Phil. Nat. Princ. mathem. Tom. I. pag. 11. ed. Genev.

74 LEZIONI DI FISICA

curiosità non coglie nella cagion che si cerca, ab-
biam con che risarcirla; voglio dire con la cogni-
zion degli effetti: quanto è quella incerta, tanto
ben provata è questa e palese; e quello che po-
trem di qui imparare, è del pari curioso che
utile.

Avanti il Galileo, cioè quasi un secolo fa, po-
co sapevasi intorno alle leggi del peso; a cotesto
Filosofo Italiano non s'iam tenuti delle scoperte più
interessanti, che si sieno fatte su questa materia.
La sua teoria è stata generalmente ammessa da
tutti i dotti; e sopra i suoi fondamenti, hanno
e *Hughens*, e *Neuton*, e *Mariotte* faticato da
poi, con tanta riuscita, e con tanto applauso. Io
non propongo d'inferire nella presente Lezione
tutto quello che questi grand'uomini hanno in-
segnato intorno alla gravità; un'impresa simile
eccederebbe i confini prescrittimi, e convien in
oltre studiare ne' scritti loro originali, quando un
voglia sapere tutto il noto su quest'argomento;
ma aderendo alle piante dell'opera mia, già sul
bel principio proposta, sceglierò solamente le più
utili proporzioni, e le convaliderò con prove di
esperienza.

Tratterò in prima degli effetti che provengo-
no dalla gravità sola; e quindi passerò agli ef-
fetti, ne quali cotesta forza entra sol come par-
te.

PRIMA SEZIONE.

De' Fenomeni, nè quali la Gravità
adopera sola sul mobile.

NON si debbon confondere questi due termini, *gravità* e *peso*, quando si prendono nel senso assoluto; cioè, quando quel che esprimono s' intende d' un solo corpo, senza alcuna comparazione con altri corpi. Per *gravità* devesi concepire la forza che sollecita i corpi a discendere, e che lor fa percorrere dall' alto al basso un certo spazio, in un dato tempo. Per *peso*, intendiamo la somma delle parti pesanti, che sono contenute sotto il medesimo volume.

La gravità appartiene egualmente a tutte le parti d' un medesimo corpo, sieno o unite, o separate; coteffa forza non è per questo accresciuta, nè diminuita; ma il peso d' un corpo si cambia, come la quantità di materia che lo compone. Lascinsi cadere nel medesimo tempo due oncie di piombo, elleno discenderanno colla medesima velocità, o stieno insieme attaccate, o separate che sieno; ma il peso nell' una delle due, è sol la metà di quel ch' egli sarebbe, se facessero insieme un medesimo corpo.

Si può dunque, dire, parlando accuratamente, che un picciolo corpo ha tanto di gravità, quanto un più grande, quantunque abbia meno di peso,

76. LEZIONI DI FISICA

so, perchè l'uno e l'altro tendono dall'alto al basso con la medesima velocità.

Ma quando si paragonano due materie insieme, rispetto a' loro pesi, e si prende un volume determinato per termine di comparazione; e. g. quando si paragona un pollice cubo d'acqua con un pollice cubo di mercurio, il peso paragonato chiamasi gravità *specificca*, vale a dire la quantità delle parti pesanti che appartiene specialmente a tale o tal materia, sotto un dato volume. Dirassi adunque, per esempio, la gravità (sottintendendo *specificca*) dell'acqua è a quella del mercurio, come 1 a 14: e si vorrà dire che questo secondo fluido, dato egual volume, ha 14 volte più di peso che il primo. Sul fine dell'Idrostatica, noi daremo una tavola delle gravità specifiche delle materie più volgarmente note; ma prima di venire a questo esame, tutto lo che diremo, si dovrà intendere della gravità assoluta.

Benchè non si possa dire che la gravità è essenziale alla materia; mentre questa si può concepire senza tale propensione a portarsi verso il centro della terra; nulladimeno una lunga e continua esperienza non ci permette di credere, che di tutti i corpi che sono in poter nostro, alcuno ve ne sia da questa affezione esente. Se alcuni Filosofi hanno creduto darsi de' corpi naturalmente leggeri, sono stati in ciò illusi dalle apparenze, ed ignorarono cose, le quali si son sapute di poi. Que' corpi, ch'essi han. creduto muoversi dall'ingiù all'insù, come i vapori, il fumo, la fiamma ec. non aspettano tale direzione contraria a quella della gravità, se non perchè sono incerte circostanze, che veli sforzano. Costeste cagio-

S P E R I M E N T A L E. 77

ni si faccian cessare, e presto si vedranno cadere come tutti gli altri corpi, e prostare colla loro caduta, che pesano com'essi, e pel medesimo verso.

PRIMA ESPERIENZA.

P R E P A R A Z I O N E.

Si mette su la piastrina d'una macchina pneumatica, un corpo di candella grossa accesa, ovvero un pezzo di carta ammollata in un liquore fatto collo stagno e col mercurio, e che fuma assai; sopra vi si mette un recipiente cilindrico di vetro, che ha 4. pollici di diametro, ecirca un piede d'altezza; e si fa il vuoto più prontamente e più perfettamente che sia possibile. Vedi la *Figura 1.*

E F F E T T I.

Dopo alcune pinte dello stantuffo, la fiamma della candela si spegne, e quando l'aria è sufficientemente rarefatta, il fumo della meccia, od il vapore, che si solleva dalla carta, ricade a modo de' corpi gravi, e si dilatta su la piastrina.

S P I E G A Z I O N I.

Non potendo la fiamma sussistere, in un'aria troppo rarefatta, per le ragioni che diremo in altro luogo; quando si è diminuita la densità di quell'aria che è nel recipiente, la candela si estingue; ma quando quest'aria è rarefatta ad un certo

78 LEZIONI DI FISICA

to grado, non solamente il fumo od il vapore non si solleva più, ma quello stesso che era giunto alla sommità del recipiente, precipita, però che il fluido che lo circonda, sendo men di lui pesante specificamente, non lo può solleccitar ad ascendere, nè efficacemente opporsi alla sua discesa. Non si debbe considerar leggermente questo principio mentr'egli serve a spiegar un gran numero di fenomeni di tale spezie. Esaminiamo dunque parte a parte, quello che succede nella descritta esperienza, e vediamo come l'aria ed il fumo cambiano di gravità rispettivamente l'uno all'altro.

Una materia rarefatta è quella, che sotto un dato volume, non ha più tanto numero di parti proprie, quanto n'avea avanti la sua rarefazione. L'aria del recipiente dopo aver più volte sospinto lo stantuffo, è ridotto ad un picciol numero di parti, senza perder niente del suo volume, imperocchè ella continua a riempire il recipiente; ciascuna porzione casualmente presa in cotesto vase, contiene dunque men di particelle d'aria, ovvero è composta di parti molto più segregate l'une dall'altre, di quel ch'erano avanti la rarefazione. Laonde corrispondendo il peso al numero delle parti materiali, una linea cubica di cotest'aria, pesa men ch'una linea cubica della stessa aria non rarefatta. Quello che diciamo di questo picciol volume, debbe intendersi proporzionalmente, d'una serie di volumi simili, posti gli uni sopra degli altri in forma di colonna; da che si può capire, che se la massa d'aria contenuta nel recipiente è divisa in un certo numero di colonne simiglianti, ciascuna d'ef-

SPERIMENTALE. 79

d'esse peserà più o meno, secondo che la malsa totale sarà stata più o meno rarefatta.

Il fumo, od il vapore, la cui sorgente sta nel fondo del vaso, può altresì essere considerata sotto volumetti, la serie de' quali sarà una colonna; e se si paragonerà uno volume di vapore ad un pari volume d'aria, si concepirà che quegli de' due, il quale ha più parti pesanti, ha più forze per gire al luogo più basso, o per ivi starsene.

Laonde l'aria essendo nel suo stato naturale, solleva i vapori, il fumo, la fiamma ec. perchè, con egual volume, ell'ha maggior peso; ma quando ella si è rarefatta, cioè quando si è diminuito il numero delle parti pesanti di questo egual volume, non può più sollevarli, e nè pur sostenerli; ed il fumo sparso pel vaso, trovandosi allora più pesante relativamente all'aria, che ha cambiata densità, la smuove anch'egli di luogo, per la sua gravità naturale.

APPLICAZIONI.

Da tutti i corpi, che sono su la superficie della terra, si distaccano continuamente de' corpuscoli, che quando han lasciata la massa della quale eran parte, dispergonsi e sollevansi nell'atmosfera, finattanto che certe circostanze li determinino a ricadere. Tai piccioli corpi, conosciuti sotto il nome di *vapori*, e di *esalazioni*, sono la materia di parecchi fenomeni maravigliosi, stupendi, e necessarij relativamente a' bisogni nostri. Si farà da noi menzione altrove delle varie forme che prendono, e de' lor principali effetti, quì non

VO-

30 LEZIONI DI FISICA

vogliam favellare, se non de' loro moti, cioè della maniera, onde si sollevano, e ricadono; a che naturalmente ci guida l'Esperienza testè spiegata.

Questa quistione si può ridurre a quattro capi principali 1. come tai corpicelli si distacchino dalle loro masse; 2. per qual cagione si sollevino nell'aria; 3. in qual maniera vi si sostengono ad una certa altezza; 4. perchè interviene, che ricadano verso la superficie della terra.

In quanto alla prima dimanda, l'opinione più universalmente ricevuta è, che sul nostro globo, e dentro del medesimo regna un certo grado di calore, che mantiene in moto le parti insensibili di tutti i corpi. Questo moto, dicono, determina le più sottili di cotai parti, e per conseguenza le più mobili, a lasciar la massa comune, come visibilmente osservasi nella superficie d'acqua fatta riscaldare, de' cibi e delle frutta che si fan cuocere.

E' molto verisimile, che il calore naturale od artificiale, sia la cagion principale di quest' effetto; ma si dura fatica a credere, che questa ne sia la sola cagione, quando si considera, che l'evaporazione non scema sempre a ragguaglio del calore. Ne' più rigidi Inverni, si vede talora da un giorno all'altro sparire la neve, che copriva la superficie della terra, e l'Esperienza ha fatto vedere a molti valenti Fisici, che il diaccio scema notabilmente nella più fredda aria, e meno a' raggi del Sole esposta.

Io non sò, se giusta l'opinione d'un Autore *
ver-

* Mushenbroek ne' suoi Coment. su' le Sperienze di Fiorenza, 1. part. p. 137. ediz. di Leide 1731.

versatissimo nella Fisica Esperimentale, dovremo quindi conchiudere, che il ghiaccio ha un principio interno di dilatazione, che non è la materia del fuoco, nè l'grado di calore che in esso è potuto conservarsi, ma bensì il miscuglio d' un altra materia sottilissima, che lo fa, direm così, fermentare.

E perchè non potremmo noi attenerci a' principj noti ed ammessi da tutti i Fisici, con dire, che ne' casi, ne' quali non appar che si possa attribuire l' evaporazione alla sola azione del fuoco, debba cercarsene la cagione nella grandezza delle superficie nello stato loro, o nella natura del fluido ambiente, relativamente a quella de' corpi che svaporano. Imperocchè, supposte eguali tutte le altre cose, è certo, che un cubo di ghiaccio isolato, presenta all' aria sei volte più di superficie, che l' acqua d' un vase, la cui apertura fosse eguale ad uno de' lati di questo cubo: le parti evaporabili hanno adunque sei volte più di libertà di sfuggirsene dalla massa.

Ma, date superficie eguali in apparenza, non si ha egli fondamento di credere che le parti del ghiaccio ricevono maggior impressione dall' aria, che quelle dell' acqua? Non va la cosa forse del pari in cotesto fluido, come negli altri? secondo ch' egli s' avvicina alla congelazione, la sua fluidità non scema ella forse a grado a grado? le parti non comincian forse ad aggomitolarsi, prima che legarsi insieme? E se il ghiaccio non fosse altro, che un adunamento di tali piccole masse, o di tai piccioli composti più grossieri che le parti dell' acqua, la sua superficie scabra, se non a nostri sensi, almen ad un tatto proporzionato a quel-

82 LEZIONI DI FISICA

le piccole rugosità, non farebb' ella sì che l'aria che lo tocca, più contra lui valesse?

Se quest'è una mera congettura, rispetto al ghiaccio, negar non si può ch' ella sia cosa evidente almeno almen nella neve. Alla prima occhiata s' osserva, che la di lei superficie è un aggregato di molecole leggiere e permeabili, dirò così, da tutti i lati; e tal leggerezza è tanto più grande, quanto in più freddo tempo s' è la neve formata.

Ma quale vantaggio pretendiam noi ricavare da quest' aumentazione di superficie, per ispiegar il fatto che s' ha tra mani? Supponendo che la massa d' aria, la quale attornia i corpi, possa contribuire alla loro evaporazione, d' altra guisa che col grado di calore ch' ella può comunicar loro, certo è che quest' aria averrà tanto più d' azione sopra i corpuscoli evaporabili, quanto sarà maggior l' estensione in cui li toccherà, o (ch' è la stessa cosa) con quanto meno di facce cotesti piccolì corpi saranno alla lor massa comune attaccati. Dir si può dunque in generale, che le medesime parti d' un corpo (esempigrazia dell' acqua) sono tanto più disposte ad esalare, quanto sono più isolate; e che in conseguenza, la neve, o tutt' altra congelazione di questo genere può svaporare istesamente, e forse più che l' acqua contenuta in un vase.

Ma che può far (dirassi) l' aria esterna sopra coteste piccole parti quasi isolate?

Non solamente ella averà più di valore e d' agevolezza per distaccarle dalla massa, urtandole da un lato e dall' altro; ma adoprerà in oltre per direttamente traporarle, gli stessi mezzi, che le fanno ascendere, quando son distaccate del tutto.

Di

SPERIMENTALE. 83

Di questi mezzi il più noto e più generalmente ricevuto, si è, l'eccesso di gravità dell'aria medesima, si dice comunemente, che quei corpicelli, i quali formano i vapori e l'esalazioni, essendo specificamente meno pesanti che l'aria che li circonda, si sollevano nell'atmosfera, come il fumo nella nostra Esperienza s'è sollevato nell'aria del recipiente, e che salgono così fin nella mezzana regione, ove trovansi in equilibrio con un'aria più rara: la difficoltà è sempre stata di fare intendere, come le parti svaporate de' corpi terrestri potessero acquistare questa leggerezza rispettiva, capace non sol di sollevarli al di sopra dell'aria, ma ancora di vincere la resistenza dello sfregamento, che di continuo s'opponè alla loro ascesa: si dura sempre fatica a comprendere, come l'acqua, per esempio, possa diventar leggiera più che un fluido, il quale, ad egual volume, pesa circa 800. volte meno di lei.

Quando si suppongono coteste particelle divise gran fatto, la loro estrema picciolezza ajuta a capire, com'elleno si sostengano in alto, mercè lo sfregamento, che cresce come le superficie moltiplicate con la divisione; ma questa risposta, che leva una difficoltà quando si vuol solamente spiegare la sospensione de' vapori, ne fa nascer un'altra notabilissima, quando si esamina la lor salita. Imperocchè il medesimo sfregamento che le sostiene, fa lor ostacolo, quando hanno a cadere, e quest'ostacolo è tanto più grande, quanto elleno son più divise.

In oltre, che si guadagna alla fine con questa divisione, se ciascuna parte (per picciola che sia) immediatamente circondata d'aria, riman tale

84 LEZIONI DI FISICA

qual era nella massa ond' ella è sfuggita? Il volume d'aria che le corrisponde, non decrebbe forse colla stessa proporzione? E se l'acqua in generale pesa 800. volte più che l'aria, la proporzione si troverà ne' più piccioli volumi, come ne' più grandi.

Delle due cose, l'una dunque ha da seguire: o che le parti ch' esalano da' corpi, cambiano stato distaccandosi dalla massa, o che l'aria che li tocca, impiega per via trasportarle un altro mezzo fuor della sua gravità.

Questa considerazione ha prodotta alcune ipotesi molto ingegnose: E' stato da alcuni supposto, che ciascuna di coteste particelle fosse un palloncino pieno d' un aria sottili, dilatata dal calore, appresso a poco come le bolle di sapone, con che si trastullano i fanciulli. „ Tale veschi-
„ chetta, dicono, è più leggiera che il volume
„ d'aria, al quale ella corrisponde nell' atmosfe-
„ ra, ed il suo eccesso di leggerezza può esser
„ tale, che superi ancor la resistenza dello sfre-
„ gamento.

L'immaginazione è ingegnosa, non si può negarlo, ed io credo, che non sarebbe impossibile di conservarle qualche verisimiglianza, ma se è necessario del calore, per dare a cotesti palloncini un volume sufficiente, noi non avremmo vapori in tempo d' Inverno; o se così poco n'abbisogna per gonfiarli, come non scoppierebbero nella State?

Altri ci sono stati, che cercando nella dilatazione de' vapori, un principio di leggerezza sufficiente, hanno considerato le loro parti, come tante molecole, i cui pori ingranditi e distesi dall'

SPERIMENTALE. 85

dall'azion del fuoco, aumentano il lor volume altrettanto e più, di quel che la loro primiera densità eccedeva la densità dell'aria. Secondo questa opinione, una particella d'acqua ridotta in vapore, farà, per esempio, 1000, ovvero 1200 volte più grande ch'ella non era, e per conseguenza corrisponderà a un volume d'aria più che bastante per sollevarla. Coteſta grande dilatabilità de' vapori, è fondata sopra esperienze che non si possono rivocare in dubbio, e le quali noi descriveremo, quando lo permetterà l'ordine delle materie; ma ella esige un grado di calore molto più grande, che quello il quale regna ordinariamente ne' corpi, che cominciano a ivaporare; e se staccandosi da quest'esempio, quando si veggion vapori ascendere in un tempo fresco conchiudesi che fa tanto caldo, quanto basta per dilatarli a segno d'esser più dell'aria leggieri, quest'è (per quanto pare) un supporre ciò che è in quistione: io per me credo, che passi un gran divario tra la semplice evaporazione, e la dilatazion de' vapori.

Ma se il calor naturale non può d'ordinario se non servir a distaccarsi coteſti corpuscoli dalle loro masse, e non li mette sempte in istato di salire; se l'aria da un altro canto non può col suo peso solo sforzarli ad ascendere tali quali sono; qual è dunque il mezzo che la natura aggiunge a questa prima cagione? Imperocchè è certo, che i vapori si sollevano in ogni tempo colla sola differenza dal più al meno.

Se m'è lecito arrischiare què le mie congetture, dirò che l'aria dell'atmosfera fa nel medesimo tempo l'ufizio di dissolvente, e di spugna,

verso i corpi ch'ella tocca immediatamente. Come s'intende, che diventi salata l'acqua dolce, allorchè ella si mette in un vafe che ha in fondo del sale? Questa ragion se ne dà, che insinuandosi il liquore ne' pori del corpo solido, si ricongiunge, e si raduna egli medesimo da tutti i lati, sotto le parti che compongono la superficie, le solleva finalmente, e le divide a tal grado, che coteste parti medesime entrano ne' pori dell' acqua, alla stessa maniera, e per la stessa cagione che quelle dell' acqua han penetrato il sale. Quanto più sono isolate le parti del sale, quanto più il sale è poroso, e quanto più è umido prima che s'immerga, altresì la sua dissoluzione diventa facile: e ne appar chiara la ragione, senza bisogno di dirla; così pure i corpi che svaporano, continuamente immersi nel fondo d'una massa d'aria spugnosa, somministrano una quantità di vapori tanto più copiosa, quanto le loro parti sono più esposte all'azione di questo fluido, e quanto più egli stesso per il suo stato attuale, è disposto ad ammetterli ne' suoi pori. Non oserei dire, che l'aria s'insinua ne' pori de' corpi solidi, o de' liquidi, come l'acqua nel zucchero, o nel sale che ella discioglie: ma affermerò cosa credibilissima, quando dirò che, essendovi in tutti i corpi moltissim'aria disseminata, le loro superficie sono composte di molecole, delle quali un grandissimo numero è mera aria, e che quest'aria comunica con altra, che similmente è parte degli strati inferiori; così che la materia propria di questi corpi quando sono d'aria circondati, rassomiglia ad un grano di sale umido, che si tuffa nell'acqua, e che è tanto più dissolubile, quan-

SPERIMENTALE. 87

to è stato più penetrato d'acqua, prima che esser tuffato. La superfizie che ci pare la più liscia ed eguale, presenta dunque all'aria che la tocca, parti isolate, e che s'attengono alla massa sol per un picciol numero di punti; e però che non vi ha alcuna nota materia, in qualunque stato ch'ella esser possa, le cui parti sieno perfettamente in quiete, l'une rispetto all'altre, ne segue che nella superfizie de' corpi non v'abbia veruna particella, la quale non sia disposta più o meno a cedere a' conati dell'aria, che l'attornia.

Ma se l'aria è, come c'immaginiamo che sia per spiegare la sua elasticità, un corpo spongioso, le di cui parti rassomigliano a piccioli filamenti, o lamette spirali; per trasportar le picciole parti sopraccnate de' corpi, non abbisognerà ella d'altra forza, fuorchè di quella che si osserva tutto dì ne' corpi di tale spezie; imperocchè, siccome il sale si solleva in una massa d'acqua, a misura che quest'acqua lo discioglie, quantunque le sue parti sieno più pesanti, che quelle dell'acqua; siccome l'acqua si solleva nel zucchero ad onta del suo proprio peso: così si potrà dir parimenti che i vapori e l'efalazioni, senza diventar più dell'aria leggiere, s'alzano nell'atmosfera, secondo la proporzione che v'è tra esse, e la porosità del fluido.

Verò è, che non si sà appuntino, come i liquori s'innalzino al di sopra del loro livello, in una spugna, ne' tubi capillari, ed altri corpi simiglianti; imperocchè se taluno dicesse, essere l'attrazione cagion di quest'effetto, non soddisferebbe se non ad una parte de' Filosofanti, la quale non è nè men quella, che ammette solo

88 LEZIONI DI FISICA

idee chiare ed intelligibili; ma in quanto al fatto si è perfettamente d'accordo; e quando io dico che i vapori ascendono nell'atmosfera, come l'acqua in una spugna, non pretendo rifarmi sino alla prima cagione; m'attengo solamente alla cagion prossima ed immediata; e a dir tutto in breve, non ho altra mira che di spiegare un fatto con un altro, lo che in Fisica è permesso.

Non posso qui estendere questa idea quanto bisognerebbe, per darle tutta la verisimiglianza ond'ella è capace; una tal digressione ci allontanerebbe troppo dal nostro oggetto presente; averò occasione di ripigliarla, e ragionarne più a dilungo, quando si toccherà l'argomento de' Tubi capillari; qui non soggiungo, se non che questa ultima cagione insieme coll'altre, da noi non rigettate, diventa sufficiente per formare, e per sollevare i vapori, potrà nè più nè meno giovar a tenerli sospesi, fin a tanto che cangiandosi l'atmosfera di densità, o per compressione, o per condensazione, od eziandio per dilatazione, costesti piccoli corpi sospesi si ravvicinino e formino masse più pesanti, ovvero s'abbandonino al loro proprio peso siccome vedesi avvenire nel recipiente d'una macchina pneumatica, ove appare una piccola nebbia dopo le prime pinte dello stantuffo, perchè l'arie rarefacendosi, abbandona i corpi stranieri ch'ella contiene *.

Per risarci dalla nostra prima Esperienza, è dunque certo che Aristotile, e quelli che l'hanno seguitato, si sono ingannati, quando hanno voluto, che vi fossero de' corpi, i quali naturalmente tendessero a moverfi dall'ingiù all'insù.

Quello

* Mem. de l'Academ. des Scienc. 1740. p. 252.

Quello che noi detto abbiamo intorno ai fatti che li hanno in errore indotti, basta per far intendere, non darsi leggerezza assoluta, e che i corpi, impropriamente chiamati leggieri, sono quelli che hanno poco peso, o poca materia propria sotto un grande volume.

Si può nella gravità considerare, come in qualunque altra forza, la direzione, e l'intensità, vale a dire, la misura o la quantità della sua azione sopra i corpi.

La direzione della gravità è sempre la stessa; i corpi che cadono liberamente, si dirigono da sé medesimi verso la superficie della terra, per una linea perpendicolare all'Orizzonte, come appare nel farsi la prova sopra d'un'acqua stagnante e quieta; e se qualche volta descrivono cadendo, linee oblique o curve, questo avviene, perchè vi sono sforzati da ostacoli; tal è la discesa d'un pendulo, nel tempo della sua mezza vibrazione; egli non descriverebbe già un arco di circolo, se non fosse ritenuto dal filo; che lo costringe a girare attorno del punto di sospensione.

In vece di reprimere la direzione della gravità con una perpendicolare all'Orizzonte, bene spesso ella s'esprime con una tendenza al centro della terra, lo che significherebbe la stessa cosa, se il nostro globo fosse perfettamente sferico; imperocchè allora tutti i raggi prolungati dal medesimo punto, farebbono altrettante perpendicolari alla superficie. Ma questa ipotesi non è più nè ricevuta, nè degna da ammettersi; e se il globo terrestre è uno sferoide schiacciato verso i poli, come s'ha gran ragione di credere, il compasso

90 LEZIONI DI FISICA

passo e la riga fan vedere, che le linee dirette perpendicolarmente a tutti i punti della sua superficie, non mettono capo al vero centro, ma a diversi punti, che compongono uno spazio attorno del centro. Ma essendo questo spazio piccolissimo, a causa della pochissima differenza tra la figura attribuita alla terra, e quella d'una sfera perfetta, si può senza errore sensibile, e quando non trattasi di questa questione, ritener l'espression comune, e prendere il centro della terra per quello de' corpi gravi.

In quanto all' intensione della gravità, si può dimandare, 1. s' ella sia la stessa in tutti i corpi, in tutti i tempi, in tutti i luoghi. 2. S' ella varia secondo lo stato de' corpi. 3. Se può crescere nello stesso mobile, e come i suoi progressi si fanno,

L'esperienza non può insegnarci, se non a un dipresso, quanto di spazio un corpo percorra in un certo tempo, in virtù della gravità che l'avviva, perchè egli ha sempre da vincere ostacoli inseparabili dallo stato naturale, come ne provano i corpi, che ubbidiscono a qualunque altra potenza. La resistenza de' mezzi, che varia come le loro densità, la figura del corpo che cade, la porzione della sua massa col suo volume, e qualche altra considerazione, di cui parleremo in appresso, impediscono che accuratamente si sappia la misura della primitiva gravità, e tale, quale sarebbe, se da cause straniere diminuita non fosse. Si sa solamente, che a Parigi, per cagion d' esempio, o ne' contorni una palla di piombo, od altro qualunque corpo, il quale abbia molta materia con poco volume, percorre nell' aria libera
in

In circa piedi 15. di Francia nel primo secondo della sua discesa ; fra poco si vedrà , perchè io abbraccio tutte queste circostanze in questa proposizione.

Credevasi un tempo , che la gravità ed il peso fossero sinonimi ; e che i corpi cadessero tanto più presto , quanto più di massa avevano . V'era in fatti qualche verisimiglianza nel credere , che un mobile composto di quattro parti pesanti , dovesse tendere maggiormente al termine della gravità , che un altro mobile , il quale non ne avesse se non una o due ; e ciò che finiva d'indurre in errore , si è , che vedevasi una penna , una carta , un fiocco di lana ec. cader sempre più lentamente d'una pietra , d'un pezzo di metallo ec. ma un *più* , od un *meno* non decidono niente , quando non vi è proporzione con la causa che si sospetta . Vide bene il Galileo , come avea veduto Aristotele , che una piuma cade men velocemente d'una lira di piombo ; ma egli misurò questo *meno* , lo comparò coll'eccesso di massa del corpo più a cader pronto , e trovò che non corrispondeva alla differenza che v'è tra i pesi de' due mobili . S'appigliò dunque ad un'altra idea della gravità , ed invece di pensare , come fin allora s'era pensato , che più fosse di gravità nel piombo , che nella piuma , escogitò l'eguaglianza di cotal forza in ambedue , ma concepì che la resistenza del mezzo si faceva più sentire su quel de' due corpi , il quale avea meno di materia . Tale raziocinio era ben fondato , e noi ne farem conoscere tutta l'adeguatezza , spiegando l'Esperienza che siegue ,

92 LEZIONI DI FISICA
II. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Si ferma stabilmente su la piafretta d'una macchina pneumatica, un telajo il quale contiene un cannoncino di vetro, che ha sei piedi di lunghezza, due pollici e mezzo di diametro, più largo e aperto nelle sue due estremità A, B *Figura 2.* si attacca nella sommità, col mezzo d'un anello di cuojo ammollato, una piafretta di rame, sotto la quale sta fisso il coperchio, o l'animella d'un pezzo che gira verticalmente, e che dividendosi in sei raggi, forma altrettante tenagliette, o forbici a molla. Questo pezzo è rappresentato solo di faccia nella *Figura 3.* e vedesi di fianco in CD *Figura 4.* il suo asse porta un rocchello, o sia ruota dentata fatta a guisa di lanterna, che infilza un'altra ruota fatta a caviglie F, impennata sopra un gambo di rame affatto cilindrico, che trapassa da parte a parte la piafretta, ed un collare G ripieno di pelli crude non conciate. Il capo di questo gambo è attaccato ad un rotello H, al di sopra del quale v'è un anello che corrisponde ad una lieva I, e questa lieva si muove col mezzo d'una cordicella; K è un tamburro corredato d'una molla da oriuolo, per contrattirare la cordicella che circonda e fa girare il rotello H.

Prima di mettere questo pezzo sopra il tubo di vetro, conviene por cura il guernire le sei tenagliuzze, ponendo a ciascheduna due piccoli corpi, i volumi de' quali sieno appresso a poco simili, ma che nel peso differiscano: di maniera che però queste

S P E R I M E N T A L E. 93

queste differenze non sieno egualmente grandi in ogni peso. Così si potrà, per esempio, mettere nella prima un pezzo di piombo, ed una piuma; nella seconda un pezzo di cuojo, ed un piccolo foglio di carta; nella terza, un pezzo di legno, ed un pezzo di ferro ec.

Rarefatta che si avrà l'aria nel tubo, più che sia possibile, colla tromba, tirando la cordicella L, si farà girare la ruota F, per mettere una delle tenagliuzze in situazione verticale, come D; si tira di poi la cordicella M per alzare la ruota F, il cui orlo preme la piccola lieva n, e fa aprire la tenaglia; avendo questa fatto il suo ufficio ne fa passare alla stessa maniera un'altra, così di mano in mano sino all'ultima.

E F F E T T I.

Tutti cotesti corpi scappando a due a due, cadono nel medesimo tempo, e non lasciano scorgere differenza alcuna sensibile, nella durazione della lor caduta.

Ma se si ricomincerà l'Esperienza, lasciando il vase pieno d'aria nello stato suo naturale, quei corpi che hanno più di peso cadono più presto e la lentezza degli altri è più sensibile, a misura che la lor massa è men grande. Così il legno cade più lentamente che il ferro; ma la sua lentezza non è sì grande, come quella della carta, o della piuma,

SPIEGAZIONE.

La prima parte di questa Esperienza prova evidentemente e direttamente, che la gravità è eguale in tutti i corpi, e che le differenze che si scorgono nelle loro cadute, non debbono attribuirsi, se non se alla resistenza de' mezzi per li quali cadono: poichè con sopprimere, o diminuire grandemente questa resistenza, i tempi che impiegano nel discendere da eguali altezze, sono sensibilmente i medesimi. La seconda parte c' insegna, come dobbiamo calcolare quelle differenze, che osserviamo nella caduta de' gravi, che hanno divario fra loro nella quantità di materia. Imperocchè, se consideriamo la gravità, come una velocità comune ed eguale in tutti i gravi, le quantità di moto o le forze di due corpi, che cominciano a cadere, non possono differire tra esse, se non se per la massa. Supponiamo dunque un pezzo di piombo, che pesi 12. oncie, ed un pezzo di legno di pari volume, e di figura simigliante che ne pesi una; poichè la velocità iniziale, o la gravità di questi due mobili è la stessa, le loro quantità di moto, nel primo istante della loro discesa, faranno come le loro masse, vale a dire, 1 nel pezzo di legno, e 12. in quello di piombo. Supponiam' ora, che nel tempo delle loro cadute, la resistenza del mezzo rallenti il loro moto d' un mezzo grado; cotal diminuzione sarà eguale nell' uno e nell' altro, poichè il mezzo è lo stesso, i volumi sono eguali, e le figure simiglianti; ma il pezzo di piombo che ha perduto un mezzo grado di moto, ne ha ancora

S P E R I M E N T A L E. 95

11 e mezzo: laddove il pezzo di legno, per una simil perdita non si trova averne più, che un mezzo grado in tutto; nell' uno il moto è rallentato solamente la duodecima parte, nell' altro un intera metà, quantunque questi due effetti procedano dalla medesima cagione.

A P P L I C A Z I O N I.

Il principio ch'è provato abbiamo poc' anzi, colla descritta Esperienza, è d' una importanza somma; quindi è, che non si è omissa diligenza, nè studio, affine di metterlo in tutto il suo lume. Il Signor Neuton l'ha confermato col mezzo delle vibrazioni di molte palle sospese, i diametri ed i pesi delle quali sono stati da lui disposti con varia proporzione: fra poco noi mostreremo, che questa specie di moto è un effetto della gravità; così quando due palle del medesimo peso, della medesima grossezza, e sospese a fila eguali, continuano a ondeggiare per l'istesso spazio di tempo nella stessa aria, elleno far vedere che son avvivate da gravitadi eguali: e convien persistere in un simil giudizio, tuttocchè la diminuzione del peso vi apporti differenza, se, come l' Esperienza lo dimostra, cotesta differenza non corrisponde alla proporzione delle masse.

I Signori Frenicle e Mariotte dietro la scorta di Galileo, provarono la discesa diretta de' corpi a grandi altezze; ma niuno fece tai sorte di prove in più vantaggiose circostanze, di quelle nelle quali si trovò M. Desaguilliers *, che s'avvalse della

* *Transact. Philosoph. n. 329. art. 4.*

della grande altezza della cupola di S. Paolo in Londra, e s'ajutò co' lumi portati a lui dal Newton, dall' Hallejo ec. i quali furono all' Esperienza presenti.

Si lasciarono cadere molti corpi di pesi e volumi differenti, dall' altezza di 272 piedi; e si osservò che due palle, i diametri delle quali erano di presso a 5. pollici e $\frac{1}{2}$; e che pesavano l' una 2610 grani, e l' altra 137 $\frac{1}{2}$, impiegarono tempi molto differenti nel cadere da tutta coteſta altezza; imperocchè la più pesante finì la sua discesa in 6 secondi $\frac{1}{2}$, e la discesa dell' altra nè durò quasi 19: lo che fa vedere, che la velocità de' corpi che cadono non è proporzionale alla loro massa, imperocchè in quest' ultima Esperienza le due palle, quanto al peso, sono appresso a poco nella proporzione di 19 con 1; e tutte le altre circostanze sono eguali per l' una e per l' altra; nulladimeno la più pesante non è già caduta 19 volte più presto dell' altra, imperocchè invece di 6 secondi, avrebbe dovuto impiegarne un solo.

E' facile adesso spiegare, perchè la medesima materia si fa più lenta a cadere, a misura che ella si divide, o cresce di volume, come un pezzo di legno ridotto in assicelle sottili; un mazzo di carte, od un fascio di penne non legato. La caduta d' una grossa pioggia è molto differente da quella della neve, e l' acqua che cade senza dividersi, fa un sforzo più notabile, che quella che si riduce in stille, e che si dilata nell' aria ch' ella travalica.

Se non fosse questa resistenza dell' aria che ritarda e divide i corpi, le parti de' quali non sono fortemente legate, si vedrebbe con istupore non men

che

che con pericolo una secchia d'acqua gittata per una finestra cader sul lastricato col medesimo scroscio, e colla stessa violenza, che un masso di ghiaccio d'egual peso. Se, per esempio, il peso dell'acqua così gittata fosse d'un boccale*, tanto farebbe il ricever'essa sul capo, quanto il ricevere una pietra del peso di due lire, caduta dalla medesima altezza. Ma la maraviglia non durebbe a lungo, appresso quelli che han piena contezza de' principj, che da noi quì si spiegano, Imperocchè fanno, che una massa liquida che cade per qualsivoglia mezzo materiale, prova una resistenza diretta nella sua parte inferiore, ed uno sfregamento nelle superficie laterali: che, queste due forte di resistenze, ritardano ciò che è esposto alla loro azione immediata, più che il resto; e che perciò il mobile, le di cui parti non sono quasi per niente legate, deve in breve tempo cambiar figura e dividersi; ma questi ultimi due effetti devon cessare, quando la cagione, che suole produrli più non sussiste.

Una Esperienza quasi del pari antica, che la macchina pneumatica, e che senza il merito della novità, è non per tanto curiosa, prova mirabilmente bene, quello che noi diciamo della caduta de' liquori.

III. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

In un tubo di vetro massiccio e forte anzi che no, *Figura 5.*, il diametro del quale pareggia 8.

Tom. II.

G

O 10

* Corrisponde alla *Pinte* de' Francesi, che contiene due lire di peso di liquido.

98 LEZIONI DI FISICA

o 10 linee, mettonsi alcuni pollici d'acqua; e dopo d'aver fatto il vacuo nel resto della capacità del tubo, si suggella alla lampana d'uno Smaltatore, in A.

EFFETTI.

Quando si agita questo tubo perpendicolarmente, l'acqua si solleva tutta in un pezzo, all'altezza di alcuni pollici, come B, e ricadendo nell'istessa guisa al fondo, fa il medesimo strepito, e il medesimo sforzo, che un corpo solido? e cotesto suono è molto più acuto, quando si riserva una palla cava e sottile nella parte superiore, come appare dalla Figura.

SPIEGAZIONE.

Se dalla superficie dell'acqua C fino in A, vi fosse in questo vase dell'aria, tale quale è quella dell'atmosfera; quando per l'agitazione l'acqua sollevasi da C in B, la colonna d'aria contenuta in cotesta parte, sottentrerebbe per un istante all'acqua, ed occuperebbe il suo luogo; e l'acqua nel ricadere incontrerebbe questo fluido pieghevole, il quale ritarderebbe la sua caduta, e dopo una divisione reciproca, le cederebbe il di lei primo posto, ma quando v'è solamente dell'acqua nel tubo, e nulla v'è che la disunisca, ella ricade tutta insieme, e la base di questa colonna liquida, colpisce immediatamente il fondo del vase, come appunto farebbe un cilindro solido del peso medesimo.

A P.

APPLICAZIONI.

Il mercurio d'un barometro (se l'istrumento è ben fatto) si trova nel caso medesimo, in cui si trova l'acqua di quest'ultima Esperienza; quando egli si fa ondeggiar nel tubo, se la scossa è gagliarda, si corre rischio di frangere il vetro, e sempre s'ode il colpo, come quello d'un corpo solido; perchè la parte superiore del tubo, è vuota d'aria, ed il mercurio urta immediatamente nel fondo.

Il tempo non porta per sè stesso veruna differenza alla gravità de' corpi; quando non si supponga (ma perchè dovrem supporlo?) che i cambiamenti, che le soppravvengono, sono uniformi e proporzionali in tutta la natura; imperocchè se parliamo de' pesi comparati, ciò che pesa una lira, continua sempre a pesare esattamente una lira, fin che la quantità di materia resta la medesima. Se ne può prendere argomento dalle gravità specifiche delle materie che son note; l'oro per esempio, è costantemente nella proporzione di 19. $\frac{1}{2}$ ad 1. con l'acqua pura. Vero è, che quelle quantità sono soggette a piccole differenze; ma ragion vuole, che si attribuiscono a' differenti stati delle materie, al freddo, al caldo, alla secchezza, all'umidità piuttosto, che rifonderle in una ignota cagione, la quale non si ha fondamento di sospettare. Se avviene alla giornata, che un corpo diventi più o meno pesante di quel ch'egli era, si dee por mente ch'egli ha perduto o acquistato delle parti materiali, che aumentano o diminuiscono la di lui massa.

sa. Una spugna, od altro corpo equivalente sospesa al braccio d'una bilancetta, ed esposta alle impressioni dell'aria, diviene ora più ora meno pesante; e ciò proviene, perchè l'umidità che regna nell'aria, aggiugne qualche cosa al suo peso in certo tempo, ed al contrario glie ne toglie, quando fa più asciutto. Questa spiegazione è sì naturale, e sì ben ricevuta, che parecchi si servono di questo mezzo, per conoscere l'umido o il secco dell'aria. Si sa, che il legno navigato è più leggiero, che 'l legno nuovo; s'averà egli per questo a conchiudere, che la gravità varia? Non è egli manifesto, che cotesta diminuzione di peso proviene, dall'aver egli perduto una parte della sua sostanza? Almeno dubitar non si può, che l'acqua non gli abbia fatto perdere una gran parte de' suoi sali; imperocchè il ranno, che si fa della sua cenere, poco ne contiene, e per questa cagione egli è men opportuno ad imbiancare i pani lini.

Se è paruto, che alcune esperienze indicassero de' cambiamenti nel peso d'una medesima materia, non dobbiamo non pertanto credere ch'ellesi no provar possano, siccome alcuni hanno creduto, che la gravità varj per successione di tempo; ci sembra più verisimile, che coloro, i quali le hanno fatte, sieno ingannati, per qualche difetto nell'esecuzione, non ben atteso dalla loro vigilanza. I pesi de' penduli, de' menarrosti, degli orivoli, ec. sono prove d'esperienza, che si possono lor opporre, e che in dubbio rivocar non si possono.

Ma se il tempo non apporta variazione alcuna alla gravità de' corpi, almen non si cangia ella cotesta forza secondo i luoghi?

Dirò

SPERIMENTALE. 101

Dirò in ordine a questo, che considerando noi il centro de' corpi gravi essere quel della terra, farem forse portati a credere, che ad una più o men grande distanza da cotal termine, la gravità non sia per essere sempre la stessa. Ma quando, per paragonar questa forza con se medesima l'abbiamo provata nelle maggiori altezze, e nelle maggiori profondità che a noi sieno accessibili, e non ci avendo scorta veruna differenza, pare che sia permesso il credere, ch'ella sia uniforme per tutto. Ed in fatti si è supposto star la cosa a questo modo, finchè sono state trovate ragioni da credere il contrario.

Neuton ci assicura (e Neuton merita d'essere ascoltato) che quella secreta potenza che sollecita i corpi a cadere verso la terra, adopera meno sopra d'essi, quando sono da lei più lontani; va avanti, e ci dà delle regole per calcolare questa diminuzione, e quasi ch'egli avesse portata la bilancia sin sulla Luna, vuole che si creda, che una pietra, la qual di là cadesse, non farebbe sul bel principio niente più di strada in un minuto, di quel ch'ella ne fa quaggiù in un secondo; vale à dire, che ad una tale altezza ella discenderebbe 3600. volte più lentamente, che non fa quand'è vicina alla superficie della terra.

Se reca maraviglia, come questo Filosofo abbia ardito di così decidere sopra cose, che pajono troppo superiori alle forze dell'umano intendimento, molto più ci dee far stupire il non aver egli spacciate coteste proposizioni come sistemi, ma l'averle rafforzate e conformate con prove, che reggono contro il più severo esame. Non ha per verità dimostrato il Neuton, che la forza cen-

tripeta della Luna sia la stessa, che quella degli altri corpi che al nostro globo appartengono; ma lo ha supposto con tanta verisimiglianza, che ei non dee avervi in conto di mera conghiettura; imperocchè la sua teoria della Luna, da lui fondata su tale supposizione, è quella, che più alla verità s'accosta, e che dà i luoghi di cotesto Pianeta, alle osservazioni Astronomiche i più conformi.

Come dunque saper si può quello che segue nella Luna, così che se ne favelli con tanta franchezza, e ci riesca eziandio a guadagnarsi gli altrui voti, e l'altrui credenza?

Nelle opere medesime del Sig. Neuton, o in estratti più ampi, che qui non avrebbon luogo, conviene studiare i di lui pensamenti, e le sue prove. Quello ch'egli ha insegnato intorno alla gravità de i corpi, e connesso con tutto il sistema generale del mondo, da lui più felicemente, che da verun altro Filosofo concertato; ed è difficile grandemente, il formarli un' esatta idea di questa parte, quand' ella si separa dalle altre, colle quali ell' ha una connessione sì necessaria. Ci contenteremo qui dunque di far solamente vedere in iscorcio, come possibil sia giudicar della gravità de' Corpi all' altezza della Luna, prendendone il filo e la proporzione da quella che hanno quaggiù, con supporre, che la forza centripeta della Luna altro non sia, fuorchè quella gravità, che fa dare verso il centro della terra i corpi che ci sono dappresso.

Supponiamo che T, Fig. 6. rappresenti la terra, D la Luna, L Q R S l' orbita della Luna medesima, cioè la rivoluzione ch' ella fa attorno del-

la terra nello spazio di quasi un mese. E cognita la distanza della terra dalla Luna, ch'equivale a un di presso al semidiametro del globo terrestre 60. volte ripetuto: e queste son quantità note, ha già lungo tempo e sopra le quali ognuno è d'accordo.

Parlando delle forze centrali nella Lezion precedente, abbiám fatto conoscere, che un corpo, il quale circola, lo fa in conseguenza d'una forza che lo spigne, o che lo tira sempre verso un medesimo punto, mentre un'altra forza lo sollecita a moverfi in un'altra direzione. Quando noi vediamo girar la Luna attorno di noi, possiamo dunque conchiudere con tutta sicurezza, ch'ella ha una forza centripeta, o, lo che è la stessa cosa ch'ella gravita verso la terra.

Abbiám pur fatto vedere, parlando del moto composto, che se un mobile ubbidisce nel medesimo tempo a due potenze, come LP, LC, si conosce la ragione proporzionale di queste due potenze dalla diagonale LQ, che esso mobile descrive.

Sapendosi il tempo, che sta la Luna in percorrere tutta la sua orbita, si fa nè più nè meno quello ch'ella impiega a descriverne una piccola porzione, come LQ: e quindi giudicar si può della strada, ch'ella averebbe fatta, se avesse sol ubbidito ad una delle due potenze. Se, per esempio, LQ è lo spazio ch'ella percorre della sua orbita in un'ora, LP rappresenta la quantità dello spazio ch'ella discenderebbe in un'ora, se seguitasse l'impulsione della sola gravità.

Appresso a poco in simil guisa è venuto il Newton a capo di conoscere, che un corpo grave,

104 LEZIONI DI FISICA

cominciando a cader dalla Luna, percorre a un dipresso 15. piedi nello spazio d'un minuto; poi comparando questa velocità con quella de' corpi che quaggiù ubbidiscono alla gravità, trovolla 3600. volte men grande; imperocchè una pietra, la quale cadesse liberamente per un minuto, percorrerebbe 3600. volte 15. piedi, ovver-54000. piedi: dal che conchiude, che la gravità decresce come il quadrato della distanza cresce; imperocchè 3600. è il quadrato di 60, e la Luna è 60. volte più lontana dal centro della Terra, di quel che ne sieno i corpi, che stanno come noi su la superficie.

Se noi potessimo poggiare ad altezze assai notabili, sarebbe una cosa curiosa molto il mettere in fatto questa teoria con qualche esperienza; ma le nostre più alte Montagne non son sufficienti; e quando le supporremmo alte due leghe perpendicolarmente, al di sopra del terreno più basso, a cui discender possiamo, ben si vede dal calcolo, che il decrescimento della gravità sarebbe ancora insensibile.

Se una distanza più o meno grande de' corpi gravi dal centro della terra, ha potuto far supporre qualche variazione nella loro gravità, simili sospetti nascer forse dovevano eziandio dalla differenza de' climi? In un tempo massimamente, in cui la figura della Terra, era tuttora stimata sferica, non dovevano per quanto apparere, tutti i luoghi della sua superficie crederli indifferenti, per quello spetta ad una cotal tendenza al centro?

Dacchè si è supposto che la Terra si muove in 24. ore attorno del suo asse, si averebbe potuto

SPERIMENTALE. 105

tuto por mente, che tutte le parti della sua superficie non girano egualmente presto; quelle che sono sotto l'equatore, descrivendo circoli molto più grandi, che quelle che a' poli sono vicine, come l'abiam mostriato spiegando l'esperienza del globo di vetro nella precedente Lezione *.

Questa considerazione guidava naturalmente a pensare che tutti i corpi che sono nella superficie del nostro globo, partecipando del suo moto, hanno una forza centrifuga; che questa forza contraria alla gravità doveva essere più grande verso l'equatore che verso i poli; e che perciò la gravità dovea scemare a proporzione della vicinanza a cotesta parte della terra. Ma prima di Cartesio, e di Hughsens, non si ragionava di forze centrifughe; e se Copernico, nel proporla sua ipotesi, vi avesse soppraggiunta questa novità, è molto probabile, che nel suo tempo non farebb'ella stata meglio applaudita che l'istesso.

Nel 1672. M. Richer essendo andato per ordine del Re all'Isola di Cayenne, situata in gradi 5. di Latitudine, per fare delle osservazioni non praticabili nel nostro clima, fece una scoperta di maggior rimarco senza dubbio, che tutte quelle ch'egli s'avea proposte. Osservò che un pendulo, che a Parigi batteva i secondi, misurava tempi più lunghi nel paese ove allor risiedeva.

Un Pendulo è un istrumento composto d'un corpo pesante, come una palla di piombo, e. g. che descrive archi attorno d'un punto fisso, col mezzo d'un filo, o d'una verghetta sottile che lo tiene sospeso. Noi farem vedere nel decorso di

que-

* VI. Esperienza fig. 22. e 23.

106 LEZIONI DI FISICA

questa lezione, che il suo moto che *oscillazione* s'appella, è un effetto della gravità, e che egli è più o meno pronto, secondo che il filo di sospensione ha più o meno di lunghezza.

M. Richer essendosi dunque appieno accertato che il suo pendulo modellato a Parigi per battere i secondi, nell'Isola di Cayenne ritardava, vi rimediò raccorciandolo d'una quantità di cui tenne conto esatto; e questa esperienza ripetuta di poi da molti buoni osservatori, e ultimamente dagli Accademici che sono andati al Perù, e da quelli che hanno fatto il viaggio del Nord, per le misure che alla figura della terra si riferiscono, ha sempre mostrato che verso l'Equatore i corpi cadono più lentamente che altrove, e che tale ritardo scema, a proporzione che cresce la latitudine del luogo.

Col fondamento d'una cognizione di questa fatta, si è messa più che mai in credito l'opinione del movimento diurno della terra; e però che una tale rotazione, ammessa che sia, imprime alle parti del globo delle forze centrifughe, le quali non sono eguali in tutta la distesa del Globo medesimo, s' incominciò a formar de' dubbj intorno alla sua figura, che giusta il volgar sentimento passava per sferica.

Fin tanto che si è considerata la terra come immobile, era verisimile ch'ella fosse una sfera perfetta, perchè le sue parti obbedendo ad una gravità eguale, dovean formare attorno del centro comune della loro gravità, raggi o colonne di pari lunghezza, per stare in equilibrio. Ma se questa gravità primitiva trovasi diminuita da una forza contraria, e non si fa questa diminu-

zio.

S P E R I M E N T A L E. 107

zione in quantità eguali per tutta l'estensione del globo, non è possibile d'accordare l'equilibrio delle sue parti con una figura perfettamente sferica.

Sia *A D B E* Fig. 7. una sezione diametrale della terra, nel momento della creazione composta di parti egualmente pesanti verso il punto *C*, e cotanto fluidi, che ordinare e disporre si possano in conseguenza della lor gravità; egli è certo che tutti i raggi *AC*, *DC*, *FC*, ec. per essere in equilibrio, devono essere della medesima lunghezza, e che tutte le loro estremità saranno schierate e ordinate nella circonferenza d'un circolo.

Ma se si consideri la terra, come avente un moto di rotazione su l'asse *AB*, l'equilibrio non può più sussistere tra raggi eguali: imperocchè allora la forza centrifuga distrugge una parte della gravità, e tale diminuzione va sempre crescendo dal polo dell'equatore. Imperocchè il punto *D* descrive in 24. ore un gran circolo, il punto *F* nel medesimo tempo percorre un parallelo, il di cui diametro è molto più piccolo, ed il punto *A* nè men gira. La colonna *CD* per essere così pesante come *CA*, deve dunque crescere in lunghezza, e compensare con più di materia, la diminuzione della sua gravità, che la sua forza centrifuga le cagiona.


Il moto di rotazione produce un simile effetto negli altri paralleli; ma quest'effetto va sempre diminuendosi sino ai poli, per due ragioni; 1. perchè la velocità del moto, e per conseguenza la forza centrifuga che ne risulta, scema con questa proporzione: 2. perchè questa forza, ch'è diret-
ta-


tamente contraria alla gravità sotto l'Equatore ; non gli viene se non obliquamente opposta per tutt'altrove, come è facile l'osservarlo nella figura; imperocchè per esempio, nella latitudine del punto F, la gravità agisce secondo la direzione FC, e la forza centrifuga ha la sua tendenza per FL.

Ne segue da tutto questo, che se la terra gira sul proprio asse, la gravità non è eguale per tutto; la materia che compone questo globo, per essere in equilibrio con sè medesima, deve via via sempre più elevarsi da' poli fino all'Equatore, come HIKG; da che risulta, che il diametro del suo Equatore è più grande che il suo asse AB. La cosa si renderà palpabile coll' esempio che segue.

Empiesi di paglia d'avena un sacco di cuoio di montone, composto di dodici fusa simili alle stampe colle quali si cuoprono i globi, che rappresentano il Cielo o la terra; cotesta specie di sfera flessibile è corredata, ne' suoi due poli, di due pezzi di legno traforati, che scorrono sopra un asse di ferro quadrato, le cui estremità sono rotondate con due perni, e col mezzo d'una rotella fissata a una di queste due estremità siccome appar dalla Fig. 8. s'imprime in cotesto globo un moto di rotazione, per mezzo della macchina, con la quale abbiain fatto girare il globo di vetro, e ch'è rappresentata nella Fig. 22. della precedente Lezione. Questo moto gli fa perdere in poco tempo la sua figura sferica, e pigliar quella d'uno sferoide, che vedesi sensibilmente schiacciato ne' poli, ed elevato nell'Equatore, più di quel ch'esige una sfericità perfetta.

Li





S P E R I M E N T A L E. 109

Li Signori *Hughens*, e *Neuton*, senza ricorrere a simili esperienze, che avrebbero poco peso in una materia bisognosa d'una somma accuratezza, fondati unicamente sopra le leggi della Statica e delle forze centrali, avevano raccolto che la terra doveva essere uno sferoide schiacciato verso i poli: co' loro calcoli erano anche giunti a determinare, di quanto il diametro dell'Equatore eccedesse l'asse in lunghezza. Ma dipendendo questa decisione da ipotesi che lasciavano dell'incertezza, l'opera di cotesti grand'uomini quasi altro esito non ebbe, se non se quello di rendere a questa quistione applicati ed attenti i più valenti Fisici, e di farli accorti della sua importanza.

Quando la teoria ne mena a qualche scoperta fisica, pare che sia riservato all'esperienza il porvi l'ultima mano; ma qual mezzo vi era di fare delle esperienze sopra la figura della terra? Le più decisive che si possano fare, e il misurarla attualmente, comparando gli archi d'uno de' suoi meridiani: come di poi s'è fatto.

Quantunque l'istoria di ciò ch'è seguito a tal proposito, sia curiosissima e interessante, io m'asterrò dal riferirla, perchè ella non è necessariamente legata col mio oggetto presente; in molte opere recentissime ella si trova molto più minutamente descritta, di quel ch'io far potrei qui a cagion de' limiti che mi ho prescritti; ma in niuna meglio che in quella la quale di proposito ci ha dato il Sig. de *Maupertuis*, che più che altri ha cooperato a guidare ed eseguire questa bella intrapresa. Dirò solamente, che il viaggio fatto al Nord da quest'illustre Accademico insieme con mol-

110 LEZIONI DI FISICA

molti de' suoi Compagni; affine di misurare un arco di meridiano, che potesse essere comparato con quelli, che erano stati misurati in Francia, ha già confermata la figura, attribuita prima d'ora alla terra da l' *Hughens* e da *Neuton*: e ch'è probabilissimo, che gli altri *Academici*, che sono attualmente nel *Perù*, niente ci sapran dire di contrario: ma ci sapran dire solamente, di quanta estensione sia lo schiacciamento del nostro globo verso i poli.

Un'altra quistione, che ora presentasi, è dirizzata a sapere, se il peso d'un corpo varia secondo i differenti stati ch'egli può prendere; se il moto, la quiete, il freddo; il caldo, la solidità, la fluidità; ec. possono renderlo più o meno pesante nel luogo medesimo.

In generale si può rispondere che il peso, o la gravità assoluta d'un corpo non varia, finchè la sua quantità di materia è la medesima: una lira di piombo pesa sempre intrinsecamente una lira, o che sia fuso, o che sia solido; più, o meno caldo; sia in moto, o no; imperocchè quand'ella è passata per tutti questi stati, se non ha perduto niente della sua quantità di materia, vi si ritrova costantemente il medesimo peso.

Ma se si considera la gravità, come la velocità attuale, con la quale il corpo grave si porta dall'alto all'ingìù, molt'è lungi ch'ella sia la medesima sul principio o sul fine della caduta. Qualunque esser possa la cagione della gravità, bisogna concepire questa forza, come se ella fosse collocata nel mobile medesimo, sul quale ella adopera; a un dipresso come il fuoco che solleva un razzo per l'inflammazione successiva delle parti
ch.

S P E R I M E N T A L E. III

ch'egli contiene: di maniera che ella adopera sopra un corpo mentre egli cade, tanto e nella stessa guisa ad ogni momento, come se fosse fermato: Laonde; tutte l'altre cose supposte eguali, una palla di piombo che ha ceduto alla propria gravità per lo spazio d'un secondo, ha una velocità attuale più grande, che quella la qual fosse solamente discesa per un mezzo-secondo. Rendiamo sensibil la cosa con una esperienza.

IV. E S P E R I E N Z A.

P R E P A R A Z I O N E.

A B, *Fig. 9.* è una cassa più lunga che larga, aperta di sopra, e nella quale sdrucchiola un paniere pieno di terra molle. A D, e B C, sono due colonne cilindriche di 3. piedi e mezzo d'altezza, divise in pollici, e sopra le quali si fa scorrere un'assicella mobile posta trasversalmente E F, che si ferma con viti, a quell'altezza che più si vuole. Nel mezzo di questo legno trasversale è un buco, nel quale si ritiene una palla d'avorio d'un pollice di diametro; col mezzo d'una tenaglia che ha molla; la palla H, simile alla precedente, è sospesa da un filo alla metà della distanza tra il legno trasversale mobile e la cunetta: ed il filo di sospensione è fermato per tal maniera, che quando si lascia andare la palla G, l'altra comincia a cadere nel medesimo tempo.

E F-

112 LEZIONI DI FISICA

EFFETTI.

Le due palle avendo cominciato a cadere nel medesimo tempo, finiscono la loro caduta l'una dopo l'altra, e la palla H; che arriva la prima su la terra molle, vi fa uno sprofondamento, il quale è molto minore, che quello della palla G. che giunge da poi.

SPIEGAZIONI.

Lo sprofondamento che ciascuna palla fa nella terra molle, e il prodotto del suo sforzo; quest'effetto esprime la forza attuale del mobile nel fine della sua caduta; cotesta forza non può venire senon dalla sua massa e dal suo grado di velocità: ma le masse sono eguali, se dunque le forze sono differenti, ciò nasce perchè la palla G terminando di cadere, aveva più di velocità che la palla H.

V. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Tirato un po innanzi che siesi il paniere della macchina qui sopra descritta, acciocchè una nuova palla possa cadere sopra un luogo, dove la terra molle non abbia ricevuto sprofondamento; si ferma il legno mobile trasversale ad un piede di elevazione sopra della cassa, per far cadere una palla di rame che pesa 3. oncie; quindi s'alza il detto legno trasversale tre piedi, per far cadere
so-

S P E R I M E N T A L E. 115

sopra un nuovo sito, un'altra palla di rame cava, dell'istesso diametro che la prima, e che pesa solo un oncia.

E F F E T T I.

Paragonando i due sprofondamenti, si trovano perfettamente eguali.

S P I E G A Z I O N I.

Quello che da precedente esperienza ha solo indicato in generale, questa lo dimostra con maggior precisione: imperocchè non solo dà ella a conoscere che la velocità de' corpi che cadono liberamente, cresce in una caduta più lunga; ma ci dà la misura di questo crescimento, con far conoscere ch'egli è proporzionale all'altezza: lo che divien evidente, quando si fa attenzione, che un'oncia di massa ha prodotto il medesimo effetto che 3 oncie, perchè l'altezza della sua caduta è stata 3 volte maggiore.

A P P L I C A Z I O N I.

Non v'è contadino che non sappia, che la caduta d'una pietra è tanto più da temersi, quanto vien da più alto; e che i corpi fragili corrono maggior pericolo di rompersi in simil caso. Questi fatti son sì noti, che non porta il pregio di fermarvici. Osserveremo solamente, che siccome nella nostra esperienza una massa più grande, venendo da minore altezza ha prodotto l'istesso sforzo che una massa minore da più alto caduta;

Tom II.

H

si può

114 LEZIONI DI FISICA

si può sciogliere tra questi due mezzi, quando si tratta di valersi della potenza d'un mobile, che debbe operare con la sua caduta; imperocchè è utile bene spesso poter sostituire del peso ad una grande elevazione.

Non v'ha dubbio, per esempio, che de' martelli impiegati a forza di braccia con una velocità sufficiente, verebbono a capo di sprofondare de' pali, di lavorare delle ancore, di battere il ferro delle miniere nelle fucine, dov'egli si prepara in grande, ec. ma ci va molto minore spesa nel far cadere da un'altezza mediocre masse pesantissime, il cui moto è arrivato e regolato per lo più dalla forza dell'acqua, o da quella del vento.

Ed eccoci così chiariti, almeno in generale, che la caduta de' corpi s'accelera ad ogni istante; vediamo adesso per via d'esperienze qual sia la progressione di questo aumento di velocità.

VI. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

A B, e C D, *Figura. 10.* sono due corde di metallo, o di minugia, d'incirca 12. piedi di lunghezza, fortemente e parallelamente tese ad alcuni pollici di distanza l'una dall'altra, e che fanno con l'orizzonte un angolo di circa 22 gradi e mezzo; G è un mobile che liberamente sdrucchiola per mezzo di due piccioli rotoli sopra la corda A B, ed il suo centro di gravità è più basso che la corda, affinchè la punta ch'è nella sua par-

parte superiore, conservi sempre la stessa situazione; H è un pendulo un poco pesante, che si move su due perni A, a, e la verghetta del quale eccede un poco verso f. La lunghezza del pendulo deve essere tale, ch'egli faccia appunto una vibrazione, mentre il mobile G percorre la nona parte della corda A B; per accertarsene bisogna avere in pronto un regoletto di legno, che serve a misurare la corda in nove parti eguali e collocare in faccia alla prima di queste parti, e sopra la corda C D una piccola squilla K, il cui sostegnetto scorre, e si ferma con una vite, a qual distanza che si vuole. Egli debbe aver pure un martelletto, che di passaggio viene allentato dal mobile G. Da un'altra parte il pendulo H fa suonare parimenti un'altra squilla I, il cui tuono è differente, e la coda della verghetta che eccede in f, fa allentare di passaggio un picciol filo di seta che ritiene il mobile G; di maniera che quando il tutto è ben agguistato, il mobile G non parte, se non quando il pendulo fa suonare la sua squilla I per la prima volta; e l'altra squilla K non dà il suo primo colpo, se non quando il pendulo fa sentire il secondo colpo della sua: perciò tra il primo ed il secondo colpo o suono della squilla, scorre un tempo, di cui s'ha la misura, e parimente in questo tempo il mobile percorre un spazio cognito. Si arretra poscia la squilla K, fin tanto che lo spazio percorso dal mobile G sia determinato dal secondo tempo, cioè sin tanto che il terzo colpo della squilla I s'accordi con quello della squilla K che si è arretrata, e così di mano in mano. E misurando gli spazi percorsi, se ne fa comparazione co i tempi.

H 2

E F-

116 LEZIONI DI FISICA

E F F E T T I.

Durante la prima vibrazione del pendolo, il mobile G percorre la nona parte della corda; s'egli continua a muoversi, di mano in mano nel secondo tempo percorre tre volte altrettanto di spazio, e nel terzo cinque volte, di maniera che la sua velocità è accelerata: poichè in tempi eguali misura spazj che vanno crescendo, ed il progresso di questa accelerazione corrisponde a numeri impari 1, 3, 5, 7, 9, ec. Io che fa dire che gli spazj percorsi, cominciando dal primo istante della caduta, corrispondono al quadrato de' tempi: imperocchè alla fine del secondo tempo si trova per il numero degli spazj 4, che è il quadrato di 2; e alla fine del terzo, 9 che è quadrato di 3.

SPIEGAZIONE.

Se la gravità fosse una forza esterna o come tale, cioè che la sua azione sul mobile ch'ella avviva, fosse simile a un colpo di martello, che produce nel primo urto, tutto quello che egli fa può la velocità del corpo grave sarebbe sempre eguale ed uniforme (astruendo dagli ostacoli estranji:) Imperocchè qual sarebbe la cagione, per cui dov'ss'ella mutarsi? posto che niente la diminuísse, e la potenza che l'ha fatta nascere non continuasse a operare. Ma la gravità, come già detto abbiamo, è una forza che seguita ed accompagna dirò così il mobile, e che ripete sopra di esso le sue impulsioni ad ogni istante. La velocità

SPERIMENTALE. 117

cità d'un corpo che cade, non è dunque solamente quella ch'egli aveva principiando a discendere, ma è la somma di quelle ch'egli ha acquistate; per tutto il tempo della sua caduta.

Quando il mobile *G* della nostra esperienza percorre lo spazio *A 1*, la gravità è che lo fa discendere; per conseguenza se si suddivide il tempo ch'egli impiega per fare questa strada, deesi concepire che in ciascun istante egli abbia ricevuta una nuova velocità, e che quando egli è arrivato alla zifra *1*, la sua velocità attuale è maggiore, che quando è partito dal punto *A*.

Per sapere precisamente il valore di quest'augmentazione, supponiamo che la linea *A B*, *Figura 11.* rappresenti questo primo tempo diviso in 6 istanti eguali; ed esprimiamoli piccoli spazi percorsi in questi istanti, col mezzo di tante linee perpendicolari ad *AB*. Se nel primo istante, la gravità fa percorrere al mobile uno spazio eguale *cc*, quello ch'egli percorrerà nell'istante seguente *dd*, sarà doppio, perchè l'impulsione del secondo istante, unendosi a quella del primo che sempre sussiste, raddoppierà la velocità, e così di mano in mano: l'ispezione sola della *Figura* basta, per far capire, che le velocità acquistate, sono come il numero degli istanti.

Immaginiamo adesso, che nel principio del secondo tempo espresso per *BC* eguale ad *AB*, la gravità cessi d'operare sopra l mobile, egli continuerà a discendere senza accelerazione; percorrendo tanti spazj simili a *BD*, quante vi sono in *BC* parti eguali a quelle del primo tempo *AB*. Ma la somma di queste linee è doppia

H 3 di

118 LEZIONI DI FISICA

di quelle del primo tempo, come è facile vedere, spaccando il quadrato $BDCE$ in due triangoli: egli è dunque dimostrato, che il mobile in virtù delle velocità acquistate nel primo tempo, può percorrere uno spazio doppio di quello che ha percorso. Così quando il mobile G della nostra Esperienza è arrivato al fine del primo spazio, tuttochè non acquistasse altre nuove velocità, nel tempo della seconda vibrazione di pendulo, s'avanzerebbe fino alla zifra 3.

Ma se la gravità continua a operare, debbe produr nel secondo tempo altrettanto effetto che nel primo. Se dunque si aggiungeranno sul lato DE , che rappresenta un tempo eguale ad AB , linee il numero e la lunghezza delle quali sieno simili alle prime cc dd , ec . si averanno, per li spazj percorsi nel secondo tempo, i tre triangoli BCD , CDE , e DEF , la somma de' quali pareggia tre volte ABD .

Parimenti quando il mobile G parte dal punto 1, egli è in istato di percorrere nel secondo tempo due spazj, in virtù delle velocità acquistate nel primo tempo, ed un terzo, in conseguenza della nuova impulsione ch'ei riceve in ciascun tempo, ed in questa guisa perviene alla zifra 4.

Segue la medesima cosa per tutti gli altri tempi: e per poco che vi si badi, si vede che il quarto, nono, decimosesto spazj percorsi, corrispondono al secondo, terzo, quarto tempo, e che le quantità che appartengono a ciascun tempo, prese separatamente, sono tra esse, come le zifre 1, 3, 5, 7, ec .

Quindi siegue, che un corpo, caduto da una certa

SPERIMENTALE. 119

certa altezza, si trova avere sul fine della sua caduta, un grado di velocità, tale, qual gli farebbe mestieri per risalire così alto, se qualche causa mutasse la sua direzione. E se risale infatti colla sua velocità acquistata, il suo moto è ritardato ascendendo, come è stato discendendo accelerato.

Imperocchè, supponiamo per esempio, che il corpo A, *Figura 12.*, sia arrivato in B per una velocità accelerata, cioè percorrendo nel primo tempo lo spazio 1, e nel secondo lo spazio 2, tre volte maggiore; se egli risalisse in virtù della velocità attuale che gli ha, e la gravità cessasse di operare sopra di lui, risalirebbe nel primo tempo da B in A.

Ma se venga la gravità a ritardar questo moto, la sua azione sopra il mobile che ascende, farà come sopra quello che discende; gli darà ella da sù in giù una tendenza capace di farlo discendere la quarta parte di AB. Perciò in luogo di risalire sino in A, arriverà solo in C; e nel tempo seguente, la medesima tendenza ch'ella continua a dargli, essendo tre volte maggiore, egli non farà ascendendo, se non la terza parte di quello che ha fatto nel primo tempo, giungerà dunque in A in due tempi: e gli spazi ch'egli percorrerà, saranno 3 ed 1. Donde si vede, che la velocità d'un corpo che risale, è ritardata dalla gravità, secondo la progressione de' numeri impari, 1, 3. 5. 7, ec.

Quello che abbiám poc' anzi insegnato con la precedente Esperienza, intorno all' accelerazione de' corpi gravi, ed alle leggi di quest' accelerazione, trovasi vero, appuntino, specularivamente: in pratica eziandio le differenze non sono sensibili, quando s' esaminino cadute di picciol rimarco, quali sono quelle che noi abbiám praticate. Ma se questa teoria si applica agli effetti naturali, trattandosi di grandi altezze, ella non milita in tutta la sua ampiezza, a cagione della resistenza de' mezzi, o degli altri ostacoli che ritardar possono la velocità de' corpi cadenti. Ne abbiám già date delle prove con la seconda Esperienza, e n' abbiám citate dell' altre, fatte in grande tanto in Italia, quanto in Francia ed Inghiltera. In 4 secondi $\frac{1}{2}$ una palla di piombo cade dall' altezza di 272 piedi, secondo la legge dell' accelerazione da noi dianzi stabilita, e non avutosi riguardo ad alcuna estranea resistenza, questo mobile dovrebbe percorrerne 289, dunque son 17 piedi, che la resistenza d' aria toglie in simil caso dal prodotto della sua accelerazione.

Questa diminuzione sarebbe ancora più notabile; se la palla in vece d' esser di piombo fosse di legno, o di qualche materia ancor più leggiera. Imperocchè abbiám già fatto vedere, che la resistenza del mezzo ritarda tanto più il moto de' corpi, quanto più hanno di volume, e meno di massa; ed è noto dall' Esperienze di M. Desaguilliers, già da noi citate, che una palla di cartone di 5. pollici di diametro, impiegò 6 secondi $\frac{1}{2}$ per ca-

cadere dall'istessa altezza, che la palla di piombo, laddove una caduta di questa durata avrebbe dovuto produrre 325 piedi, cioè 55 di più di quel che ha fatto.

La caduta de' corpi non differisce dagli altri moti, se non per la sua direzione, la resistenza de' mezzi vi si lascia dunque scorgere all'istesso modo: vale a dire, che bisogna aver riguardo non solamente al volume del mobile relativamente al suo peso, ma ancor al suo grado di velocità, ed alla densità del fluido, nel quale egli fa la sua caduta. Imperocchè è mestieri di maggior forza o di maggior tempo, per smuovere l'acqua, che l'aria in pari quantità. Quindi addiviene, che quando un corpo ha acquistato con la sua accelerazione un certo grado di velocità, che lo mette in equilibrio col mezzo resistente, continua a muoversi uniformemente.

I corpi che cadono, giungono più presto o più tardi a questo moto uniforme, secondo la densità de' mezzi che travalicano, o secondo che hanno più o meno di volume con la medesima massa. Quindi è, che gittandosi per una finestra de' corpi di pesi differenti, come pezzetti di carta, scheggie di legno, di pietra ec. osservarsi può, che i primi dopo avere accelerato nello spazio di 12 o 15 piedi, cadono poscia con un moto sensibilmente eguale; la grandine cade più presto che la pioggia, e la pioggia più presto che la neve, per la stessa ragione. Tolti via questi ritardi, l'acqua del cielo che seconda la terra, e di cui dispone la natura secondo i nostri bisogni, disolerebbe continuamente le nostre campagne e le nostre abitazioni: anche una minuta grandine, coll'estrema velocità.

velocità della sua caduta, farebbe un peso da temersi per le nostre teste.

Quello che la resistenza de' mezzi toglie dall'accelerazione della gravità ne' corpi che discendono, l'aggiugne al suo ritardo ne' corpi, che si muovono da giù in su. Così il corpo B Fig. 12. che in virtù della sua velocità acquistata, potrebbe salire fino al punto A, donde è disceso, si fermerà più basso a cagione del mezzo che gli resiste, e che distrugge una parte del suo moto. Quando lasciassi cadere una palla d'avorio sopra un marmo, quand' anche costesti due corpi fossero d'una elasticità perfetta; non occorrerebbe aspettare; che la palla rimontasse fino al luogo della sua mossa; l'esperienza è d'accordo affatto con questa teoria.



II. S E Z I O N E.

De' Fenomeni, ne' quali il Moto è composto della gravità, e di qualch'altra potenza.

SE qui si richiami alla memoria quanto abbiamo detto del Moto composto, non ci resterà che da fare delle applicazioni de' principj generali, da noi stabiliti; imperocchè la gravità è una potenza, la cui direzione, ed intensione sono già note da quello, che fin ora abbiamo insegnato. Se si conosceranno le altre forze,

ze, che seco lei cooperano al movimento d' un corpo, i diversi effetti che possono risultarne, saranno sempre conformi alle leggi del moto composto, che abbiamo piantate nella Lezione precedente. Scorriamo i casi più generali e più interessanti.

Quando un corpo non ubbidisce pienamente alla sua gravità, tanto in riguardo alla direzione, che all'intensione, questo avviene perchè egli è ritenuto da qualche ostacolo, o sollecitato da qualche forza attiva, che direttamente o indirettamente opera contro quella prima potenza.

Se l'ostacolo è direttamente opposto alla gravità, ed è invincibile, come il filo da cui pende la palla A, *Figura 13.*, ovvero il piano orizzontale, che impedisce ch'ella non passi più oltre: allora è un mobile che trovasi tra due potenze eguali, opposte nella medesima linea, cioè l'azione della gravità, la reazione del punto fisso a cui egli è sospeso, o del piano sul quale risposa: e noi abbiain detto che in simil caso, il mobile resta in quiete. Ovver se l'ostacolo può cedere alla gravità, ecco allora il caso di due forze, una delle quali ubbidisce secondo il vantaggio, che l'altra ha sopra di essa; il moto riman semplice, ma ritardato solamente, come avviene quando i corpi gravi cadono per mezzi resistenti.

I corpi gravi, a' quali non cedono gli ostacoli fuorchè insensibilmente, come il peso d' un orologio, d' un menarrostro ec. non lascian vedere alcun' accelerazione nella loro discesa, perchè in queste sorte di macchine il moto è moderato da' mezzi, che ad ogni instante rimenant il mobile alla sua velocità iniziale, cioè a quel grado di velo-

lo.


124 LEZIONI DI FISICA

locità infinitamente piccolo, col quale comincerebbe a cadere, se fosse libero.

Per concepire, come un corpo possa cadere lungo tempo, e seguitamente, senza accelerare il suo moto; s'immagini una palla, la quale cada per una scala, i cui gradini sono un po' larghi; ed in tal maniera, che cadendo dal primo sul secondo, non acquisti, se non la velocità necessaria per giungere all'orlo del gradino rotolando; e per cader sul terzo, e così degli altri; egli è evidente che al centesimo gradino la sua caduta sarà simile a quella, ch'essa palla ha fatta nel primo, perchè come si suppone, ogni volta ch'ella ha rotolato orizzontalmente, ha perduta la velocità ch'ella aveva acquistata con la precedente caduta. La stessa cosa succede a un dipresso, benchè meno sensibilmente al peso d'un pendulo, quando un dente del rocchetto scappa dalle palettine, la lumaca gira un poco, la corda scorre altrettanto, ed il peso fa una picciola discesa, non avvertita dall'occhio, a cagione della picciolissima sua durata, ma ch'è però più pronta sul fine, che sul principio: la resistenza che prova il dente seguente finattanto che scappi, consuma ben presto cotesta piccola aumentazione di velocità, e la seconda caduta si fa come la prima, cioè come se il mobile partisse dalla quiete.

Se alcuna cosa obbliga un corpo grave a discendere per una linea obliqua all'Orizzonte, od è un ostacolo, la cui reazione si proporziona agli sforzi della gravità come un piano inclinato, o un filo che tiene sospeso il mobile; oppure è una forza attiva, che ha la sua misura de-

ter-





terminata, come lo sforzo del braccio che getta una pietra, o quello della polvere accesa, che fa scattare una palla di moschetto. Esaminiamo divisatamente questi due casi negli Articoli seguenti.

ARTICOLO PRIMO

Della caduta de' Corpi per piani
inclinati.

IL piano inclinato, di cui qui si tratta, è quello che non è nè verticale, come *a p* Fig. 14., nè orizzontale come *p C*, ma che, come la linea *a C*, forma un triangolo colle due prime linee.

Il piano inclinato, tanto è inclinato meno, quanto più si solleva sopra del piano orizzontale; o, il che si riduce alla stessa cosa, quanto la linea *a p* è più lunga rispetto a *p C*. Così il piano *a C*, è più inclinato che *a D*.

Quando un mobile discende per un piano inclinato, la cosa va del pari, o se sostenuto sia da un piano solido d'una inclinazione costante, o se venga ognor tirato proporzionalmente da una potenza, la cui direzione faccia in tutti gl'istanti un angolo simile con quella della gravità, come *F A*, od *f a*.

Un corpo grave, ch'è obbligato di discendere così per una linea obliqua all'Orizzonte, debb'essere considerato come ubbidiente a due forze, le cui direzioni sono differenti, ed il suo moto debbe
com.

126 LEZIONI DI FISICA

comporli secondo le leggi, che abbiamo stabilite nella Lezione precedente: gli effetti che abbiamo qui da esaminare, non sono se non applicazioni ed esempj di quelle.

Supponiamo dunque, che AP rappresenti la gravità, cioè lo spazio che percorrerebbe il mobile A nel primo tempo della sua caduta, se cadesse liberamente; e che AF sia un'altra potenza che tira innanzi e obliquamente: formando su questi due primi lati il parallelogrammo $PAFa$, come l'abbiamo insegnato, la piccola diagonale Aa , darà e la direzione, e la quantità del moto composto. Quindi si vede che al fine del primo tempo, il mobile sarà in a , cioè molto men basso, che non sarebbe, se avesse sol seguitata l'impulsione della gravità.

Se si vuol sapere qual sarà il prodotto del secondo tempo, convien rappresentare le due potenze per mezzo di linee tre volte più lunghe; imperocchè la gravità, che averebbe fatto cadere il mobile per AP nel primo tempo, gli averebbe fatto percorrere ap tre volte più lunga in un pari tempo, preso continuamente.

Quest'aumentazione di potenze, se le loro direzioni non mutano ordine tra esse, darà per il secondo tempo la diagonale ab , tre volte più lunga che Aa , e nell'istesso addirizzamento; e se si continuerà la medesima operazione, si avrà finalmente mercè la serie di queste diagonali il piano inclinato AC .

Se muta la direzione della potenza, che fa ostacolo alla gravità, e diventi come ca o da , il parallelogrammo si cambia, e per conseguenza il moto composto, ch'è espresso dalla diagonale.

Il

S P E R I M E N T A L E. 127

Il mobile in vece di discendere per ab , caderà per ag od ab : di modo che, se questo cambiamento di direzione giugneste fino a far operare l'ostacolo perpendicolarmente alla propensione della gravità come ea , allora la caduta del mobile non sarebbe punto ritardata; dovechè lo sarebbe, se la resistenza si facesse per un verso direttamente contrario come ia , il che non ha bisogno d'essere spiegato.

Da questi principj segue, 1. che un corpo non cade mai così presto per un piano inclinato, come per la linea verticale, ch'è la sua natural direzione: imperocchè in luogo di percorrere AP nel primo tempo, si vede che discende sol la quantità Ak ; e nessuno de' punti bgb è così basso come p .

2. Che quanto più il piano è inclinato all'Orizzonte, tanto più la caduta è ritardata: imperocchè discendendo per il piano aC , il mobile non percorre se non la linea ab , nel tempo ch'egli percorrerebbe la linea ag , se discendesse per lo piano aD meno inclinato; e se il piano fosse affatto orizzontale, per quanto si movesse, la sua caduta sarebbe assolutamente nulla.

3. Che la gravità, tuttochè ritardata, accelera la caduta de' corpi secondo le medesime leggi, e le medesime proporzioni, che la gravità che agisce sola e liberamente. Imperocchè si vede, che la linea ab prodotto del secondo tempo, è tre volte più grande che Aa prodotto del primo. Questa differenza è simile a quella delle linee AP ed ap , ch'esprimono cadute libere.

4. Che si può paragonare la velocità d'un mobile, che discende per un piano inclinato, a quella

128 LEZIONI DI FISICA

quella del medesimo corpo, il quale cadesse liberamente per la linea verticale; ovvero i gradi di velocità di due corpi, che percorrono piani differentemente inclinati, poichè si fa la quantità della caduta per ciascun istante preso seguitamente, come Aa , ab , sopra un piano di cui si conosce l'inclinazione, e la differenza di queste quantità sopra differenti piani, come ab , az , in tempi eguali. Laonde prendendo per termine di comparazione il tempo, che il mobile impiegherebbe in cadere perpendicolarmente dall'altezza del piano ap , trovasi che la durazione della sua caduta per il piano inclinato è più lunga tanto, quanto il piano aC , oppur aD , eccede in lunghezza la linea ap . Rendiamo ciò sensibile con una Esperienza.

PRIMA ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Convien disporre le corde della *Figura* 10. in modo, che elleno formino un piano inclinato AB , che abbia due volte altrettanto di lunghezza che di altezza, ed aggiustare il pendulo, in guisa tale che faccia una vibrazione, mentre una palla d'avorio cade dall'altezza AP . Se il mobile G partirà nel medesimo tempo che questa palla,

EFFETTI.

Non giungerà al termine del piano inclinato, se non sul fine del secondo tempo; vale a dire, che

SPERIMENTALE. 129

che la durazione della sua caduta è verso quella della palla d'avorio, come la lunghezza del piano inclinato ch'ei percorre, è verso la sua altezza.

Se si concepisca ap (Fig. 14.) altezza del piano inclinato, come il diametro d'un circolo, e si prenda questa linea per il prodotto della caduta perpendicolare in un tempo dato, la semicirconferenza di questo circolo passerà per l'estremità di tutte le cadute oblique b , g , b , questo metodo una volta che sia inteso, è più semplice per sapere tutt'in un tratto la proporzione della caduta obliqua ML , MN ec. Fig. 15., con la caduta perpendicolare MP . Quest'è un'abbreviazione della regola, che abbiamo data in prima; ed ella basta, quando si conosce l'inclinazione del piano.

Di quà segue la proposizione generale, espressa in questi termini: *Che un corpo impiega per discendere obliquamente per la corda (qual che siasi) d'un cerchio tanto tempo, quantogliene bisognerebbe a cadere per lo diametro intero di questo medesimo cerchio posto verticalmente.*

Ciò è dimostrato per le corde che partono dal punto M , Figura 15., da quello che si è detto circa ab , ag ec., Figura 14., e la medesima prova milita per OP , QP simili, poichè essendo parallele a ML , MN ec. sono loro eguali in lunghezza ed inclinazione: una Esperienza renderà questa dimostrazione più facile a ben riceverli.

II. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

La macchina, ch'è rappresentata con la *Figura* 16. è un gran cirtolo, il di cui diametro che ha circa 3. piedi e mezzo, è terminato da due fori, che ricevono successivamente un traguardo o regolo mobile Bc, scavato in forma di grondaja, e che girando sul punto A, e sul punto B alternativamente, può misurare tutte le corde del cirtolo. Bisogna avere due palle di rame o di piombo, che abbian di diametro circa 6. linee; l'una delle quali si colloca in A, sotto una piccola tanagliuza con molla D, che non lascia cader la palla, se non quando si tira il filo della linguetta. Allorchè si vuol disporre l'altra palla, a discendere per una corda che tenda al punto B, ivi si colloca il centro del regolo mobile, e si mette la palla sotto una tanagliuza simile alla prima, ritenuta da un freno che scorre, e che si ferma dove si vuole col mezzo d'una vite E. Questo medesimo freno porta per di dietro una spezie di chiavetta, che abbraccia la circonferenza del gran cirtolo, e che serve a fissare il regolo a quel grado d'inclinazione che si desidera. Quando si vuol far discendere la seconda palla per una corda vengente dal punto A, convien ivi mettere il regolo, ed una palla nella grondaja appunto nel centro del moto di maniera ch'ella si scorga pel foro A. Si mette in quest'occhio un piccolo cilindro di legno, che si muove con libertà, e sopra l quale si posal' altra
 palla

SPERIMENTALE. 137

palla, ritenuta dalla tanaglietta con molla; e allora la medesima pressione ferma le due palle, a cagione dell'interposizione del piccolo cilindro. Un cursore, che struccia sul regolo, termina la grondaja nel sito dove finisce la corda che si misura.

E F F E T T I.

Essendo il regolo mobile collocato come B C, tosto che si tira il filo che attienfi alle due linguette, le due palle cadono nel tempo stesso, e si rincontrano in B; e questo effetto non varia quantunque la corda del circolo diventi più lunga o più corta, per lo cambiamento d'inclinazione del regolo: parimenti, se il regolo è collocato in A, le due palle arrivano nel medesimo tempo l'una in B, l'altra in F, a qualsivoglia distanza che F sia dal punto A nella circonferenza del circolo; lo che si riconosce, perchè la palla che colpisce l'ostacolo ch'è nella grondaja, e quella che tocca il punto B, non fanno sentire che un medesimo colpo.

SPIEGAZIONI.

Quello che detto abbiamo di sopra, ci dispenserebbe dallo spiegare questa Esperienza, se si è sofferta la fatica di gir dietro alle dimostrazioni; ma quando uno si contenti di sapere in generale, perchè un mobile in simil caso metta tanto tempo a fare una corta strada, quanto a farne una più lunga (il che sembra un paradosso) è d'uopo avvertir bene, che un corpo grave cadendo, non fa mai più di strada, che quando discende per-

133 LEZIONI DI FISICA

pendicolarmente all'Orizzonte; che al contrario non pesa mai meno, di quando è sopra un piano quasi orizzontale; poiché, se il regolo mobile fosse disposto come *Be*, oppure *Af*, la palla non discenderebbe niente: e che perciò le linee descritte con la sua caduta in un tempo determinato, devono essere tanto più corte, quanto sono più all'Orizzonte inclinate, o quanto più (ch'è l'istessa cosa) si allontanano dalla direzione verticale.

APPLICAZIONI.

Poichè il piano inclinato è sempre più lungo, che il piano verticale ad eguale altezza, è facil vedere che una scala, unaerta o costa soave, una scala dirizzata obliquamente, non menano ad una certa elevazione per la strada, la più corta. Nullostante questi mezzi son tutti di trascelti, e si preferiscono a quelli, che potrebbero farci guadagnar tempo. Quando trattasi: esempigrazia, di arrivare per vettura a qualche luogo molto alto, o di far ire in su de' pesi grandi, come delle botti di vino che si traggono fuori da una cantina, o massi di pietra, che si conducono dal battello sulla sponda ec. si fa ciò quasi sempre per piani inclinati, ch' esigono più tempo, che un' ascesa più dritta: Vi sarà dunque qualchè ragione, che ci determina a perdere del tempo; imperocchè naturalmente i mezzi più pronti sono quelli che maggiormente piacciono. E' verissimo, ella c'è; se il piano inclinato ritarda la velocità de' corpi che discendono, vi vuole meno di sforzo per fermare la loro caduta: e quando sono così sostenuti, il lo-

ro pesa è sempre più facile da vincerfi, o sia che vogliasi tenerli in quiete, o che ci venga in acconcio di trasportarli da giù in su. Quando si scelgono costì fatti piani per eleuare de' corpi, per rallentare la loro caduta, il tempo che di più s'impiega non è dunque tanto una perdita, quanto uno scambio delle velocità in forza; la libertà di scegliere tra l'una e l'altra è d'un gran vantaggio nelle meccaniche. Noi potremo qui esaminare, quale proporzione vi sia tra la velocità che si prende, e la quantità di forza che uno è dispensato dall'impiegare sopra un mobile, quand'egli si fa discendere od ascendere per un piano inclinato; ma questa questione troverà naturalmente il suo luogo, quando tratteremo delle macchine che servono a mettere in opera il moto.

Se la velocità attuale d'un corpo che discende per un piano inclinato, è sempre minore che quella del medesimo corpo, che cadesse perpendicolarmente, è verò dire; che a ciascun punto della sua caduta obliqua, la velocità acquistata è eguale a quella ch'egli averebbe, se fosse caduto perpendicolarmente da una altezza simile: tutta la differenza che ci è, consiste in questo, che li bisogna più tempo per acquistare questa velocità con un moto obliquo, che con un moto diretto all'Orizzonte.

Quando il mobile *A*, Fig. 17, è in *a*, ha dunque la libertà che avrebbe se fosse caduto direttamente da *A* in *a*, o da *M* in *1*; quand'egli è in *b*, come se venisse da *B* per una linea che è eguale a *M 2*; ed al fine della caduta per *A a*, *a b*, *b 3*, la somma delle sue velocità acquistate è eguale a quella, che egli averebbe avuto cadendo ver-

ticalmente per M 3; lo che procede dall'essere l'altezza verticale di quest'ultima caduta, eguale a quella delle tre prime prese insieme, e dall'essere l'accelerazione per il piano inclinato, proporzionale a quella d'una caduta verticale e libera.

Ora abbiain detto, che la caduta accelerata dà al mobile una forza capace di farlo risalire tant'alto quanto il luogo da cui è disceso; e però che questa accelerazione segue le stesse leggi sì nella caduta obliqua, come nella caduta perpendicolare all'orizzonte. cotesta proposizione, la quale noi abbiain solamente enunziata, proverassi con far vedere mercè di esperienze, che un corpo rimonta quanto è disceso, in qualunque direzione che la sua caduta è la sua ascensa si facciano. Ma afine di provar tutto in uno stesso tempo, bisogna premettere alcune cose intorno alla discesa de' corpi gravi per le curve.

Detto già abbiaino altrove, che una linea curva debb'essere considerata, come percorrente molti piccoli piani inclinati fra essi, e quando si applichi successivamente a tutte queste parti diversamente inclinate, tutto quello che abbiain detto d'un solo piano, la cui inclinazione fosse uniforme, riuscirà facile di veder la cagione delle variazioni, che le diverse curvature fan nascere nel moto de' corpi gravi, sì da sù in giù, come da giù in sù.

Per ben ciò intendere, supponete che il quarto di circolo AED , Fig. 18. sia composto di 4 linee rette: il mobile percorrendole sarà sostenuto sopra piani tanto più inclinati, quanto più egli s'avvicinerà al termine della sua caduta D , ed è

evi-

evidente, dopo quanto abbiain detto di sopra, che se l' effetto della quantità fosse uniforme, egli metterebbe molto meno di tempo in percorrere la parte AB, che EC, CD, perchè questa prima linea s' allontana molto meno che le altre dalla direzione verticale. Ma a causa dell' accelerazione, se il mobile si trova da C in D, sopra un piano più inclinato, egli ha pure più di velocità acquistate; e sendo che cotesta velocità attuale del mobile nel punto C, dipende dalle velocità particolari, che l' inclinazione delle altre parti gli ha permesso di prendere, ci ha tal curva, nella quale coteste prime parti più approssimanti si alla direzione verticale, rendono più pronto il principio della caduta, e più grande la totale velocità: tal è la linea FGH, Fig. 19. che nomasi cicloide, curva decantata in Geometria per lo gran numero, e per l' importanza delle sue proprietà, e in Meccanica per l' uso che ne fece il Sig. Haghens, quand' egli applicò le vibrazioni del pendulo agli orologi.

Un mobile non discende dunque così presto per un quarto di circolo, come per una cicloide; perchè il principio della curvatura nella prima delle dette due linee, più si scosta dalla direzione verticale che nell' altra: ed i ritardi cagionati sul fine dall' inclinazione del piano, non sono bastevolmente compensati dalle velocità precedentemente acquistate. Con questa ragione si spiega un effetto, che pare ancor più straordinario; ed è, che la discesa che farsi per la corda la qual misura l' arco di circolo, come HI, tuttochè più corta, e nullostante men pronta; lo che è contrario al pregiudizio, in cui siamo, che la strada

136 LEZIONI DI FISICA

più corta sia sempre quella la quale dimanda meno di tempo: per verità questa differenza non è grande, e non è nè men sensibile quando le corde e gli archi sono piccoli.

Tempo è adesso di provare che i corpi risalgono alla medesima altezza da cui son discesi, qualunque direzione che abbiām avuta cadendo, e per qualunque specie di linea che si conducano ascendendo.

III. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Nel centro del gran circolo della macchina che adoperata abbiām nell' antecedente esperienza; attaccasi un pendulo fatto d'un filo di seta, e d' una palla di piombo che può avere 7 od 8 linee di diametro, e si ferma e sostiene con viti il piede della macchina in maniera che il filo del pendulo in quiete sia parallelo alla linea *A B*. Bisogna avere due punteruoli di ferro, che si ficcano perpendicolarmente al piano del circolo l' uno ne' punti *c*, *d*, Fig. 20. e l' altro ne' punti *e*, *f*, *g*, successivamente.

EFFETTI.

Quando si lascia cadere il pendulo liberamente dal punto *b*, s' ei non incontra ostacoli, sollevasi sino in *g*; se incontra un punteruolo in *c*, ascende in *f*, e se il punteruolo è collocato in *d*, ascende in *e*; giudicasi facilmente del luogo do-

dove egli ascende, solchè si ponga in *ef*, egua
punta di ferro, ch'egli va a toccare.

S P I E G A Z I O N E.

La palla del pendulo, caduta da *b* in *b*, e non incontrando ostacolo, impiega la velocità ch'ella ha acquistata per la sua accelerazione, in un arco di cerchio, che ha il medesimo centro, che il primo arco da lei già descritto; la punta di ferro che poscia si trova nel punto *c*, oppur *d* diventa un nuovo punto fisso, attorno del quale ella impiega quanto ha di moto; e in vece di descrivere l'arco *bg*, risale per *bf*, o *bc*, secondo la lunghezza del raggio che le resta, dopo l'incontro della punta, o piuolo di ferro; ma quantunque ella risalga per archi molto differenti, è facil vedere, ch'ella arriva sempre alla medesima altezza, imperciocchè *defg* sono nella medesima linea.

Questa esperienza provarebbe troppo, se il centro della palla si elevasse puntualmente nella linea *dg*, perchè la resistenza dell'aria, ed alcuni piccioli sfregamenti inevitabili, gli fan perdere un poco della sua velocità: perciò si dee por mente, che quand'ella tocca il piuolo posto nel punto *e*, *f*, ovver *g*, vi manca tutto il suo semidiametro a far che il suo centro sia arrivato a questa altezza.

APPLICAZIONI.

Questa esperienza ci guida naturalmente a dir qualche cosa di quella specie di moto, che *oscillazione* si appella. L'uso frequente, che di esso moto faasi negli oriuoli, e la connessione ch'egli ha con la Fisica, per li mezzi soliti adoprarsi per eseguirlo, esige che noi facciam conoscere quel che più importa di saperne; ma ristignerci dobbiamo a quello che può all'esperienza sottomettersi, e perciò che è puramente matematico da noi rimettersi al lettore agli scritti del Galileo, de' Sig. Hughes, Mairan, ec. ed agli estratti che ne sono stati fatti.

Chiamasi *oscillazione*, o *vibrazione di pendolo*, il moto d'una palla di piombo, o di qualch'altro corpo equivalente, attaccata per un filo, o per una picciola verga di metallo, ad un punto fisso, attorno del quale ella descrive un arco, come nell'esperienza testè spiegata.

Distinguonsi due sorte di penduli; il semplice ed il composto. Il pendulo semplice sarebbe quello, il cui filo di sospensione non avesse alcuna gravità, ed ove la palla non pesasse se non per un solo punto, come se per esempio tutta la sua gravità risiedesse nel centro. Il pendulo composto, è quello che pesa per più punti della sua lunghezza, come se per esempio, la medesima verga di sospensione portasse due palle, l'una al di sopra dell'altra. Quando anche non ci avesse se non una palla attaccata alla medesima verga, se questa verga ha un peso considerabile, o se la palla è grande (ch'è il caso più ordinario in
pra-

pratica) allora questo pendulo debb' essere considerato come composto, benchè l'uso porti di nominarlo semplice. Quello che qui saremo per dire in prima circa la teoria del pendulo, debbe intendersi del più semplice, cioè di quello, tutto il cui peso risiede nel punto *b* Fig. 20.

Quel punto di gravità che descrive gli archi, chiamasi *centro di oscillazione*; ed il punto *a*, attorno dal quale si muove, chiamasi *centro di Moto*.

Quando la palla del pendulo è condotta da *b* in *b* e lasciata libera, la sua gravità che la sollecita discendere, ed il filo che la ritiene sempre in distanza eguale dal punto *a*, le fan descrivere l'arco *a b*; ma un corpo che discende così per uno o per più piani inclinati, acquista la medesima velocità ch'egli avrebbe, se fosse disceso perpendicolarmente dall'altezza *d b* del piano; egli continua dunque il suo moto risalendo in *g*, cioè ad una altezza eguale a quella donde è partito. Allora avendo consumata tutta la sua velocità, non può più passar oltre; ma non può nè meno rimanere in quiete, perchè il suo peso esige ch'egli discenda; e però che egli è nell'istesso caso, in cui era nel punto *b*, egli dee ritornare da *g* in *b*, e da *b* in *b*, e così di mano in mano per le altre vibrazioni: dal che si vede, che se alcun moto s'accosta al perpetuo, niuno meglio di quello d'un pendulo; poichè se si rogliesse la resistenza del mezzo, le oscillazioni sarebbono sempre eguali, avendo la palla sempre in *b* velocità sufficienti per risalire all'altezza, da cui convien ch'ella discenda per ricuperarne di simiglianti.

Ciò benissimo si prova con la macchina che
abbia-

140 LEZIONI DI FISICA

abbiamo descritta nella Fig. 17. dell' quarta Lezione, adoprando un filo tenuissimo, e una palla di piombo di 7 in 8 linee di diametro; imperocchè così facendo, si riduce la resistenza dell' aria a pochissima cosa, e tutte le vibrazioni dividonsi in due archi sensibilmente eguali, nel punto più basso della caduta.

Abbiamo precedentemente veduto, che un mobile il quale discende per un arco di cerchio, fa la sua caduta un poco più presto, di quello che cadeffe per la corda di quest' arco, e più lentamente, che per una mezza-cicloide inversa; ma però che queste due curve si confondono nella lor parte inferiore D *; quantunque abbiano proprietadi differenti l' una dall' altra, è manifesto, che se il pendulo farà solo piccole vibrazioni, si potrà misurare il suo moto coll' arco ch' egli percorre. Si fa che vi è sempre una proporzione regolata tra un arco di circolo e la sua corda, di maniera che se l' una può essere un termine di comparazione per la misura delle vibrazioni, l' altra potrà pur divenir tale.

Ora provato abbiamo di sopra, che la caduta che farsi per la corda (quale che siasi) d' un circolo, dura tanto quanto la caduta perpendicolare per il diametro intiero del medesimo circolo; vi ha dunque una ragione o proporzione costante tra la durata d' una mezza vibrazione e il diametro del cerchio, di cui ella è l' arco, o sia la lunghezza del pendulo che n' è il raggio.

Il diametro f 3, Fig. 17. collocato che sia perpendicolarmente all' Orizzonte, se è di tal altezza, che un mobile lo discenda in un secondo, il me-

* Fig. 19.

S P E R I M E N T A L E. 141

medesimo mobile farà all'estremità del raggio Mb delle mezze vibrazioni $b\ 3$, oppur $3c$, ciascuna delle quali durerà un secondo.

Ma se si accorcierà o si allungherà il pendulo; il diametro del circolo di cui egli è sempre la metà, sarà più corto o più lungo proporzionalmente; e però che ò mistieri di maggior tempo per discendere da una più grande altezza verticale, le vibrazioni dureranno eziandio più o meno, secondo che il raggio all'estremità del quale esse si faranno, farà metà d'un diametro di circolo più o meno grande.

Finalmente, quando il tempo d'una mezza vibrazione è una volta determinato, e si fa dalla lunghezza del pendulo, a quale altezza perpendicolare ella corrisponde, è facil sapere da quale altezza verticale caderebbe il mobile nel tempo d'una vibrazione intera; imperocchè facendosi queste due semi-vibrazioni in tempi eguali; e facendosi l'accelerazione secondo i numeri impari, 1, 3, 5, ec. se la prima mezza-vibrazione ha durato un secondo, e corrisponda questo tempo ad una discesa di 15. piedi, il secondo tempo simile produrrà consecutivamente 3 volte 15, cioè 45 piedi; così la somma della discesa perpendicolare per due secondi farà di 60 piedi.

IV. E S P E R I E N Z A .

P R E P A R A Z I O N E .

Togliesi il regolo mobile dalla macchina, che abbiain rappresentata con la *Figura 16.* e vi si lascia il pendulo come nell'esperienza precedente.

te; ritienfi la palla ad una piccola altezza, come nel punto G, col mezzo d'una tanagliuzza, con molla, che fermasi alla circonferenza del circolo: si ritiene parimenti un'altra palla simile in A, e si aggiustano le linguette in maniera, che tirando il medesimo filo, si faccian aprire nell'istesso tempo le due tanagliuzze. Il bastone, o braccio DH, che noi abbiam troncato nella figura, deve essere tanto lungo che su vi si possano misurare tre lunghezze eguali ad AB, al di sopra del punto A, per collocarvi la tanagliuzza e la palla.

EFFETTI.

1. Quando si fann'aprire le due tanagliuzze, la palla A, e quella del pendulo G partono nello stesso tempo, e s'incontrano in B.

2. Se si ripete l'esperienza, aumentando di molto l'arco del pendulo, s'osserva che la palla G arriva un poco più presto che l'altra in B.

3. Se si trasporti la tanagliuzza e la palla A all'estremità del bastone, in maniera ch'ella sia 4. volte più elevata, che il diametro AB; ripetendo così l'esperienza, giugne la palla A in B, quando il pendulo finisce la sua vibrazione, lo che si può facilmente osservare, con far battere il pendulo contro qualche ostacolo sonoro; che si porrà un po' più basso del termine della sua vibrazione.

4. Se si faccian'oscillare due penduli della medesima lunghezza, come G, M*, e sieno i loro archi eguali, se partono nel medesimo tempo,

* Fig. 16.






Fig. 14.





S P E R I M E N T A L E. 143

po, incontransi sempre insieme rimpetto alla linea DB; ed al contrario se sono di differenti lunghezze, come G, L, quand' anche partissero insieme, il più corto precede l'altro.

S P I E G A Z I O N I.

Queste esperienze, ed i mezzi ch' adoprano per eseguirle, sono spiegate da tutto quello che abbiamo detto di sopra intorno al pendulo, l'applicazione n'è così agevole a fare, che stimiamo cosa superflua il fermarvici maggiormente.

A P P L I C A Z I O N I.

Si fa, di quale importanza sia la misura del tempo, non solamente nella vita civile, per dar ordine alle nostre azioni, e regolare i doveri della società; ma ancora nella maggior parte delle Scienze, particolarmente nella Astronomia e nella Fisica, ove la durata degli effetti è bene spesso l'oggetto principale del nostro studio, ed il mezzo più accomodato a far esattamente conoscere la cagione. Il pendulo, siccome raccogliesi da ciò che provato abbiam dianzi, è un istrumento, che meglio di tutti quelli, che altronde ci son noti, può misurare parti di tempi eguali fra esse, e additarcene la quantità per mezzo del tempo e del numero delle sue oscillazioni: coloro che hanno fatta la scoperta, o che l'hanno felicemente a più usi applicata, meritano qualunque applauso.

Appena ebbe il Galileo trovate le proprietà del pen-

144 LEZIONI DI FISICA

pendulo, che sentì l'avantaggio, che se ne potea raccorre; l'uso ch'egli medesimo ne fece per regolare le sue osservazioni, e le sue esperienze, gli procurò tale esattezza e precisione, che in altra guisa averebbe durata molta fatica a cogliere; e lo sollevò in qualche modo dal duro travaglio che avreobe potuto costargli questa invenzione.

Ma il pendulo, qual lo adoperava egli, non poteva misurare se non una quantità di tempo poco notabile, perchè la resistenza dell'aria diminuiva a poco a poco l'estensione delle oscillazioni, e le faceva finalmente cessare, se non si usava la diligenza di rinvigorire il moto. In oltre bisognava avvertire di contarle l'una dopo l'altra, per averne la somma; e questa suggezione rendeva in molte occasioni impraticabile questa nuova misura del tempo di maniera che il pendulo era allora un istrumento meramente da Filosofo, di cui non si poteva approfittare il comun degli uomini, che ognor preferiscono la facilità all'esattezza, quando l'una e l'altra non vanno assieme.

L'Hughens, dopo d'aver usata una fatica da' soli Geometri intesa, fece un'applicazione del pendulo, che può in pratica giovare a tutti; lo aggiunse agli oriuoli, per regolare il loro moto, e questa ingegnosa aggiunta ha avuto tanto buon esito, ed è stata sì generalmente ricevuta, che gli oriuoli da camera, indi hanno preso il nome di *penduli*.

Per poter intendere, come un pendulo renda più esatto un oriuolo, convien sapere, che queste sorte di strumenti sono rinvigorite da una molla, o da un peso, che mette in moto un certo numero di ruote, col mezzo delle quali gli stili, od aghi segna.

segnatori percorrono le graduazioni della mostra : se questo moto non fosse ritenuto da un qualche moderatore, sarebbe troppo precipitato ; e lo stilo che segna le ore, non potrebbe mai andare sì lentamente, che facesse due soligiri in 24. ore.

Ma se il moderatore è soggetto ad inegualità, o perchè egli stesso le cagioni, o perchè si lasci dominare da quelle delle ruote, o della molla che l'avviva, il moto sarà inegualmente moderato, e lo stilo non misurerà in tempi eguali parti eguali della mostra; ci saran dell'ore, che parranno più lunghe, o più corte del dovere.

A questo moderatore, fin allora imperfetto, si è sostituito il pendulo, ed ecco in qual modo.

Come che tutte le ruote s'infilzano reciprocamente, e non possono nè muoversi nè fermarsi l'una senza l'altra, se l'una di queste ruote anderà regolarmente, il moto comune di tutte l'altre sarà regolar. Una di esse, che si chiama *rocchetto*, o *ruota d'incontro*, non può girare se non quando un certo pezzo, che porta due alette, o cosa simile equivalente, levalsi per lasciar passare un de' suoi denti. Se dal passaggio d'un dente all'altro, scorrano sempre tempi eguali, e sia esattamente divisa la ruota, è manifesto, che il moto di questa ruota, e quello di tutte le altre, colle quali ella comunica, sarà perfettamente uniforme. A questo pezzo adunque, che di *scoffamento*, o d'*evitazione* appellar si può, si è adattato il pendulo, acciocchè le sue vibrazioni, la durata delle quali è sempre eguale, rettificassero le piccole irregolarità, che possono provenire dal lavoro e dall'azione delle ruote, o della molla.

Abbiain detto, che le oscillazioni che si fanno

per gli archi del medesimo circolo, non sono d'una perfettamente egual durazione, quando cotesti archi sono più grandi gli uni che gli altri, quantunque questa differenza sia molto picciola, e si possa trascurarla, quando trattasi di un tempo poco notabile, tuttavolta dopo un gran numero d'oscillazioni, tai picciole quantità moltiplicate farebbono una somma sensibile; e questa cagion d'errori s'è ben conosciuta dall'Ugenio, il quale prevede, che col tempo le ruote d'un oriuolo si sporcheranno, gli olj si addenserebbono, gli sfregamenti potrebbero crescere, in somma che il moto verrebbe a rallentarsi, e che il pendulo destinato da prima a far le oscillazioni d'una certa grandezza, le farebbe in appresso più corte. Quindi fu egli mosso a rintracciare una curva d'oscillazione, nella quale fosse indifferente assolutamente, che dal pendulo si misurassero grandi o piccioli archi. La riuscita delle sue ricerche, nelle quali pigliarono parte molti altri uomini dotti, fu così felice come curioso era il loro oggetto, e di momento per la Geometria; Egli trovò che la cicloide aveva la proprietà da lui cercata, e la sostituì al circolo, mettendo nel centro del moto del pendulo, una porzione di questa curva, attorno della quale il filo che sospendeva la verga, poteva avvolgersi. Ma come abbiain fatto vedere colla *Figura 19.* il circolo e la cicloide si confondono nella parte inferiore; le oscillazioni si fanno del pari esattamente nel circolo, se elleno hanno poca estensione; e a questo metodo si sono appigliati dipoi gli artefici d'oriuoli, per evitare una certa flessibilità, che conveniva dar alla verga nella sua parte superiore, per ubbidir alla porzione di cicloide, che
dove-

doveva determinare la natura del suo moto.

Ma se la Geometria ha somministrati de' mezzi per rendere le vibrazioni sempre eguali nella loro durata, mercè la natura, o la quantità della curva, nella quale esse si fanno; vi ha delle cause fisiche, che spesso vi apportan disordine, per le alterazioni, che ne provengono alla lunghezza del pendulo.


Essendo di mestieri, che il pendulo domini e regna il pezzo principale, che serve allo *scansamento*, non si può sospendere la palla, o la lente che fa le vibrazioni, con un filo tenue e flessibile; s'adopra ordinariamente una verga d'acciaio, che ha circa una mezza linea di grossezza, e tre o quattro linee di larghezza. Queste due dimensioni, massimamente la sua lunghezza, non sono costanti fuorchè in una temperatura perfettamente eguale; imperocchè dal più gran freddo al più gran caldo, un pendulo diviene sensibilmente più o meno lungo, per la dilatazione, o per la condensazione del metallo, come lo farem vedere, parlando degli effetti del fuoco. Le oscillazioni, per questa sola cagione, saranno dunque più lente nella state che nel verno; il medesimo orologio avanzerà e ritarderà secondo le differenti stagioni, o gli stati differenti dell'aria, nella quale egli è.


Avendo i Filici sospettato un simile effetto, furono rilenti a decidere, sul fatto dell'osservazione di M. Richer, che noi abbiamo più sopra toccata; molti credettero, che il ritardo del pendulo, attribuito da lui alla gravità o peso più diminuito per la forza centrifuga verso l'Equatore, dov'egli osservò tale effetto, che in Francia, pro-

venisse dal calore del clima, che aveva allungato il pendulo, o diminuita la densità del mezzo; ma le sperienze, che sono state fatte di poi con grande accuratezza da più persone intendentissime, e massimamente dagli Academici, che sono andati per ordine del Re altri sotto l' cerchio polare, altri all' Equatore, per toglier le misure de' gradi, che debbon determinare, e certificare la figura della Terra; cote'ste sperienze, dico fan conoscere evidentemente, che non la temperatura del clima, ma la sua posizione, fu che obbligò M. Richer ad accorciare il suo pendulo, perchè lo stato dell' aria alla Caienna non è tanto dalla temperatura di quello che abbiamo a Parigi, diverso, se riguardasi la correzione che convien fare al pendulo. Imperocchè, secondo M. de Mairan (*a*), di cui è nota la perspicacia e l' esattezza, al più semplice pendulo che si possa eseguire, come una palla di metallo d' un pollice di diametro, sospesa ad un filo d' ottone, debbe avere, per battere i secondi a Parigi, 3 piedi, 8 linee, e $\frac{17}{30}$ di linea, a contare dal centro d' oscillazione fino a quello del moto; e da tutte le sperienze fattesi in diversi tempi e da diverse persone, risulta costantemente, che un tal pendulo sarebbe troppo lungo di due linee e più, per battere i secondi ne' climi vicini all' Equatore: differenza troppo grande, e da non potersi attribuire alla temperatura del luogo; imperocchè la sperienza fa vedere (*b*), che un calore eguale a quello dell' acqua bollente, non allunga se non d' un terzo di linea una verghetta di ferro di tre piedi 8 li-

(*a*) Mem. de l' Acad. des Scienc. 1735. p. 203.

(*b*) Ibid. 1735. pag. 214.





8 linee e mezza, quale viene adoprata per il pendulo.

Per dare al pendulo tutta la perfezione ch'egli merita, hanno i Fisici pensato di contrapporre a se medesima la cagione, che ne fa varia la lunghezza: la dilatazione allungando il filo, fa discendere troppo giù il centro d'oscillazione; questo disordine non farà più disordine, se qualche altro pezzo dilattato dallo stesso calore e nel medesimo tempo, opererà per contrario verso, e con tal proporzione, che l'allungamento del filo non abbia il suo effetto; perciò si sono inventati più mezzi, che hanno benissimo riuscito. Il Sig. Giuliano *le Roi*, che unisce alla perizia di valentissimo artefice, le cognizioni fisiche, e non perde di vista cosa alcuna di ciò che può perfezionare l'arte dell'orivolaio, ne ha proposto ed eseguito uno, la cui riuscita è convalidata dall'esperienza di più anni. Ed in ultimo luogo M. Cassini diede all'Academia il progetto d'un altro, che fu molto applaudito, perchè è più comodo a praticarsi, che la maggior parte di quelli che sono fin ora noti, ed è nè più nè meno esatto. Ma essendo che il male, ed il rimedio di cui favelliamo, hanno la loro sorgente comune, nella dilatazione più o meno grande de' metalli rimettiamo quello che se ne dovrebbe dire, alla Lezione, che tratta del Fuoco, e degli effetti del calore sovra i corpi.

ARTICOLO II.

Del Moto de' Corpi cagionato dalla
gravità, e da una forza attiva
ed uniforme.

COtesta forza, che noi supponiamo adoperare in un con la gravità sul medesimo mobile, si chiama ordinariamente, *Forza proiettile*; tale è lo sforzo del braccio, che gitta una pietra, o quello della polvere che caccia una bomba.

Determinato che sia questo movimento dal Motore, ei continuerebbe uniformemente, se la resistenza de' mezzi, gli sfregamenti ec. non ci ponessero ostacolo, benchè ciò sia inevitabile nello stato naturale, tuttavia per ora ne prescindiamo, perchè con maggiore semplicità e facilità, darassi a conoscere quello che seguirebbe, se questi ostacoli non ci fossero, di quello che si possa dire esattamente ciò che di fatto segue, quando ci sono.

Quando un colpo di racchetta, *Figura, 21.*, o qualch'altra impulsione, determina una palla ad alzarfi da giù in sù perpendicolarmente all' Orizzonte, ella le imprime una forza direttamente opposta alla gravità, il moto del mobile sarà dunque l'effetto della forza proiettile, meno quello della gravità; cioè, che se la prima è capace di produrre un'ascesa di 60 piedi ogni secondo, postochè l'altra operi una caduta di 15 piedi in
egual

SPERIMENTALE. 151

egual tempo, l'elevazion della palla si ridurrà a 45 piedi per il primo secondo. Nel secondo seguente, avendo la gravità tre volte più d'effetto che nel primo, cagionerà un calo di 45 piedi sopra li 60, che la palla avrebbe fatti in virtù della forza proiettile, che adopera uniformemente; perciò ella non si solleverà, se non 15 piedi, dopo di che cesserà di ascendere, perchè allora la gravità ha dell'avantaggio sopra la forza proiettile; questa dà sempre al mobile una velocità di 60 piedi ogni secondo; quella nel terzo tempo gli dà una velocità di 5 volte 15, cioè di 75 piedi per un verso contrario. Avviene dunque in simil caso, quello che noi abbiám mostrato, che avvenirebbe ad un corpo, il quale risalisse in virtù delle velocità acquistate con la sua caduta accelerata *

Dirigiamo adesso la forza proiettile orizzontalmente, e supponendola sempre uniforme, dividiamo il suo effetto totale FG, *Figura 22.*, in quattro parti eguali, che rappresentano tanti istanti simili. Se il mobile F, nel primo tempo, discende la quantità 1 a in virtù del suo peso, nel tempo seguente la medesima causa operando tre volte più lo farà cadere la quantità bc, che aggiunta al prodotto della prima caduta, darà 2 c; aggiungendo parimenti a quest'ultima quantità 3 d, l'effetto del terzo tempo de, ed a questa somma 3 e, il prodotto del quarto tempo fg, si averà una serie o mano di punti Faceg, che formeranno una specie di curva, da Geometri chiamata *Parabola*.

Toltone la direzione perpendicolare all' Orizon-

K 4 te,

* I. Sezion. VI. Esperien. Fig. 12.

152 LEZIONI DI FISICA

te, si fa sempre il moto composto di queste due forze (la *proiettile*, e quella della *gravità*) sensibilmente in cotesta curva, che *Parabola* abbiain nominata, qualunque sia la direzione in cui metta la forza proiettile, purchè ella sia uniforme, e la forza della gravità adoperi sul mobile nel medesimo tempo. La sola differenza consiste nell' *ampiezza*, che è più o meno grande, come $H g$, ovvero $H i$.

Supponendo, per esempio, che il mobile M , *Figura 23.*, tenda direttamente al punto P per una forza proiettile, se si torranno da questa forza, per una seguela d'istanti eguali, altrettante parti ch' esprimano gli effetti della gravità, crescendo fra esse come il quadrato de' tempi: cioè, che dopo il secondo tempo ella abbia perduto 4 volte più che dopo il primo, nel fine del terzo 9 volte d'vantaggio ec. l'estremità di tutte coteste linee, ch' esprimono i ritardi causati nella forza proiettile dalla gravità, darà la curva $M r q$, cioè due semi-parabole simili a quella della *Figura 22.* che si congiungono nella sommità r .

Prima che metter ciò in Esperienza, è opportuno d'avvertire, che non si debba aspettar effetti perfettamente conformi alla teoria; li Geometri enunzian le cose con esatto rigore, perchè basta solo, che suppongano gli elementi ch' entrar debbono ne' loro calcoli; ma quando bisogna che la Fisica vi s'intrametta, v'è quasi sempre da battere qualche cosa, perchè si ha per lo più supposto troppo, o troppo poco; la forza proiettile, e la gravità, non possono produrre insieme un moto veramente parabolico, se non quando, elleno non soffrono alterazione veruna; quando, esempigra-
zia,

S P E R I M E N T A L E. 153

zia, la prima è sempre uniformemente uguale in tutti gl'istanti, e la seconda è sempre appunto accelerata secondo la progressione da noi stabilita; e ciò non succede già nello stato naturale, a cagione della resistenza dell'aria, che ritarda l'una e l'altra, e le ritarda irregolarmente.

Vi farebbe qualch'altra cosa da dire, ponendo mente che la direzione della gravità non è parallela a sè stessa, cioè, che tutte le linee perpendicolari all'Orizzonte, per l'estremità delle quali il mobile passa per descrivere la curva *Faceg*, non sono parallele, come si suppone: poichè tendono tutte al centro della terra; ma la forza proiettile che noi siam capaci d'imprimere ad un corpo, ha sì poca estensione, che questa cagione ha solo luogo nel rigore geometrico, e non produce alcun effetto sensibile.

V. ESPERIENZA.

P R E P A R A Z I O N I.

La *Figura 24.* rappresenta una cunetta più lunga che larga, la quale porta sopra uno de' suoi lati grandi un piano verticale, sopra uno de' piccoli, un grosso tubo di vetro basso del quale è una spezie di cocchiame, la cui chiave porta in qualunque sorta di direzione la piccola sboccatura *A* che si apre, girando un'altra chiavetta *B*; mettesi del mercurio nel tubo fino ad una altezza convenevole; e il cocchiame è forato in tal guisa, che gli sfregamenti son diminuiti più ch'è possibile.

E F.

EFFETTI.

1. Se la sboccatura farà verticale, allorchè si lascia fuggire il mercurio, succederà un piccolo getto nella direzione medesima verticale, il quale alzatosi un po' men alto della superficie superiore della doccia C, ricade sopra sè stesso, e si spande come i getti d'acqua che veggonsi ne' giardini.

2. Quando si darà alla sboccatura la direzione orizzontale AD, ed il mercurio farà ad una altezza convenevole nel tubo, il getto si farà in faccia alla parabola AED,

3. Quando la sboccatura farà obliqua, come nella direzione AF, od AG, il getto descriverà l'una o l'altra delle parabole AIK, od ALM.

SPIEGAZIONE.

Quando il mercurio esce per la sboccatura, vien egli spinto da una forza progettile, che gli proviene dalla gravità di quello che è nel tubo; e questa forza può essere considerata come uniforme, se il getto dura poco, e la superficie C del serbatoio o condotto non s'abbassa sensibilmente. Il mercurio si solleva fin a tanto, che la sua gravità che convien vincere, abbia consumato interamente la sua forza progettile; e quest'effetto succede avanti che egli arrivi all'altezza della superficie C, perchè gli sfregamenti e la resistenza del mezzo, indeboliscono un poco quella forza che lo fa ascendere.

Quan-

SPERIMENTALE. 155

Quando il gitto di mercurio scatta in una direzione orizzontale, continuerebbe nella medesima linea, se ubbidisse solo alla forza che fuori lo spigne; ma dacchè è uscito, la gravità se ne impossessa anch'ella, e la sua azione che cresce come i numeri impari 1, 3, 5, ec. fa vedere occularmente quello che abbiamo supposto nella Fig. 22.

Finalmente si può dire la stessa cosa della linea che il mercurio descrive, allorchè sfugge per AF, od AG: la sua gravità non gli permette di continuare in essa linea il suo moto; ma ne lo scosta per quantitati conformi alle leggi della sua accelerazione, e la linea ch'egli fa è sensibilmente una parabola, perchè verso il fine, quando la resistenza dell'aria fa più d'ostacolo, il getto espandendosi diventa più largo, e la parte superiore non esse quasi punto dalla parabola geometrica, ch'è disegnata sul piano.

Si può qua pur chiamare in prova le Sperienze sopra il Moto composto, ove abbiain fatto entrare la gravità per una delle potenze componenti; tali sono quelle che rappresentate abbiaino colle Figure 11. e 13. Imperocchè nell'una e nell'altra, la curva che col suo moto il mobile descrive, e che allora non abbiain nominata, è anch'essa una parabola, come veder si può, applicandovi le regole, che di sopra abbiain poste.

APPLICAZIONI.

Tutta la *ballistica*, cioè quella parte dell'artiglieria, che consiste in misure con esattezza il gitto


156 LEZIONI DI FISICA

gitto d'un corpo pesante, come una bomba, una palla di cannone ec. consiste nella combinazione che convien fare della forza progettile, e della gravità del mobile. Si concepisce facilmente dalla sola ispezione delle *Figure* 22. e 23., che regolata una volta che sia la direzione d'una palla di cannone o d'una bomba, l'amplitudine Hg od Mq , è tanto maggiore, con quanto più di velocità il mobile è sospinto, imperocchè, se potesse percorrere nel primo instante tutta la distanza che v è tra le due parallele FH , Gg , od MC , Pq , la parabola passerebbe al punto K , e non differirebbe molto da una linea retta: così un mortaio con certa inclinazione, caccia tanto più lontana la bomba, quanto più di velocità la forza progettile imprime; ma questa forza progettile viene dall'esplosione della polvere, ed è cosa difficilissima stimare con accuratezza il valore di tale impulsione. Ella dipende principalmente dalla qualità della polvere, e dalla quantità che s'infiama di essa polvere; imperciocchè non è da credere, che il fuoco prenda per tutto, avanti che sfugga la palla: l'Esperienza ha dimostrato, che una buona parte della polvere onde il pezzo è caricato, è perduta per non aver preso fuoco, come il resto; quindi si vede, che una delle quantità più essenziali da conoscersi, per giudicare il moto d'una bomba, è soggetta a molta variazione.*; e perciò quantunque si richiegga con ragione, che gli uffiziali d'artiglieria sieno bene istruiti de' principj, si hanno più ragioni ancora per volere, che sieno ben esercitati nelle Scuole, a tal fine instituite.

LE-

* Mem. de l'academ. des Scienc. 1716. p. 79.





LEZIONE SETTIMA

Sopra l'Idrostatica.

Chiamasi *Idrostatica* la Scienza che ha per oggetto, il peso e l'equilibrio de' Liquori. Quantunque la gravità di questi corpi sia la stessa che quella degli altri, e soggiaccia alle medesime leggi, da noi insegnate nella Lezion precedente, lo stato nondimeno di liquidità dà luogo a' fenomeni particolari, che importa di conoscere, e che meritano d'essere separatamente trattati.

Archimede tra gli antichi Filosofi, è quegli che pare abbia fatto più progresso, ch'altri in questo studio; a lui ancora in oggi si dà l'onore, d'aver trovata la maniera ingegnosa, onde scoperle che una corona d'oro non era al grado o saggio a cui doveva essere; e fu di pesarla nell'acqua. Tra i moderni, il Galileo, i Torricelli, Pascale, Cartesio, Guglielmini; e in questi ultimi tempi M. Mariotte, hanno aggiunte molte belle cognizioni alle passate; e le loro esperienze convincenti e curiose, ci hanno addestrati a sapere quello, che aspettar o temer dobbiamo dalla forza dell'acque, che operano col loro peso; e come possiam rivolgerla a nostra utilità, impiegandola col mezzo delle macchine idrauliche.

I liquori, secondo l'idea che n'abbiamo data nella nostra prima Lezione, sono materie, le molecu-

158 LEZIONI DI FISICA

lecole delle quali, in estremo picciole e mobili, non hanno fra esse una molto sensibile coerenza; così che ciascheduna ubbidisce liberamente al suo proprio peso, al contrario de' corpi solidi, le cui parti legate e aderescenti le une alle altre, resistono più o meno gagliardamente alla loro separazione, si muovono tutte insieme, ed esercitano in comune la lor gravità,

Non cerchiam noi qui le cagioni della liquidità, nè le diverse proprietà, convenienti a questo stato de' corpi: tali quistioni troveranno il loro luogo in progresso. Per ora s'ha a trattar solamente della maniera onde i liquori pesano; e postochè tutto quello ch'è liquido, non è tale egualmente, giova avvertire, che ciò ch'esigono le leggi dell'Idrostatica, tanto meno puntualmente s' eseguisce, quanto più i corpi s'allontanano dalla perfetta liquidità. L'acqua e l'olio si spandono, se i loro vasi vengono a frangersi; ma l'effusione intiera dell'olio è più lenta.

I fluidi, le parti de' quali sono così sottili, così mobili come quelle de' liquori, hanno con essi le proprietà istesse; ma le sono composti di molecole grossolane, e capaci di avvinciarsi fortemente l'une coll'altre, la lor gravità ha degli effetti un po' differenti: l'aria così puntualmente come l'acqua, prende la forma del vase che la contiene; ma il fumo non si spande all'istessa maniera, nè con eguale prontezza nel luogo dov'egli è.

Per formarfi della gravità de' liquori, o de' fluidi un'idea adeguata, che faciliti l'intelligenza de' fenomeni, che abbiain da spiegare, e metterli considerare le materie, che sono in questo stato,

SPERIMENTALE. 159

fiato come un adunamento di piccioli corpi solidi, durissimi; indipendenti gli uni dagli altri, pesanti separatamente, ed a proporzione delle loro piccole masse. Ma una cosa sopra tutto, che non dee mai trasandare, si è l'estrema picciollezza di coteste molecole, che non sol le rende impalpabili, ma che le toglie agli occhj più penetrativi ed acuti, quand'anche son armati de' più perfetti microscopj. Da quest' ultima qualità, principalmente dipendono gli effetti più singolari dell'idrostatica, quelli la cui spiegazione stenta a conciliarsi con una dimostrazione rigorosa.

Comprenderemo in tre Sezioni quello, che ci occorre di dire intorno all'Idrostatica. Nella prima esamineremo, in qual modo s'esercita la gravità d'un liquore di parti omogenee, o considerate come tali; nella seconda faremo vedere, come relativamente adoperano fra loro più liquori di densità differenti; e nella terza paragoneremo i corpi solidi co' liquori, immergendoveli.



PRI-

* * * * *

PRIMA SEZIONE.

Della Gravità, e dell'Equilibrio de' Li-
quori, le parti de' quali sono
omogenee.

SECONDO l'idea che fatta ci abbiamo de' liquori, quelli che sono omogenei, composti sono di particelle, le quali sono simili, così nella figura, come nella grandezza e nel peso; una certa quantità d'acqua, per esempio, sarà dunque un adunamento di piccoli corpi mobili, i quali averanno forze eguali per muoversi dall'alto al basso; posti tai principj, si può dare per certe le proposizioni seguenti.

P R I M A P R O P O S I Z I O N E .

I Liquori pesano, non solamente quanto alla loro massa totale, ma ancora in sè stessi, cioè quanto alle parti che li compongono.

La prima parte di questa Proposizione non ha bisogno d'altra prova, che della giornaliera Esperienza; quando accostando un bicchiere pieno di acqua o di vino alla bocca sentiamo ch'egli pesa più, che se sarà vuoto. Che forse avvenir potrebbebb'egli, che una somma di piccioli corpi pesanti non avesse peso?

L'altra

SPERIMENTALE. 161

L'altra parte è una necessaria sequela della prima, e non pare che più di quella abbia questa bisogno d'essere provata. Imperocchè, se la massa totale pesa, donde venir le può mai cotesto peso, se non se dalle parti materiali che la compongono? Nulladimeno i più de' Fisici si fermano a ragionare sopra di ciò, e a formar de' dubbj, perchè alcuni si son trovati; i quali hanno preteso, che i liquidi non pensino *nel loro proprio elemento*. Ma per questa espressione, volevan eglino dire, che le parti d'un liquore non pesano nella massa ch'elleno compongono; che non hanno gravità assoluta? Oppur solamente, ch'elleno sono fra esse in equilibrio? Se quest'ultimo è il senso, ch'essi affiggono alla loro proposizione, egli è lo stesso, che azzuffarsi con un fantasma, mettersi a provare che una certa quantità d'acqua, per esempio, è ancor pesante quando è mescolata con altr'acqua, ovvero ch'ella contribuisce al peso della massa, di cui è parte. Comunque ciò sia, eccone la prova nella seguente Esperienza.

PRIMA ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

La *Figura 1.* rappresenta un' asta di bilancia, che tiene in equilibrio in un vase pieno d'acqua, una piccola caraffa di vetro assai grossa, vuota, e otturata.

EFFETTI.

Sùbito che si distura la caraffa, s'empie d'acqua, e va al fondo del vase.

Tomo II.

L

SPTE-

S P I E G A Z I O N I.

Ognun fa che di due corpi attaccati alle braccia d'una bilancia, quello che trasporta l'altro ha più di peso; se la caraffa riempiendosi d'acqua, trasporta il bacino che la sosteneva in equilibrio, la cagion'è, perchè quest'acqua la rende più pesante di quel ch'ella era, e per prova che l'aumentazione del suo peso, non è altro, che quello dell'acqua ch'ella riceve, basta rimettere l'equilibrio, aggiungendo del peso nel bacino opposto; questo peso aggiunto sarà eguale a quello d'una pari quantità d'acqua pesata fuori della massa, di cui ella è parte; lo che ben fa vedere, a chiunque volesse dubitarne, che una certa quantità di liquore ha sempre la sua gravità assoluta, e quando fa parte d'una maggior massa dello stesso liquore, e quando ella si prende separatamente.

A P P L I C A Z I O N I.

Innumerabili esempj ci mettono tutto di sotto degli occhi, degli effetti simili a quello, che veduto abbiám poc' anzi nel precedente esempio. In quella guisa, che una caraffa diventa più pesante per l'acqua che la riempie, quando vien disturbata, così una secchia che galleggia, od una barca, affondano e si perdono, quando si fa in esse qualche screpolo, per cui ammetton l'acqua. La materia che compone queste sorte di vasi, è d'ordinario più pesante che il fluido, che li sostiene: che s'egli può introdursi, e riempire
le

le loro capacità, il tutto insieme fa una massa, il peso della quale eccede quello d'un egual volume d'acqua; e per questa ragione il vase cade al fondo.

I corpi porosi o spongiosi, che si lasciano per qualche tempo esposti all'aria umida; come i legni, le pietre tenere, la terra stessa; non ricevono forse maggior peso? ed all'incontro, non perdono eglino, all'aria più asciutta, una parte del loro peso, con perdere della loro umidità? Coloro che vendono a peso merci succettibili del secco e dell'umido, come sarebbe il tabaco, l'indigo, il zucchero ec. procurano di tenerle in luoghi freschi, per impedire o per riparare un'evaporazione che lor causerebbe un decadimento reale.

L'uso ha già prevalso di conservare nell'acqua i legni che si destinano alla costruzione de' vascelli. Quando si sono gittati nel ricettacolo d'acqua, veggonsi a prima giunta galleggiare, ma a poco a poco affondano, e restano alcosi sotto la superficie dell'acqua; perchè cotesto liquido col tempo li penetra, o sia ch'egli riempia de' vacui, o che prenda il luogo d'altre materie più leggier che cedono al suo sforzo, ed allora il pezzo composto di legno e d'acqua, pareggia o supera eziandio nel peso il liquido, che lo attornia, imperocchè è un fatto costante, che le parti proprie del legno il più leggiero pesano più che l'acqua. Il soghero stesso non galleggia più, quando essendo stato macerato per lungo tempo; le sue parti si disuniscono; e non compongono più, come all'ordinario, un volume, dove ci è molto più di vuoto che di solido.

L 2

L'ac-

164 LEZIONI DI FISICA

L'acqua che penetra i corpi, aggiugne dunque al loro peso, in qualità di liquore pesante, non solo quando cotesti corpi sono fuori di esso, ma anche allora che vi sono intieramente tuffati: e ciò perchè le parti de' liquidi, come quelle degli altri corpi, sono piccole porzioni di materia, ed ogni materia è pesante.

II. PROPOSIZIONE.

Le parti d'un medesimo liquore esercitano la loro gravità, indipendentemente le une dall'altre.

Questa proprietà a lor proviene dal non avere coerenza sensibile, da poter separarsi quasi senza sforzo, tutt'all'opposto de' corpi solidi, le parti de' quali sono legate, aderenti e difficili a disunire. Se si vuole portar via una pietra, od un pezzo di legno, per qualunque parte ch'egli s'afferri si sostiene tutta la sua massa; e però è cosa naturale che se ne senta anche tutto il peso: ma se si metta l'estremità d'un dito sotto'l fondo d'un vase forato, e pieno di liquore, per fermarne lo spargimento, basta vincere il peso della colonna che corrisponde perpendicolarmente al foro; imperocchè qual uopo ci ha che si portino anche l'altre, se quella cader può, senza trascinarle dietro seco? L'esperienza renderà ciò evidente.

II. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Nel fondo d'un gran vase cilindrico di vetro, rappresentato nella *Figura 2.* si è fatto un buco, e un cerchietto, o fascia rotonda e cilindrica, d'un pollice di diametro, che si ottura con un pezzo di soghero ben ritondato ed unto, affinchè possa cadere ad una mediocre pressione; il canale incominciato dal cerchietto, è continuato nel vase per via d'un tubo di vetro A, dell'istesso diametro, che si può levar via quando è mestieri; e tutto si regge sopra un treppiede, al disotto del quale v'è una conca, o un bacino, per ricever l'acqua che scorre.

EFFETTI.

Dopo d'aver bellamente e adagio versato dell'acqua nel tubo A, osservarsi a quale altezza ella sia, quando il suo peso caccia fuori il turacciolo B; si leva il tubo, si rimette il turacciolo, come era prima, e se si riempie il vaso fin a tanto che il turacciolo esca dal suo luogo, osserverassi che l'acqua è precisamente alla medesima altezza, ch'ella era precedentemente nel tubo.

SPIEGAZIONI.

Non si può negare, che il turacciolo B non sia fuori spinto dal suo luogo, per lo peso dell'acqua. Egli resiste nè più nè meno, quando s'

L 3 em-

166 LEZIONI DI FISICA

empie il gran vaso, che quando si carica d'acqua solo il tubo, purchè ciò sia alla medesima altezza: è dunque evidente, che questo tubo niente altera della pressione del fluido, e che la colonna che pesa sul turacciolo, opera all'istessa maniera, e quando si separa dal resto mediante un involucro solido, e quando ella ha comunicazione colla massa totale. Tuttavolta non dissimuliamo, che lo sfregamento cagiona qualche piccola differenza, perchè la detta resistenza è maggiore quando la colonna d'acqua si muove in un tubo di superficie solida, che quando è contenuta sol da una massa d'acqua, le cui parti sono scorrenti.

Per pigliare un'idea giusta di queste sorte di scorrimenti, e per concepire con agevolezza perchè i fluidi esercitino la loro gravità altramente che i solidi, convien rappresentarsi, come si vede dalla Fig. 3. tutta la massa d'acqua contenuta nel nostro gran vase, divisa in più colonne, 1, 2, 3, 4, 5, ciascuna delle quali è composta d'un egual numero di parti; se il fondo del vaso, che serve di base e di sostegno a tutte queste colonne, viene ad aprirsi in *a*, la parte inferiore della colonna 3 non essendo più sostenuta, dee cadere per l'apertura, e dopo essa tutte le altre, che sono sopra poste. Questa colonna intiera scorrerà dunque dall'alto al basso tra la seconda e la quarta, che sono sostenute ne' punti *b*, *c*, e tutte le cui parti mobili, sopra il loro proprio centro, diventano tanti rotoletti che facilitano la sua discesa. Se la seconda e la prima colonna da una parte, la quarta e la quinta dall'altra, fossero composte di parti legate e coerenti, suffi-

sussisterebbono in tutta la loro lunghezza, e con la caduta della terza, farebbesi un vacuo tra esse. Ma però che queste particelle sono estremamente piccole, estremamente mobili, l'una sopra l'altre, dacchè la sommità della terza colonna vien a calar giù, e cessano quelle d'essere sostenute in quel sito, scrollano a proporzione dello scorrimento; ed in questa guisa la superficie della massa totale s'abbassa tutta insieme, benchè una sola delle colonne dia materia allo scorrimento con la sua caduta.

Quando le parti hanno una coesione sensibile, come quelle de' liquori grassi o vischiosi, o quando la massa del fluido che scorre ha molta larghezza, rispetto alla sua altezza, benissimo si scorge il vacuo che lascia sopra di sè la colonna che giù scorre la superficie, in vece d'esser piana, come al consueto, è più cava nel mezzo, perchè le parti vicine non arrivano con bastevole celerità, per occupare il luogo di quelle, che una gravità diretta giù protrude.

A P P L I C A Z I O N I .

Vedesi dalla spiegazione che abbiamo data, quanto la fluidità de' corpi rechi di cambiamento negli effetti della lor gravità. Se si tirasse con un filo, o si spignesse da su in giù il turacciolo B, Fig. 2. non si averebbe da sollevare se non il peto della colonna, di cui egli è la base perchè questa porzione d'acqua essendo indipendente dal resto, può muoversi liberamente nella massa. Ma se questa massa venisse a convertirsi in ghiaccio; per la sola ragione di non essere più liquida, e d'essere la sue parti legate e coe-

renti; la mano che sosterrrebbe la colonna, che corrisponde al turacciolo, nel momento della congelazione, avrebbe da portare tutto quello che è contenuto nel vase.

La brina, la neve, e tutte le congelazioni acquose, che s'attaccano agli alberi ed alle piante, li scrollano, e li premono molto più, che l'acqua che li bisogna, perchè i rami han da portare non solamente le parti umide, onde sono attornati e le quali sono alla loro corteccia attaccate; ma quelle ancora, che il gelo attacca a queste, e che per il loro proprio peso cadrebbero lateralmente, se fossero fluide.

Quelli che hanno avuta occasione di visitare le caverne, e le grotte naturali, che s'incontrano in differenti paesi, hanno potuto spesso fiate osservare certe concrezioni pietrose che si formano a goccia a goccia, e che pendono dalle volte, appresso a poco come i pezzi di ghiaccio, che un digelamento imperfetto fa nascere nell'orlo de' tetti, e di tutti i luoghi, ove si è fatta qual che un po' lenta liquefazione della neve o del ghiaccio. Coteste sorte di pietre che si chiamano *stalattiti*, sono originariamente liquide, come l'acqua che ne trasporta le parti; la prima goccia, che resta sospesa alla volta, ha sol l'aderenza di cui le fa mestieri, per sostenere il suo proprio peso; ma a misura, che la sua umidità svapora, ella diventa solida e capace di portarne dell'altre, alle quali la stessa cosa succede, di maniera che una massa considerabile resta sospesa, ad onta del suo peso, per la sola ragione ch'ella è solida, e che una parte s'attiene alla volta.

Que.

S P E R I M E N T A L E. 169

Questa operazione della Natura è assai da pref-
so imitata dagli artefici, che fabbricano le can-
dele; le miccie, o cordicelle sono inflatè paral-
lelamente sopra alcune bacchette; e s'immergo-
no replicatamente in certi cassettini che contengono il sevo liquefatto: oppur si fa dall'alto scor-
rere la cera calda calda lungo la miccia; quest'
ultimo metodo particolarmente si pratica per li
ceri, che devono essere più grossi abbasso; im-
perocchè ben si capisce che la materia raffreddandosi scorre men presto verso il fine della sua
caduta; e si fa diligenza parimenti di non met-
terla in opera troppo calda, affinchè ne resti da-
vantaggio a cadauna immersione, o per cadauna
volta ch'ella si versa.

Non lasciamo quest'articolo senza osservare un
fatto, che trova ancora la sua spiegazione nella
nostra seconda proposizione. I liquori non toc-
cano, alla maniera de' solidi; il loro urto, o la
loro percossa, date eguali quantità di materia,
non si fa sentire all'istesso modo; per dirla in
breve, temesi la caduta d'un pezzo di ghiaccio
del peso d'una lira, e non si teme punto d'es-
sere percosso da una pari quantità d'acqua.

Indipendentemente dalla divisione che accade
a' liquori, nel cader per mezzi resistenti, e dal
considerabile ritardo cagionato nella velocità del-
la lor caduta dall'aumento della lor superficie per
tal divisione; indipendentemente, disse, da que-
sta ragione, i corpi in questo stato s'applicano
ad una più grande superficie, e dividono il loro
sforzo totale in una infinità di piccole impressio-
ni poco sensibili. Supponiamo, per esempio,
che presentisi là man piatta alla caduta d'una
lira

170 LEZIONI DI FISICA

lira d'acqua, che abbia una figura sferica, concepir si può questa palla fluida come un adunamento di piccole colonne, parallele fra esse, ed alla direzione della loro caduta comune, la più lunga di tutte, a cagione della sfericità della massa, porterà il suo sforzo solo al mezzo della mano, e le altre per la stessa ragione, giungeranno un po più tardi e percuoteranno le parti vicine, ciascuna in ragione della sua massa particolare, così tutto il colpo sarà ripartito a tutta la larghezza della mano che lo riceve. Ma se questa palla sarà di ghiaccio, la cosa andrà diversamente; la mano non sarà percossa fuorchè in un picciolissimo spazio, che riceverà lo sforzo non solamente della colonna che gli corrisponde, ma ancor di tutte l'altre, che a questa sono unite, e che esercitano in comun con essa la lor gravità. Quindi viene, che un corpo angoloso, o acuto, fa più male cadendo, che un altro il quale sia piatto, perchè il suo sforzo è unito e raccolto sopra un più picciolo sito; e per la ragion del contrario, meno si rischia venendo colpito quando si tiene la mano cava, per ricevere una palla; che quando la mano medesima si distende.

III. PROPOSIZIONE.

I liquori esercitano la loro gravità per ogni verso.

Vale a dire, che non solamente pesano dall'insù all'ingìù, come tutti gli altri corpi, ma premono eziandio lateralmente tutti gli ostacoli onde son ritenuti; e tendono ad elevarsi da
giù

giù in sù, quando comunicano con quantitadi più alte, e perciò più pesanti di essi.

Facilmente si capisce, come i liquori pesino dall'insù all'ingiù, poichè sono composti di parti che partecipano della gravità, che è comune a tutt' i corpi, ma non è del pari facile, comprendere la loro pressione laterale. Tuttavolta se si pon mente, che le loro molecole sono nel vase che le contiene, come un adunamento di globuletti, si può ben immaginare, ch'elleno non sono tutte schierate regolarmente le une sopra le altre, come nella *Figura 3.* ma che per lo più una colonna esercita la sua pressione tra altre due, e tende a discostarle, come veder si può nella *Figura 4.* ove la pressione perpendicolare, che si fa di rincontro al punto *d*, è trasportata dalle colonne laterali verso i lati *e, f*, del vase. Alla stessa maniera, quando la colonna *d*, fopera contro le due parti *g, h*, la prima fa una resistenza sufficiente a causa delle pareti del vase che la reggono; ma la parte *h* soffre uno sforzo che la solleva da giù in sù, e che averà il suo effetto, quando una colonna eguale ad *i k*, o non sò che d'equivalente non pesi di sopra per contenerla

Questa pressione che si comunica così alla parte *h*, e che tende a sollevarla, ha dato motivo di dire, che, *i liquori pesano di giù in sù*; ma s'abuseremmo di questa espressione, e piglieremmo un'idea falsissima della gravità de' liquidi, se pretendessimo in fatti, ch'eglino hanno in sè stessi una tendenza a sollevarsi; una colonna di liquore è portata da giù in sù per la pressione d' un'altra, che fassi dall'insù all'ingiù con del
van-

vantaggio, come una lira di piombo nel braccio d'una bilancia, fin a tanto che tutte e due sieno egualmente elevate al di sopra dell'Orizzonte. Veniamo adesso alla prova della nostra proposizione.

III. ESPERIENZA. PREPARAZIONE.

In un gran vase pienod'acqua colorata, *Fig. 5.* s'immergono successivamente tre tubi di 6. in 7 linee di diametro, aperti dai due estremi, ma la sommità de' quali tienfi otturata col dito pollice nel tempo dell'immersione,

E F F E T T I.

Quando ciascuno di questi tubi è immerso, e si distura nella cima, levando via il dito, l'acqua si solleva dentro alla medesima altezza, in cui ell'è nel vaso grande, qualunque figura che abbia il tubo.

SPIEGAZIONI.

Il tubo che s'immerge perpendicolarmente nel vase, contiene una colonna d'aria che riempie la sua capacità, e che uscir non nè può finchè si tiene otturato nella cima; imperocchè essendo questo fluido più leggiero che l'acqua, non può più uscire per abbasso, dacchè l'estremità del tubo è immersa. Ma subito che è levato il dito dall'orificio superiore, e che l'aria cessando di
reg-

reggerfi appoggiata a questa parte non fa più un ostacolo invincibile all' acqua, l' acqua vi è portata dal peso di quella che resta nel gran vase, nella maniera che segue.

Quando il tubo C è immerso, l' acqua per la sua gravità naturale cade da D in E, e scorre da E in F, perchè ella è composta di parti mobili e rotolanti, e cotesta parte del tubo forma un piano inclinato. L' effetto quì si fermerebbe, se vi fosse in F un ostacolo invincibile, o se ciò che è contenuto nella sinuosità EF, non vi si potesse muovere facilmente. Ma è un fluido premuto dalla colonna G D, che corrisponde perpendicolarmente all' orificio del tubo, e che è continuata sino in E; l' acqua dunque s' innalza nel ramo C F, non perchè abbia una tendenza reale dall' ingiù, all' insù, ma perchè ubbidisce al peso d' una colonna G E, che pesa dall' insù all' ingiù; ed ella continua a sollevarsi sino in e, vale a dire a quell' altezza, dove trovasi in equilibrio con G E che la spinge.

In qualunque luogo del vase che s' immerga il tubo H, il suo orifizio inferiore sempre, da qualunque lato che si presenti, riceve un volume d' acqua premuto lateralmente dalla colonna perpendicolare, alla quale corrisponde . . e che porterebbe il suo sforzo contra la parete del vase, come vedesi in e, ed in f, *Fig. 4.* così l' acqua essendo spinta nell' orifizio I con una pressione eguale al peso della colonna I K, sollevasi alla medesima altezza nel tubo, e nella stessa maniera che nel precedente.

Finalmente se il tubo non è ritorto, e si presenta come L M, nel momento ch' egli è distura-

174 LEZIONI DI FISICA

to nella sommità, l'acqua che presentasi al suo orifizio M; è nel caso del globo *b* Fig. 4. appoggiata su la colonna perpendicolare M K, dalle colonne laterali *l o, l o*, che hanno il loro punto d'appoggio contro le pareti del vaso, e premuta dal peso delle colonne vicine *n o, n o*; ell'è dunque sforzata di sfuggire per lo tubo, dove trova meno di resistenza, fin a tanto che il proprio suo peso, crescendo colla sua altezza; sia finalmente eguale a quello che la sforza.

IV. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.


P Q, *Figura 2.* sono due anelli o cerchietti della stessa larghezza, che quello ch'è in B, ed atti a ricevere lo stesso turacciolo; ma quando egli è posto in uno de' tre anelli, bisogna che gli altri due sieno fortemente serrati.

EFFETTI.

A qualunque de' cerchietti od anelli, che posto sia il turacciolo mobile, egli sempre code allo sforzo dell'acqua che si versa nel vase, allorchè è giunta ad una medesima altezza.

SPIEGAZIONI.

Questa Esperienza prova la stessa cosa, e si spiega nella stessa maniera che la precedente; lo sforzo che l'acqua fa perpendicolarmente, pesando sul fondo del vase, come far potrebbe ogni
a'tro



S P E R I M E N T A L E. 175

altro corpo si distribuisce contra le pareti medesime, per tutti i versi, a cagione della mobilità, della figura e della picciolezza delle parti; ma però che questo sforzo viene dalla gravità, e la direzione naturale di questa potenza è perpendicolare al fondo del vase, il turracciolo non cede se non quando il liquore ha una certa altezza, e la medesima quantità d'acqua non basterebbe, se il vase, sendo più largo tenesse la superficie del fluido meno elevata.

A P P L I C A Z I O N I.

S'incontrano ad ogni momento prove della pressione laterale de' fluidi; una pentola, una bottiglia inclinata, una botte che si distura, o s'inchina per vuotarla, non si vuoterebbono mai, se il liquore non premesse questi vasi se non dall'alto al basso, nella maniera de' corpi solidi: un naviglio trapassato da una cannonata fa danno per fianco, e rischia di perdersi se non vi si mette rimedio, come se il male fosse nel fondo della caverna; e l'acqua vi entra con tanto più di prestezza, quanto il mare ha maggior altezza sopra del buco.

Quando si fabbricano argini, o dighe, de' ricetti d'acque, ed altre opere idrauliche, si ha gran cura di proporzionarle agli sforzi dell'acqua. Si son vedute talvolta delle provincie sommerse, e parecchi altri accidenti funesti, perchè non si avevano opposte resistenze bastevoli alla pressione laterale dell'acqua.

Tali precauzioni voglionsi avere eziandio ne' lavori, ne' quali le materie sono alcunchè fluide,
sì

sì per la picciolezza delle loro parti, sì per il loro poco collegamento; se per esempio, si alza una diga con della terra, o con della ghiaja, ella vedesi scrollare ben presto, se a' suoi lati non si dà un pendio sufficiente, che chiamasi *scarpa*; ed i muri che circondano levate di terra, non resistono all'urtamento, se non hanno una solidità proporzionata all'altezza ed alla natura delle terre.

Scavare un pozzo, è formar nella terra un canale perpendicolare all'Orizzonte. Un simil canale è nel caso del tubo L M; se in vicinanza vi saran dell'acque, la superficie delle quali sia più elevata che il fondo del pozzo, elleno debbono riempirlo fin a tanto che ne contenga quanto basti per far con esse equilibrio. Accade bene spesso, che si scava assai profondamente, avanti che trovar una terra atta nata a lasciar passar l'acqua; è la stessa cosa, come se si affondasse molto il tubo, senza levare il dito ch' l'ottura nella sommità: se allor si distura, le colonne laterali essendo molto lunghe e molto pesanti, spingon l'acqua nel tubo con precipizio; similmente è spesso avvenuto, che alcuni lavoratori sono stati all'improvviso colti da una strana copia d'acque nel fondo d'un pozzo nuovo, perchè la natura del terreno avea fatto che cercassero troppo addentro un passaggio alla sorgente, e questo passaggio tutt' in un tratto s'era trovato aperto e libero di troppo.

Dal poter un liquore essere sollevato di giù in su per lo peso delle colonne vicine, ne siegue, che si può in differentemente, riempire un vaso pel fondo, s'è perforato, immergendolo perpendi-

colar-

SPERIMENTALE. 177

colarmente; ovver per la sua bocca, inclinandolo; e poter sciegliere l' una o l' altra maniera è d' un vantaggio notabile in parecchie occasioni: io ne riferirò sol una.

Per attigner l' acqua de' pozzi, assai profondi, talor ci serviamo di due secchie attaccate ai due capi d' una medesima corda, che abbraccia un tamburro il qual si fa girare, in maniera che l' una discende, mentre l' altra vien sù; questa, a mio credere, è la miglior macchina nota, che si possa adoperare in caso simigliante, cioè quando una grande profondità rende malagevolissima l' applicazione delle trombe; ma però che queste secchie sono d' ordinario molto grandi, & è mistieri sovente farle piuttosto lunghe che larghe per accomodarli al diametro del pozzo, e a tal effetto son esse corredate d' una o più animelle, che lascian entrar l' acqua, e che non le permettono di ricadere.

IV. PROPOSIZIONE.

: Tutte le parti d' un medesimo liquore sono in equilibrio tra esse, così in un vaso solo, come in molti che insieme comunicano.

Per torre ogni equivoco, intendo quì per la parola di *parti*, volumi eguali, e simili in tutto; imperocchè mutandosi le molecole secondo il grado di liquidità, avvenir potrebbero de' casi, ne' quali la densità non fosse uniforme in tutta la massa; e allora dovrebbe considerarsi il liquore, come più liquori mescolati insieme.

Tomo II.

M

Sup-

178 LEZIONI DI FISICA

Supponendo dunque tutte le parti perfettamente simili, come si ha ben ragion di credere che sieno, ne' più de' liquori, dico che fra esse vi ha equilibrio, ovver, che si muovono finchè sieno pervenute a questo stato, perchè hanno forze eguali; imperocchè la forza d'un corpo che tende a cadere, non è altro, che questa stessa tendenza, e la sua quantità di materia. Ora la tendenza a cadere, è eguale in tutti i corpi, come provato abbiamo nella passata Lezione; ed in tutte le parti d'un liquore omogeneo, la massa secondo la nostra supposizione è la stessa; quindi gli strati superiori non possono smovere quelli di sotto, perchè questi fanno tanta forza per rimaner dove sono, quanta farne possono i primi per smuoverli.

Chi dice equilibrio, dice quiete; tuttavolta io non pretendo escluder quì altro moto, se non se quello che provenisse dal peso più grande da una parte che da un'altra. Molti Fisici vogliono che le parti de' liquidi si muovono di continuo; se per questo moto intendono quello che il calore mantiene in tutti i corpi, non si può contrastarglielo; e noi farem vedere altrove che questo moto è compatibile con l'equilibrio, di cui qui favelliamo: ma se vuolsi che cotal moto sia una qualità affetta a' liquori in quanto liquori, confesso di non conoscere alcun fenomeno, che m'obblighi a ricevere questa supposizione; e penso che non si debba senza buone ragioni supporre un moto attuale, dove bastar può una mobilità di parti certissima. Passiamo alle prove della nostra Proposizione.

V. E S P E R I E N Z A .

P R E P A R A Z I O N E .

In un sifone rivoltato, qual rappresentasi dalla Fig. 6. si versi dell'acqua colorata, del vino, o del mercurio, ec. e pongasi il piede della tavoletta su cui regge il sifone, sopra d'un piano affatto orizzontale.

E F F E T T I .

Il liquore s'innalza egualmente nei due rami nel medesimo tempo.

S P I E G A Z I O N I .

Essendo la parte inferiore del sifone piena, se sollevasi nell'un de' due rami una colonna di liquore, come A B, il di lei peso adopera sopra la parte B C ch'è mobile; la sollecita a montare nell'altro ramo, e questo sforzo è vinto dal peso d'una colonna simile C D; laonde, poichè C D, & A B che sono della stessa lunghezza, si sostengono scambievolmente, si può conchiudere che le parti simili d'un medesimo liquore, sono in equilibrio.

VI. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Il canale E F , *Fig. 7.* per mezzod' una chiavetta , apre comunicazione tra il vaso grande G H , ed il tubo ascendente E I . Questo tubo è accomodato in E di maniera che lo si può levare , e rimettere in luogo suo un altro tubo K che monta obbliquamente , ovvero L , che ha molte sinuosità , e s'empie il vaso grande fino in G H , con un liquor colorato .

EFFETTI.

Voltata che si è la chiavetta per apprire la comunicazione tra il vaso grande G H , ed il tubo ascendente E I , il liquore monta fino in I ; e questo effetto è sempre l' istesso , o che il tubo sia dritto e perpendicolare , o sia obbliquo , o tortuoso .

SPIEGAZIONI.

Quando si paragonano de' liquori relativamente al loro peso in vasi che comunicano , non si dee già fare la comparazione tra le quantitadi contenute in un vaso , e quelle contenute nell' altro , ma bensì deonfi comparar le colonne che si toccano per le loro basi nel foro di comunicazione . Nella nostra Sperienza , e. g. il foro della chiavetta è quello che misura la base di queste colonne ; essendo però questo foro comune ad ambedue ,

due, per molta che sia la quantità di liquori contenuta nel vaso grande, non vi è mai se non un filetto capace di passare per cotesto foro, che ivi eserciti la sua pressione: il resto portasi e regge sul fondo, e su le pareti del vase medesimo; non è dunque maraviglia che una picciola colonna d'acqua contrappesi o pareggi una cotal pressione nel tubo, e non vi s'innalzi più di quel che alta sia la superficie GH, *Figura 7.*

Se il tubo ascendente è inclinato in una maniera, come K, o in molte come L, sarà d'uopo di una maggior quantità di liquore per far equilibrio alla pressione che viene dal vaso grande, perchè tutti i corpi che pesano per piani inclinati, perdono una parte del loro peso, ed il sottil filo di liquore che pesa in E, è capace di portare un simile all'altezza EI, qualunque strada ch'ei tenga.

A P P L I C A Z I O N I .

Quando l'acqua d'un fiume, d'uno stagno, d'un lago, ec. penetra col suo proprio peso nella terra, se i canali, ch'ella vi trova, o che ella si fa col tempo, prendono una forma simile alla *Figura 6.* qualunque distanza che vi sia tra A D, qualunque disposizione ch'abbia il terreno tra B C, l'acqua rimonta così alto, come il luogo, dal quale è discesa. Non si dee dunque riputare per un fenomeno inesplicabile, una sorgente la qual fa nascere, o mantiene un pezzo d'acqua considerabile sopra una montagna elevatissima, ovvio n'è il perchè: cotest'acqua vien da qualche ancor più alto luogo; ed eziandio da qualche an-

cor più alto luogo; se alta distanza di 30, o 40 leghe; luoghi tali non fosser noti, non è per questo da rigettarsi l'addotta ragione.

Se vuolsi condurre l'acqua per forza del suo proprio peso, non occorre, siccome è chiaro, lusingarsi di venire a capo, se il luogo dov'ella è, trovasi più basso di quello, a cui si destina ch'ella vada; e neppur basterebbe, che i due luoghi fossero in livello, perchè è d'uopo d'un po' di pendio per vincere la resistenza degli sfregamenti. Perciò in tutti gli acquedotti, ne' tubi differenti, ne' canali, ove si vuol che siavi scolo, si vuol dare ordinariamente mezza linea d'inclinazione ogni pertica.

Non si dee tampoco disperare di condur l'acqua dove si vuole, quantunque debbasi farla passare per luoghi molto più bassi, di quello a cui si destina ch'ella vada; purchè questo luogo non sia tanto elevato, quant'è la sorgente, dond'ella si spicca. L'acqua che si distribuisce ne' giardini, nelle case di Parigi, e che si fa ascendere finora agli appartamenti per l'uso delle guardarobe, viene per via di cannoni sepolti sotto il pavimento delle strade; ma quest'acqua che portano, arriva da qualche edificio pubblico, dalle raccolte d'acqua del Ponte di Nostra Signora, della Samaritana ec. i quai luoghi sono più alti di quelli, ai quali vien derivata, o per sè stessi, o per la disposizione del terreno.

Ognun sa, che la superficie de' liquori è un piano orizzontale, qualunque sia la forma che possa avere il vase ch'eli contiene. Quest'è una necessaria conseguenza dell'equilibrio delle loro parti imperocchè, se le colonne GM, OP, HN, *Figura 7.*

figura 7., esercitano l'una contro d'altra pressioni eguali all'altezza MN , ove incontrano le pareti del vase, essendo d'una medesima materia; conviene che abbiamo, di là prendendo il filo, volumi eguali, e per conseguenza che le loro estremità superiori si trovino nella medesima linea GH .

Ma questo piano che rappresenta la superficie de' liquori, è tale solamente in riguardo a' nostri sensi. Imperocchè, quando la superficie dell'acqua sia molta estesa, per lo stesso principio egli provasi, ch'ella è convessa, e l'Esperienza s'accorda perfettamente con la teoria.

Qualunque persona che sia stata in qualche Porto, o che abbia viaggiato sul mare, avrà dovuto osservare, che si scorgono gli alberi d'un vascello che approda, innanzi che si possa vedere il corpo del bastimento; siccome anco, approssimandosi noi ad una Città, scuopriamo i campanili ed i tetti, prima di vedere il basso recinto delle case. La ragion'è, perchè noi non possiam vedere, se non in linea retta, e la convessità del mare interrompe il raggio visuale, che vien dal corpo del vascello all'occhio dello Spettatore, ad una distanza, in cui il raggio che viene dall'albero, è libero, come appare dalla *Fig. 8.*

Ed infatti, se le colonne d'acqua che compongono il mare, in virtù della loro gravitate eguale, debbono avere le loro estremità superiori a, b, c , egualmente distanti dal centro della terra d , che è il centro comune di tutti i corpi gravi, non possono elleno schierarsi in un piano rappresentato dalla linea ef ; bisogna necessariamente, che compongano una superficie con-

184 LEZIONI DI FISICA
vessa, che abbia il suo centro in detta *Figura 9.*

Finalmente da quest'equilibrio delle Parti d'un medesimo liquore, segue che di molti ricettacoli d'acque, i quali comunicano assieme, basta vederne uno, per giudicare a quale altezza sia il liquore degli altri. Imperocchè, quando mi venisse celato uno de' due rami del sifone della *Figura 6.*, o il vase grande della *Fig. 7.* in conseguenza del posto principio, il liquore elevato in A; ovvero in I rispettivamente, m'insegnerebbe infallibilmente, che egli si sta ad un'altezza simile dall'altra parte. Saprà dunque quanto resti di vino in una botte, sol che io possa unire al foro di comunicazione un tubo ascendente, come EI, *Figura 7.*

Non solamente si può in questa maniera conoscere, a quale altezza sia un liquore ne' vasi opachi, o inaccessibili, ma si può della stessa valersi eziandio per empirli. Imperocchè, se si verserà del liquore nel tubo I, non vi si potrà sostenere, se non per lo contrappeso d'una colonna simil nel vase grande GH. Ma questa colonna non può ivi elevarsi e sostenersi bella e sola; secondo ch'ella, comincerà, andrà scrollando per il suo proprio peso, e per la fluidità delle sue parti, e non giungerà all'altezza O, se non in quanto empierassi il vase per sostenerla lateralmente.

V. PROPOSIZIONE.

I liquori esercitano la loro pressione tanto perpendicolare, quanto laterale, non in ragione della loro quantità, ma in ragione della loro altezza
at


Fig. 8.




Fig. 7.



Fig. 6.





S P E R I M E N T A L E 185
al di sopra del piano orizzontale, e della larghezza della base che s'oppona alla loro discesa.

Cioè, che conservandosi l'altezza istessa, ed il fondo istesso del vase, si potrà indifferentemente mutarne la forma e la capacità; di maniera che una certa quantità d'acqua, per esempio, potrà fare uno sforzo 200; ovver 300 volte più o men grande secondo la maniera, ond'ella sarà impiegata: proposizion paradossa, ma certissima ed importante, perchè influisce quasi sopra tutte le macchine idrauliche.

VII. ESPERIENZA.

P R E P A R A Z I O N E.

Sopra i due piccoli lati della cunetta AB, *Figura 10.*, s'alzano due stanti AC, BD, scavati per di dentro quinci e quindi in forma di canale, per ricevere i due piedi del pezzo EF, che per tal mezzo s'alza e si sbassa e si ferma dove si vuole colle due viti C, D. In E ed F sono due pilastrini aperti nella sommità in forchette, per ricevere due lieve GH, terminate da una parte e dall'altra, con due porzioni di carrucole o girelle, le cui gole hanno per centro quello del moto nella forchetta.

Nel fondo della cunetta è attaccato un treppiede di ferro che porta un cilindro cavo di metallo IK, nel quale sdrucchiola uno stantuffo levigatissimo, sicchè soggiaccia a pochi sfregamenti. Questi due pezzi insieme sono rappresentati dalla *Figura 11.*

186 LEZIONI DI FISICA

Il cilindro riceve a vite più vasi di vetro, rappresentati colle *Figure* 10. 12. e 13. guerniti nella parte da basso d' una staffetta di rame, e nella sommità d' una spezie di larga doccia. L' altezza di tutti questi vasi è eguale, ma le loro figure e capacità, come si vede, sono differenti.

Quando uno di questi vasi è adattato al cilindro, come appare nella *Figura* 10. due pesi L, M, che fanno impressione su le lieve, tendono a sollevare perpendicolarmente lo stantuffo, col mezzo d' una vergha di metallo N, e d' una doppia cordicella attaccata in G ed in H, che traversa un foro apposta fatto nel pezzo EF.

La *Fig.* 13. rappresenta una spezie di lanterna cubica di metallo, corredata di cristalli, alla quale s'aggiunta il cilindro della *Fig.* 11., e qualcuno de' vasi de' quali abbiám parlato; nel fondo della lanterna è fissata una carrucola O, che rimanda un capo di catena dello stantuffo al gambo N, di maniera che collocandosi questo pezzo sul treppiede nella cunetta, facendosi giocar le lieve, muovesi lo stantuffo con una direzione orizzontale.

La cunetta AB è foderata di piombo; i pezzi che s' inseriscono in ferro, sono verniciati; quelli che si uniscono a vite hanno degli anelli di pelle non concia infrapposti; lo stantuffo debb' essere più libero che si può; ed i pesi L, M, sono due piccole secchie, o due piatteli di bilance, che si possono caricar più o meno; e s' è fatta in K una spezie di chiavetta, che serve, aprendosi, allo scolo dell' acqua.

EF -

Fig. 13.



Fig. 10.




Fig. 14.





E F F E T T I.

Se si riempirà d'acqua il vase cilindrico, quando è posto regolarmente su la macchina, come appare dalla *Figura* 10., e sieno i pesi L, M, tali che appena si portino via lo stantuffo; il medesimo effetto sussiste, quantunque si sostituiscano a questo vaso quelli delle *Figura* 12. e 13., le capacità de' quali sono differentissime,

I pesi medesimi sono ancora necessarj e sufficienti, se si pongano sul treppiede i pezzi, che sono rappresentati dalla *Fig.* 14., e si metta dell'acqua alla medesima altezza, che nelle Esperienze precedenti, computando dal di sotto della picciola carrucola di corrispondenza O.

S P I E G A Z I O N E.

Per muovere lo stantuffo da giù in su, due forte di resistenze s'hanno da vincere; vale a dire, quella del suo sfregamento nel cilindro, e quella del peso dell'acqua. La prima non dee variar per certo, quando si fanno l'Esperienze seguitamente, poichè e lo stantuffo, ed il cilindro sono gli stessi. Se non siam dunque costretti ad accrescere, e non possiam neppure diminuire i pesi, qualor ci serviamo del più grande, o del più piccolo de' tre vasi, purchè l'acqua sia sempre alla medesima altezza; ragione n'è questa, che i liquidi, come definisce la nostra Proposizione, non pesano sul fondo del loro vase in ragione della quantità, ma secondo la larghezza di questo fondo, e la loro altezza perpendicolare.

E poi-

188 LEZIONI DI FISICA

E poichè vi vuole, per tirare orizzontalmente lo stantuffo, tanta, forza, quanta per sollevare la medesima quantità d'acqua in una direzione verticale, questa è una prova, che la pressione laterale de' liquori equivale a quella, che si fa perpendicolarmente alla medesima altezza.

Questi fatti, tuttochè pajano sorprendenti, sono incontrastabilmente provati dall' Esperienze, che qui abbiain riferite; ma, non sono spiegati. Se giova il saperli, niente meno curioso è il conoscerne la cagione; e per studiarci di scoprirla, ci porremo qui ad esaminare, come la cosa segua in ciascuno de' vasi; cominciando dal più semplice.

La massa cilindrica d'acqua ch'è nel vase IKN, può essere considerata in due modi, e come un fascio di piccole colonne contenute sotto un involucri comune, o come sezioni orbiculiari ammonticchiate l'une sopra l'altre; vedi la *Figura 15*, in qualunque modo ch'ella si consideri, è evidente, che la base *ab* è caricata della somma totale, o delle colonne, o delle sezioni, o strati; e che se soltanto conoscesi il peso d'una di esse, si saprà il peso di tutta la massa, perchè la larghezza della base dà il numero delle colonne, ovvero l'altezza dell'acqua al di sopra della base determina quella degli strati, o delle sezioni. Donde segue, che in un vase cilindrico, posto perpendicolarmente all'Orizzonte, i liquori, avuto rispetto alla base, pesano nella stessa maniera che i solidi.

Nel vase rappresentato dalla *Figura 13*., la cui sezione, secondo l'asse, appare nella *Figura 16*., è facile nè più nè meno vedere, che la base *cd* porta solo le colonne, che riposano perpendicolarmente

SPERIMENTALE. 189

mente sopra di essa, essendol'altre sostenute dalle pareti, come per piani inchinati. Se cd è eguale ad ab della *Figura 15.* è dunque visibile, che queste due basi sono egualmente caricate. La fluidità fa quì il suo effetto; imperocchè appunto perchè la parte $cefd$ può muoversi, ed esercitare la sua gravità indipendentemente dal resto della massa, ella carica del suo peso la base. Se questa massa totale fosse composta di fette orbicolari, ma solide, come gh , ik ec. chi non vede ch'ella verrebbe tutta sostenuta sopra i lati del vase, e che il fondo cd non porterebbe se non l'ultima fetta infinitamente sottile.

Finalmente, come avvien'egli che la base del vaso rappresentato dalla *Figura 12.* sia tanto caricata, quanto quella degli altri due? Non essendovi se non la picciola colonna nn *Figura 17.*, che abbia tutta la sua altezza, le parti vicine oo debbon' elleno forse essere egualmente compresse?

Che coteste parti del vase sieno premute, facilmente s'intende, poichè portano una parte del fluido ch'è pesante, e noi abbiamo spiegato con la *Figura 4.*, come non solo queste, ma ancora tutte le altre pp , qq , *Figura 17.*, partecipano di questa pressione: ma ch'elleno sieno tanto premutate, quanto la parte n stentasi a concepire. Vedesi bene in fatto, che la colonna nn dee comunicar la sua pressione in o ed in q , per mezzo de' globuli ch'ella tende a distornare; ma essendochè la forza con la quale adopera su queste due parti, ha una direzione obliqua sopra l'una e sopra l'altra e non essendo una forza che obliquamente si esercita, eguale alla diretta, sembra che la pressione in p ed in q , non possa mai pareggiar quella che si fa in n .

Con-

190 LEZIONI DI FISICA

Convien pure asserire, che questa egualità non è dimostrata rigorosamente; ma l'Esperienza non ci lascia apparir divario alcuno, e si capirà che quello che ci può essere, è infinitamente piccolo, se si porrà mente a queste due cose: 1. Che le molecole de' corpi liquidi sono piccolissime. 2. Ch' elle non si toccano mai così da presso, come quando le cagioni della liquidità vengono a cessare con questi due principj, io credo che si potrà rendere ragione del fatto che si discute. Imperocchè, essendo queste parti de' liquidi infinitamente piccole, quand' anche non fossero, se non infinitamente poco disgiunte le une dalle altre, l'azione d' una di queste particole spinta fra due altre, diventa infinitamente poco obliqua, cioè quasi diretta; vedi la *Figura 18*. Rendesì probabile questa idea, se si bada, che la pressione laterale, che non differisce sensibilmente dalla pressione perpendicolare ne' liquori, è notabilmente meno grande ne' fluidi grossieri, come la rena, i grani minuti, il piombo in minutissimi ballini ec., ed ella va diminuendo e cessa interamente nelle materie che passano dallo stato di liquore a quello di corpi solidi: Lo che non succede sicuramente, se non perchè le parti si ravvicinano, si aggomitolano in molecole più grosse, ed in vece di continuar ad operare le une su le altre, come il globulo i sopra i due ch' egli tocca, esercitano un' azione più obliqua, come il globulo 2.

APPLICAZIONI.

L'Esperienze che abbiamo fin ora spiegate, ci conducono naturalmente a dire qualche cosa del

SPERIMENTALE. 191

le trombe; le quali di tutte le macchine idrauliche son quelle che hanno più frequente uso, e più generale utilità. Giova conoscerne almeno le parti principali, i fondamenti o regole per fissarne le loro dimensioni; e intendere come la forza che s'impiega, applicasi col loro mezzo a vincere la resistenza del fluido che sale; affinchè non ci lasciamo illudere dall'immaginazione, o dalle false promesse di certa gente il cui naturale ingegno non è abbastanza illuminato dal chiaro-
re della teoria.



Le parti principali delle trombe, sono per ordinario cilindri cavi AB, o CD, *Figura 19.*, fatti per lo più di metallo; gli stantuffi EF, che riempiono una porzione del cilindro, e che vi si fan muovere alternativamente da un capo all'altro, col mezzo d'un gambo G od H, all'estremità del quale s'applica il motore immediatamente, oppure col'ajuto d'una lieva I, o di qualch'altra macchina; inoltre rubi ascendenti, come K, L, per condur l'acqua alla bramata altezza; e finalmente valvule, lenguelle, animelle, che lascian passar l'acqua per un verso, e che ostano acciocchè non ritorni per un altro, siccome veder si può a cadaun fondo de' due cilindri B, o D.


Distinguer si può generalmente due sorte di trombe, composte delle parti testè da noi nominate; vale a dire, quelle che chiamansi *aspiranti*, e quelle che hanno il nome di *pressorie*; niente direm noi qui delle prime, perchè a ben intenderle bisogna conoscere alcune proprietà dell'aria; di cui non abbiamo per anche ragionato; restano a spiegarli l'ultime, cioè quelle, ove lo stan-

stantuffo spigne immediatamente l'acqua da sù in giù, o per contrario.

Nel cilindro A B, esempigrazia, quando si solleva lo stantuffo da B verso A, lascia un vuoto fra sè, ed il fondo della tromba, e l'acqua della conca ov'è immersa la tromba medesima, sale per la pressione delle colonne vicine, come ne' tubi della *Figura 5.*, e per un'altra causa, che presto additeremo; quando poscia viensi ad abbassare lo stantuffo, l'acqua ritenuta da un'animella ch'è nel fondo del cilindro, passa a traverso del corpo stesso dello stantuffo; ove si è apposta fatto un canale, ed un'altra animella volta in su, per impedir che l'acqua non ricada perciò quando sollevasi per la seconda volta lo stantuffo, la parte di sotto si riempie di nuovo, e l'acqua ch'era passata al di sopra, viene portata più alto; continuando così, giungesi ad empiere il cannone o tubo ascendente, e quello che di poi si fa, corrisponde a tant'acqua, di quanta si vuol disporre. Nell'altra tromba C D, il corpo della quale è intieramente immerso; l'acqua cade da sè stessa, e passa a traverso dello stantuffo, per riempire lo spazio ch'egli lascia vuoto, quando si solleva; quando si deprime in giù, il foro si ottura con un'animella ch'è nella sua base, e l'acqua è costretta a passare nel tubo K, donde ricader non può, perchè vi è abbasso un'altra valvula, o linguella che la ritiene. Replicando per tanto le pinte dello stantuffo, cotesto tubo ascendente s'empie, e somministra poi dell'acqua sino all'altezza dov'egli mette capo.

Nell'una e nell'altra di queste due macchine, è facile calcolare la resistenza che viene dal peso dell'





SPERIMENTALE. 193

dell'acqua che si solleva, imperocchè, secondo i principj di sopra posti, e le sperienze impiegate da noi per provarlo, qualunque forma che prenda la colonna del fluido s'averà il suo giusto valore, moltiplicando la larghezza della sua base che è quella dello stantuffo medesimo, per l'altezza perpendicolare del tubo ascendente. Nell'una delle nostre due trombe la colonna d'acqua riposa sullo stantuffo che si tira, nell'altra resiste allo stantuffo che si spigne, ed è la stessa cosa affatto, per ciò che riguarda la forza che conviene impegnarvi. Supponendo adunque uno stantuffo di tale larghezza, che la colonna d'acqua di cui egli è la base, pesi 20 lire per ogni piede, il tubo ascendente, eziandio se non avesse di diametro più che un pollice, se averà 20 piedi di altezza, la somma dell'impressione o del carico fatto contro lo stantuffo sarà 400, prodotto da 20 moltiplicato per 20, come se la colonna d'acqua fosse in tutta la sua lunghezza d'un diametro eguale a quello della sua base.

Nulla dunque si guadagna, siccome appare in fare de' tubi o cannoni ristretti, per condur l'acqua d'una tromba; al contrario vi si perde per l'aumentazione degli sfragamenti: imperocchè, mostrato abbiamo nella terza Lezione, che questa specie di resistenza, date eguali tutte le altre cose, cresce come le superficie, e che la superficie interiore d'un cannoncino, rispetto alla solidità del contenuto, eccede quella d'un cannone più grosso.

Poichè una colonna di liquore assai minuta può esercitare una grande pressione, quando mette capo in una larga base, non dee recar maraviglia,

Tomo II.

N

che

che alcune mezzete d'acqua facciano crepare una botte piena, quando esse mezzete si sollevano perpendicolarmente sul foro del cocchiere in un cannone assai lungo; imperocchè allora questa colonna avendo la larghezza della botte per base; ha la forza stessa, che se in tutto il dilungo fosse egualmente larga. Ma quelli che fossero curiosi di ripetere questa medesima Esperienza, devono stare avvertiti che le botti ordinarie, nelle quali si mette il vino a Parigi, e ne' contorni, sono capaci d'una resistenza molto maggiore che non si crederebbe; con 20 piedi di tubo non sono talor venuto a capo di far crepare un barile da mezzo bigoncio: quel d'un bigoncio intero crepa più presto, perchè ha una base più larga.

Gli scorrimenti che si fanno da' vasi, bucati al di sotto della superficie del liquore, date aperture eguali, hanno tanto più di velocità quanto il liquore è più alto al di sopra del buco, perchè la parte del fluido che scorre attualmente, è premuta dal peso d'una colonna più lunga: laonde i getti d'acqua sollevansi e dispendiano tanto più d'umore, quanto i lor ricettacoli, o serbatoj d'acqua sono più alti; e l'altezza del getto a vicenda scema, secondo che si vuotano queste conserve. Quindi pure addiviene che un vase, la cui capacità è uniforme, come un cilindro, un prisma ec. posto su la sua base, non si vuota egualmente in tempi eguali, se lo scolo si fa per abbasso. Le quantità per ciascun tempo vanno diminuendosi; come l'altezza della superficie del liquido che n' esce: per questa ragione si è, che nelle pubbliche conserve d'acqua, ov'ella si distribuisce secondo le concessioni fatte ai particolari, deesi aver cura, che

S P E R I M E N T A L E. 195

che il fondo da cui ella procede, sia sempre egualmente pieno.

Avanti che l'arte dell'Orivolario fosse così perfetta, e d'un uso così comune, come lo è presentemente, solevasi d'ordinario misurare il tempo, con lo scolo di qualche liquore, o di qualche fluido; la *clepsidra* e la *rena* da ore, altro non sono che vasi, de' quali una parte vuotasi d'acqua, o di qualche fina polvere, in un certo spazio di tempo; ma queste sorte d'instrumenti non possono essere mai a bastanza perfetti, perchè in genere la velocità degli scorrimenti, dipende non solo dall'altezza perpendicolare del fluido, ch'è quella cosa che principalmente abbiain qui in mira, e che si può facilmente misurare, ma ancor dalla quantità degli sfregamenti, dal grado di fluidità, e di densità che sono variabili, e che è difficile calcolare.



II. S E Z I O N E.

Della Gravità, e dell' Equilibrio di molti
Liquori , che hanno densità
differenti.

NOI abbiain da bel principio della prima Sezione data un' idea de' Liquori in genere rappresentandoli come una massa di piccoli corpi solidi, durissimi, indipendenti gli uni dagli altri, pesanti separatamente, e a

N 2 pro-

196 LEZIONI DI FISICA

proporzione delle loro piccole masse; tutto quello che abbiain da aggiungere a questa descrizione, per far capire, come procedono nel vase medesimo due liquori di densità differenti, si è, che questi piccioli corpi onde son composti, sono anch'eglino adunamenti di parti più sottili, strettamente legate e aderenti fra loro; essendo la densità di queste picciole masse più o men grande le lor figure, e le lor grandezze più o men cagionando di vuoto nel loro aggomitolarsi, ben si capisce che ne debbono risuldar de' fluidi, o de' liquori più o meno densi.

Quando si paragonano più liquori rispettivamente al loro peso, o si fa la comparazione tra volumi d'una grandezza sensibile, come all'ora quando si pesa dell'acqua in confronto d'olio, o di mercurio in vasi separati, ovvero si comparano insieme le parti medesime, come quando si meschia dell'acqua col vino, o con dell'aria: in qualunque maniera che questo si faccia, la gravità o peso esercita i suoi diritti come altrove; ma la fluidità dà motivo ad effetti particolari, che s'iam qui per esaminare.

PRIMA PROPOSIZIONE.

La differenza del peso, o della densità, basta per separare le parti di due liquori, che mescolati sono insieme, se altre più forti cagioni non impediscono quest'effetto.

PRI.

PRIMA ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

In un vase di vetro diviso in due parti, che comunicano per un piccolo canale d'una linea e mezza di diametro, *Fig. 20.*, convien da prima mettere del vino rosso fino in A, e finire di empirlo con acqua, ed esporlo in qualche luogo, dove non sia agitato.

EFFETTI.

Dall'estremità del canale A vedesi tosto innalzarsi una picciola colonna di vino, che poi si spande su la superficie dell'acqua; ed a poco a poco tutto il vino passa così nel luogo dell'acqua, e questa nel luogo del vino.

SPIEGAZIONI.

Le particelle, che compongono la massa d'acqua, essendo più pesanti che quelle del vino, fanno più sforzo per occupare il fondo del vase, che non han quelle di forza per resister loro; di quà avviene che una colonna d'acqua capace di occupare a un dipresso la metà del canale A, prende il suo corso da su in giù, e che una pari quantità di vino solleva nel medesimo tempo da giù in su: e però che queste colonne d'acqua e di vino, a misura che passano, si rifanno continuamente a costo della massa, di cui fanno parte, a cagione della sua fluidità; succede final-

mente che tutta l'acqua si trova dov'era il vino avanti l'esperienza, e che il vino è costretto di occupare la parte del vase più alta: perchè due corpi non possono essere nel medesimo tempo nel medesimo luogo, come dimostrammo nella terza Lezione Sezione terza, parlando dell'Impenetrabilità della materia.

II. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

La caraffa cilindrica, rappresentata dalla *Figura 21.*, contiene 5 fluidi differenti: cioè, 1. mercurio, 2. olio di tartaro, 3. spirito di vino, 4. spirito di terebintina, 5. aria.

EFFETTI.

Quando il vase è in quiete, tutte queste materie occupano i luoghi, che convengono alla loro gravità specifica, cioè il mercurio sta al fondo, l'olio di tartaro immediatamente sopra del mercurio, di poi lo spirito di vino, quindi lo spirito di terebintina, e l'aria al di sopra di tutto: e se più volte si rovescia la caraffa agitando, dacchè ella torna in quiete, ciascuno de' detti liquori ripiglia il suo luogo, ma il mercurio, e l'olio di tartaro più prontamente che gli altri.

SPIEGAZIONI.

Questi cinque fluidi differiscono tra loro più, che il vino e l'acqua dell'Esperienza precedente, non solo per le loro gravità specifiche, ma ancora per la loro natura; lo che fa, senza dubbio, che agitandoli insieme, non si dividono e non si meschiano tanto quanto altri liquori, i quali fossero più analoghi; per la stessa ragione il mercurio e l'olio di tartaro si sceverano più presto che gli altri.

APPLICAZIONI.

I vasi idonei ad eseguire queste sorte di Esperienze, possono ricevere differenti forme, e disporsi in diverse maniere. Si può, per esempio; nascondere la capacità inferiore, che contiene il vino della prima Esperienza, in un picciolo piedistallo, o altrimenti, B, *Figura 20.*, così non lasciando apparire se non la parte del vase, dove si mette l'acqua, sembra agl'ignoranti di tali effetti, che l'acqua si muti in vino; così deludonfi talora gli occhi con piccoli artifizj, che perdono tutto il loro maraviglioso, quando se ne conoscono le cagioni. Noi ne parliamo solo, per insegnare a sospendere il proprio giudizio nelle cose; che da bella prima non si concepiscono, e a non tenere per soprannaturali certi effetti che sorprendono, e la causa fisica de' quali non è manifesta.

Le materie pingui, animali, vegetabili, o minerali, essendo per l'ordinario composte di molecole meno dense che quelle dell'acqua, svilup-

200 LEZIONI DI FISICA

pano da questa quando vi sono mescolate, e rare volte s'adopera per separarle, altro mezzo che quello di dar loro tempo di venire a galla: così si separa la crema, o il fior di latte.

Vediam sovente dell'acque stagnanti e corrotte, su la superficie delle quali osservansi delle macchie lucenti, ov' appariscono de' colori d' arco baleno, quando si guardano per certo verso: queste non sono altro che parti grasse o sulfuree, alzatesi dal fondo, come succede ne' terreni bituminosi, o sceverate e divise dall' interno dell' acqua, lo che addiviene sempre ne' bagni, od altre conche d' acqua, ove si va a lavare i panni lini. Ma se una goccia d' olio, una particella di grasso si solleva al di sopra dell' acqua, la stessa cosa avvenire dee, ed infatti avviene, quando ve n' è una maggior quantità; quindi più grasso ch' è un animale, *cæteris paribus*, tanto più ha di vantaggio per nuotare. Un buo, od un maiale, per questo conto, corre dunque meno rischio di negarsi, che un levriere, o qualunque altro magro animale.

Potremmo inoltre addur qui, per esempio, l' ascensione de' vapori e dell' esalazioni; ma quest' applicazione l'abbiam prevenuta, con far conoscere nella Lezione precedente, che il fumo e la fiamma non si sollevano nell' aria, se non per una leggerezza rispettiva, che a parlar propriamente, non è che una gravità minore; come l' aria si solleva nell' olio, l' olio nell' acqua, l' acqua nel mercurio.

Quantunque un liquore più leggero sia capace di salire, travalicando un liquore più pesante, tal circostanza vi ha nondimeno in cui quest' effetto non segue. L' acqua ed il vino, esempio: grazia, che
abbia.

abbiamo nella nostra prima Esperienza adoperati, non si separano, quando sono stati precipitevolmente versati l'un sopra l'altro. L'olio e l'acqua sbattuti insieme con l'aria che vi si mescola, perdono la loro fluidità, il bianco dell'uovo e la crema sbattuta, fanno la stessa cosa, e tai fatte di miscugli sussistono assai lunga pezza.

Tutti questi esempj provano solo, che alcune cause oppongonsi agli effetti della gravità nella separazione de' fluidi mescolati, e che tali cause possono diventare predominanti: ma non distruggono la nostra proposizione. E' mestieri di qui richiamare alla memoria quello abbiain detto degli sfregamenti nella terza Lezione. Crescendo la resistenza di questa fatta, come le superficie, i liquori mescolati possono essere divisi in così piccioli volumi, che l'uno tocchi l'altro per troppe parti, e che la differenza de' loro pesi, che sarebbe la causa della loro disunione, non eguagli lo sfregamento, o per spiegarci con altro più chiaro termine, non equivalga alla difficoltà che hanno a separarsi. Per questa ragione, il vino, quasi del pari pesante che l'acqua, per sè stesso, quand'è diviso grandemente per una discesa impetuosa, resta nell'acqua, come vi si ritrova; laddove, se per la forma del vase, o per la maniera di versarlo, si mettano in opposizione volumi più considerabili, e che abbiano meno di superficie rispetto alla loro solidità, avviene spessissimo, che lo sfregamento cede al peso dell'acqua. Per la ragione pure degli sfregamenti cresciuti con la division delle parti, l'olio ed il vino divengono *unguento*, il bianco dell'ovo, la crema ec. restano in spuma; imperocchè l'a-

ria

201 LEZIONI DI FISICA

ria v'è così divisa, e la sua meschianza con questi liquidi è così intima, che la sua leggerezza non basta più per svilupparla. Aggiungete a queste ragioni due altre cause, che rendono pure difficile la separazione delle parti: 1. la viscosità più o men grande in una materia, che in un'altra ma da cui niuna va esente; e 2. l'analogia, che spesso si trova tra due liquori: e che verisimilmente consiste in una certa convenienza di figure, di grandezza, o di superficie. Lo spirito di vino mescolato con dell'acqua, non si separa più da essa, e l'olio di terebintina, che niente più leggero si è non fa già la stessa cosa.

II. PROPOSIZIONE.

Molti liquori, o molti fluidi, benchè di nature differenti, pesano gli uni sopra gli altri in ragione delle loro densità, e della loro altezza.

Questa Proposizione non ha bisogno nè di spiegazione, nè di prove: imperocchè, se ogni liquore è pesante, per la ragion sola ch'egli è materia, aggiungere un liquore sopra d'un altro, è aggiungere un peso ad un altro peso, e quando l'un de' due fosse anco più picciolo che l'altro, nientedimeno è reale il valore ch'egli ha, e però computabile nella somma. Se si vuole caricare il fondo d'un vase cilindrico di due lire di liquore, e si cominci con versarvi una lira d'acqua, si potrà certamente finire il carico con dell'olio; questo essendo meno pesante, ne abbisognerà un maggior volume, ma il suo peso non coope-

S P E R I M E N T A L E. 203

coopererà meno alla pressione, che di far ci sian proposti.

III. PROPOSIZIONE.

Due liquori di densità differenti sono in equilibrio, allorchè avendo la medesima base, le loro altezze perpendicolari all'Orizzonte, sono in ragione reciproca delle loro densità, o gravità specifiche.

III. E S P E R I E N Z A.

P R E P A R A Z I O N E.

ECD, *Figura 22.* è un sifone rivoltato, nel quale si versa del mercurio, fin a tanto che la superficie da una parte e dall'altra sia d'una mezza graduazione, o d'un mezzo grado più elevata, che la linea CD dopo di che si versa dell'acqua colorata nel ramo CE.

E F F E T T I.

Quando la colonna d'acqua misura 14. gradi, il mercurio si trova d'un grado più elevato nel ramo D, che nell'altro.

S P I E G A Z I O N I.

Il Mercurio caricato da un canto dalla colonna d'acqua, sollevasi nell'altro ramo, fin a tanto che sia in equilibrio col liquore che lo preme; quando cessa di ascendere, la sua altezza al di sopra del suo livello, pareggia la quattordicesima parte

204 LEZIONI DI FISICA

parte dell'altezza dell'acqua; e si fa del resto, che il peso dell'acqua è a quel del mercurio, come 4 a 14; manifesto è dunque che le altezze di questi due liquori, sono in ragione reciproca delle densità, poichè l'acqua tienfi quattordici volte più alta, come il mercurio è 14. volte più pesante.

APPLICAZIONI.

Riconosciuta una volta che sia per vera la proposizione che provata abbiamo, sarà facile conoscere la mutua proporzione delle densità di più liquori, con paragonar a questo modo le loro altezze, quand'eglin saranno in equilibrio; imperocchè si capisce bene che in vece di mercurio si potrebbe mettere con l'acqua ogni altra materia liquida, come olio, spirito di vino, ec. e che parimenti dalla loro altezza al di sopra del livello giudicherebbesi quanto l'uno fosse più o meno pesante dell'altro.

Siccome si può giudicare delle densità, comparando le altezze, così potrebbe dall'elevazione del più pesante dei due liquori, se si conoscessero le densità, stimare l'altezza del più leggero, nel caso che non si potesse misurarla. Se, per esempio, un palombaro avesse nel fondo dell'acqua un sifone ripiegato, con del mercurio, su cui la pressione dell'acqua adopera sola, e solamente da uno de' due rami, dacchè egli vedesse il mercurio alzato un piede, potrebbe conchiudere in tutta sicurezza che la colonna d'acqua, che preme, ha 14. piedi d'altezza.

Noi siamo sopra la terra come i pesci, che strisciano nel fondo del mare, immersi in un vasso

sto fluido che da tutte le parti ne circonda, e di cui non sappiamo appuntino l'altezza: avvezzi fin dal nostro nascimento alla pressione dell'aria, ch'è uguale ed uniforme sopra tutta l'ampiezza de' nostri corpi, non la sentiamo, perchè ella è continua; imperocchè sentire, altra cosa non è che giudicare del nostro stato attuale, comparandolo ad un altro, che ha preceduto: una sensazione, che non è mai interrotta, a parlar propriamente, non è sensazione. Quindi è che la cognizione della Gravità dell'aria, è una scoperta, che tuttor ha l'intero sapore di novità. Appena è un secolo, che si fa caso e conto della pressione di questo fluido; prima d'allora tanto è lungi, che fosse creduto pesante, che molti Filosofi l'aveano messo nella schiera delle materie, alle quali attribuivano una leggerezza assoluta.

Non già che la natura non avesse anche allora la voce dell'Esperienza e de' fatti, che essi avean attoniti ed attenti i Dotti; ma le sue voci erano male interpretate. Aveasi veduto con ammirazione salir l'acqua sopra del suo livello nelle trombe aspiranti; aveasi osservato che lo stantuffo d'una siringa non si poteva tirare se non a gran forza, quand'ell'era otturata da un capo. Vedevasi con stupore, che un mantice non avea il suo moto libero se non in quanto egli era aperto nel suo cannone, che due corpi duri e lisci come il marmo applicati l'uno all'altro difficilissimamente si separavano, ec., N'adducevano questa frivola ragione, e dicevano, che la natura ama secretamente il pieno; su-
bito che in qualche parte manca della materia,
„el-

206 LEZIONI DI FISICA

„ ella s' affretta a portarvene; in somma, che la
„ natura abborrisce il vuoto “.

Queste frivole ragioni, degne di riso non che di rispetto, tuttochè fossero pur troppo rispettate in que' tempi, che la ragione cedeva all' autorità d' un nome celebre, han lunga pezza ritardato il progresso della Fisica. Il Galilei fu a par cogli altri soddisfatto dell' orror del vacuo, finchè non giunse a vederne i limiti; ma quando assicurato da manifeste prove, che l' acqua non ascendeva se non trentadue piedi nelle Trombe aspiranti, e che il resto del tubo, s' era più lungo, rimaneva vuoto, si ribellò alla fine contro cotesta maniera di filosofare; e tant' è lungi ch' ei pensasse, come avrebbe talun altro potuto pensare, che l' orror del vuoto avesse i suoi limiti, oltra i quali ei si rivolgesse in indifferenza; che anzi cominciò credere, avere coteste sorte di fenomeni una causa fisica molto diversa da ciò ch' era stato fin allora escogitato per ispiegarli. La cosa da lui sospettata, fu messa in evidenza dal suo discepolo Torricelli. Questo Filosofo Italiano fe il primo vedere nel 1643. che una colonna d' aria presa nell' atmosfera, ponesi in equilibrio con una colonna d' un altro fluido, che ha la stessa base. Questa Esperienza, che noi fra poco ripeteremo, provò invincibilmente la gravità dell' aria, e restitui autenticamente a questo fluido un grandissimo numero d' effetti naturali, attribuiti prima d' allora ad una causa puramente chimerica.

PRO.

S P E R I M E N T A L E . 207

P R O P O S I Z I O N E .

L'aria è un fluido pesante, e che esercita la sua pressione per tutti i versi alla maniera de' liquori.

Quantunque noi abbiam risoluto di trattare a parte delle proprietà dell'aria, abbiam creduto nulladimeno, che fosse a proposito recar qui in brevi detti ciò che concerne la sua gravità, perchè tal contezza è un'attinenza dell'Idrostatica. Ciò che l'aria opera come fluido pesante, lo fa in conseguenza de' principj di questa scienza; e noi non ne facciam particolar menzione, se non perchè la sua gravità è una delle più curiose ed importanti scoperte, che fatte sieno in questi ultimi tempi. Ma d'altro qui non parleremo, che della sua gravità relativa, rimettendo a trattare, insieme coll'altre sue proprietà, della sua gravità assoluta, quando si replicheranno le sperienze, che la provano *a priori*.

I V . E S P E R I E N Z A .

P R E P A R A Z I O N E .

Si gitta del mercurio purgatissimo in un tubo di vetro, lungo in circa 3 piedi, e chiuso da un capo. Quando il tubo è pieno affatto, ponesi il dito sopra l'orifizio per otturarla, e dopo d'averlo rovesciato, portasi l'estremità che col dito è chiusa, in un vase che pur contiene del
mer.

208 LEZIONI DI FISICA
mercurio, e levassi allora il dito. Vedi la *Figura 23*.

EFFETTI.

Il tubo così immerso ed aperto a basso, vuotasi in parte nel vase; ma vi resta una colonna di mercurio, che ha in circa 27 pollici e mezzo d' altezza.

SPIEGAZIONE.

Essendo l' aria una meteria, ha come tutti li altri corpi una gravità la quale ha per centro quel della terra medesima; un corpo grave, come precedentemente abbiám veduto, adopera col suo peso sopra tutto quello che alla sua caduta s' oppone, o che gli serve di base; così quando una colonna, d' aria dell' atmosfera riposa sopra qualche corpo, lo comprime secondo tutto il valore del suo peso. La superficie del mercurio nel vase delle nostra sperienza, è dunque compressa dal peso d' una colonna d' aria, di cui ella è la base; quando si applica a qualche parte di questa superficie compressa un tubo che contiene una colonna di mercurio più pesante che la colonna d' aria, il cui luogo è occupato dalla sua base, questa colonna di mercurio affonda, e s' abbassa, finchè la sua altezza diminuita metta il suo peso in equilibrio con la pressione che s' esercita su tutte le parti simili della superficie del mercurio, dov' è immerso il tubo.

Questa sperienza sola agli occhi d' un uomo ostinato nell' orrore del vacuo, non averebbe avuto

to punto più di forza, che l'osservazione di Galileo circa le trombe aspiranti, nelle quali l'acqua non saliva più di 32 piedi; sarebbe cotest'uomo tuttavia illuso, e al più, limiterebbe l'amor della natura verso il piano; ma da che l'une e l'altro fatto si paragonano insieme, non può restare alcun sutterfugio. Quando si vede che le colonne di liquori elevate così al di sopra del loro livello, scemano, come le loro densità crescono; quando si è certo che la cagione la quale solleva l'acqua 32 piedi, non può sostenere il mercurio se non 27 pollici e mezzo, e si sa che queste due colonne sì differenti in lunghezza, hanno de' pesi perfettamente eguali, si è costretto confessare che la causa della lor sospensione non è una qualità astratta, poichè si coordina con tanta esattezza alle leggi della Statica. In una parola; quest'effetto, che altro inchiude che le proprie circostanze dell'equilibrio? Appunto tal giudizio ne portò il Torricelli, e dopo lui asseriscono la stessa cosa i più de' Fisici, i quali ebber contezza della sua bella e curiosa Esperienza. Ma niuno contribuì maggiormente a scoprire e rendere manifesta la gravità dell'aria, che il Sig. Pascal; egli s'era prevaluto dell'orrore del vuoto, come d'un linguaggio comune; ma l'avea fatto, siccome il Galilei, con tutta la ripugnanza, che nell'esprimerli oscuramente prova un ingegno formato dalla natura per ricevere e trasmettere solo idee chiare e distinte. Secondò egli con ardore e con studio sagace, le mire del Torricelli; e si di per se, si ajutato dal diligente M. Perrier suo congiunto, ch'era a Clermont nell'Auvergne, che potea utilmente fare le sue osservazioni so-

210 LEZIONI DI FISICA

pra un'alta montagna, detta *Puy Du Dome*, portò a somma evidenza ciò che veniva indicato a chi sbandite avea le qualità occulte, poco meno che decisamente, dalla colonna di mercurio sospesa sopra del suo serbatojo.

Il metodo tenuto da M. Pascal, per accertarsi se la sospensione de' liquori sopra del loro livello nelle trombe aspiranti, ò nel tubo Torricelliano, fosse un fatto d'equilibrio, e se la potenza opposta al peso del mercurio, fosse veramente una colonna d'aria presa nell'atmosfera, come era probabile, fu il seguente. „ Se l'aria dis- „ egli, è la cagione di questo fenomeno, lo è, „ perchè è pesante e fluida; la sua pressione deve dunque farsi, come si fa quella de' liquori; „ debb'ella scemare o crescere secondo la di lei „ altezza, e le colonne di liquore con le quali „ sarà l'aria messa in equilibrio, saran sempre „ più o meno lunghe, secondo che saranno più „ o meno dense. Vediamo quello che ce ne dirà „ l'Esperienza „.

Qualunque estensione che aver possa l'atmosfera, sopra della superficie della terra, non si può far a meno di credere, ch'ella fermi attorno del globo un'involatura, la cui superficie è uniforme e sferica, appresso a poco come quella dell'acqua pare piana, qualunque figura che abbia il fondo del vase che la contiene. In tale supposizione, le colonne d'aria, computando dall'estremità dell'atmosfera, sino al luogo, dov'elleno incontrano la terra, sono più o meno lunghe, secondo la maggiore o minore elevazione del luogo, dove elleno terminano; hanno dunque più di lunghezza alle falde d'un monte, che
su

S P E R I M E N T A L E . 211

fu la sommità di esso; se l'aria è pesante, queste colonne in un luogo basso, deono fare una maggiore pressione, che in un luogo più elevato.

Avendo osservato M. Perrier, a quale altezza fosse il mercurio nel tubo di Torricelli, alle falde della montagna di *Puy du Dome*, trovò che sempre più e costantemente s'abbassava, a misura ch'egli poggiava verso la cima del monte, e che rimontava al contrario e colle medesime proporzioni a misura ch'ei discendeva verso la Città; e questa Esperienza, immaginata dal Sig. Pascal, e replicata più volte secondo le sue intenzioni, ha sempre additato lo stesso effetto; perciò si è concluso, che il mercurio sostienfi al di sopra del suo livello nel tubo Torricelliano, per la pressione dell'aria sul vase, perchè vedevasi abbassare il mercurio nel tubo, quando la colonna che corrispondeva a cotesto vase, diventava men lunga.

Ma se la pressione dell'aria sul bacino, sosteneva 27 pollici e mezzo di mercurio nel tubo, bisognava che questa colonna così sospesa, non fosse in alcun modo soggetta al peso dell'aria per la sua parte superiore; imperocchè essendo allora tra due pressioni eguali, dee cadere al suo livello per lo suo proprio peso. E di fatto ciò accade, se si apre l'estremità del tubo anche con un piccolissimo foro: e a fine di mostrare con una medesima Esperienza, essere egualmente necessario, che l'aria operi su la superficie del bacino, e operi solo in cotesto luogo, per sostenere la colonna di mercurio al di sopra del suo livello; M. Pascal trovò l'Esperienza che segue.

O 2

V. ES.

V. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

FG, Fig. 24. è un tubo di vetro doppiamente ripiegato e ritorto in H, avendo circa 30. pollici da G in K, ed altrettanti da H in F. K è un piccolo canale aperto che comunica coll'interno del tubo, e che si ottura con un pezzetto di vescica ammollata. Empiesi tutto il tubo di mercurio, ed immergesi nel catino, come il Torricelliano.

EFFETTI.

1. Il mercurio discende in I, e si ferma 27. pollici e mezzo in circa, sopra del livello. 2. Se si punge con un ago la vescica che ottura l'orificio K, tosto v'entra l'aria, ed il mercurio contenuto da I fino in G, cade nel bacino; e quello che è contenuto nella parte recurva H del tubo, s'innalza appresso a poco all'altezza di 27 pollici e mezzo.

SPIEGAZIONE.

Da questa Esperienza raccogliesi 1. che l'aria è la cagione di questi due effetti, poichè non seguono, se non quando è punta la vescica. 2. Che l'elevazione del mercurio da G in H, è veramente cagionata dalla pressione dell'aria esterna su la superficie del catino, poichè il mercurio ricade, tosto che questa pressione è contrap-

S P E R I M E N T A L E. 213

pesata dall' introduzion d' una colonna d' aria in K.
3. Che questa pression dell' aria esterna, è atta a sostenere il mercurio 27 pollici e mezzo, poichè lo solleva a tale altezza nella parte H F.

Finalmente il Sig. Pascal replicò l' Esperienza del Torricelli con dell' acqua, con del vino, con dell' olio, ec. da tutti gli effetti che ne seguirono, si raccolse, che alla pressione dell' aria dovevasi attribuire la sospensione di tutti questi liquori al di sopra del lor livello, perchè essendo le loro altezze sempre più o meno grandi ne' tubi, a proporzione delle loro differenti densità, era manifestissimo, ch' elleno mettevansi in equilibrio con un peso ch' era sempre l' istesso appresso a poco; e però che non v' era altro che l' aria, che corrispondeva alla loro base, questo fluido si palesava da sè stesso per la vera cagione di tale effetto.

A P P L I C A Z I O N I.

L' Esperienza di Torricelli appena fu nota e divulgata, che i Fisici a gara s' affrettarono per ripeterla, e studiarne cogli occhi proprj tutte le circostanze; ognuno aveva nel suo Gabinetto la colonna di mercurio sospesa, e la visitava sovente. Un esame cotanto assiduo non doveva lasciare gli osservatori nell' ignoranza delle variazioni, che succedono all' altezza del mercurio nel tubo; non si tardò ad accorgersene; e vediamo da lettere del Sig. Canuto, a cui erano stati commessi gli affari del Re di Francia nella Svezia, che Descartes, Pascal, e Perrier non n' erano all' oscuro, e che fin al loro tempo s' è pensato di fare, col mezzo di que-

sta Sperienza, un nuovo strumento Meteorologico; fu però da poi nominato *barometro*, o *baroscopo*, vale a dire misura od osservazione del peso (dell' aria.) In fatti poichè il peso dell'aria è quello che sostiene il mercurio nel tubo, quando egli sale più alto, o discende più a basso; che 27 pollici e mezzo, ch'è la sua mezzana altezza, non si ha egli ragione di conchiudere che la pressione dell'aria è accresciuta o diminuita? e cotesta colonna di mercurio che s'alza e s'abbassa, non è ella un'indicazione della gravità attuale dell'atmosfera?

Quando il barometro altro vantaggio non avesse, che quel d'avvisarci, che il fluido nel qual viviamo; ha più o men forte azione sopra de' nostri corpi, meriterebbe già d'occupare un luogo ne' nostri appartamenti, e d'essere preferito a tant'altri mobili superflui od inutili; ma hanno un altro, che lo rende più importante, ed è ch'egli annuncia innanzi tempo le mutazioni dell'aria e de' tempi, sopra tutto quando han da essere considerabili; e negar non si può, che sì fatte predizioni molto rilevano per le opere della campagna, de' li viaggianti, e in moltissime altre circostanze.

Tal proprietà del barometro, è comprovata e certificata dalle osservazioni di quasi un secolo, fatte in diversi paesi, e da diverse persone attente ed accurate; e massime dopo la fondazione delle Accademie, noi abbiam favole d'osservazioni meteorologiche, dalle quali appar certissimo.

1. Che l'altezza mezzana del mercurio nel barometro, è di 27 pollici e mezzo in Francia.
2. Che il maggiore abbassamento non arri-

va

va a 26 pollici, nè la maggiore elevazione a 29.

3. Che verso l'Equatore, le variazioni sono men grandi, e che all'opposto lo son più nei Climi Settentrionali.

4. Che quando il mercurio è depresso nel barometro al di sotto di 27 pollici e mezzo, predice pioggia o vento, ed in genere cattivo tempo.

5. Che al contrario, quando eccede la sua mezzana altezza, annuncia la calma, il secco, il buon tempo.

6. Che queste predizioni talora van fallite, particolarmente quando le variazioni d'altezza del mercurio si fan lentamente, ed in picciolà quantità.

7. Che al contrario son quasi infallibili, quando il mercurio ascende o discende d'una considerabile quantità in poco tempo, come, per esempio, 3 ovver 4 linee in alcune ore.

8. Che a Parigi rarissime volte le variazioni del barometro s'estendono più lungi che di 27 in 28 pollici.

Quest' ultima osservazione ha eccitata la vaghezza d'aver barometri, le cui variazioni avessero più estesa, affinchè le più piccole variazioni potessero essere osservate; quindi son provenuti i barometri in due rami, chiamati *doppi* per questa ragione; i barometri *cubitati*, i barometri *scorciati*; ec. de' quali noi non darem qui la descrizione, perchè sono già notissimi, e questo divisamento ci farebbe troppo digredire dal nostro soggetto. Direm solo, che di tutti i mezzi escogitati sin ora per perfezionare il barometro, niuno è tanto vantaggioso, e libero così da in-

216 LEZIONI DI FISICA

convenienti, che meriti d'essere preferito a quello di Torricelli, cioè a quello che comunemente si chiama barometro *semplice*, e da noi rappresentato con la Fig. 25.

Ma quest'ultimo, tuttochè semplice, debb'essere lavorato con attenzioni, nelle quali d'ordinario mancano gli artefici che li vendono. Bisogna ch'ei sia pieno d'un mercurio perfettamente puro; che il tubo abbia almeno una linea e mezza di diametro internamente, che il vetro ne sia perfettamente netto, e che non resti alcuna particella sensibile d'aria tra il mercurio ed esso. Bisogna in oltre, che il picciol vase, che serve di catino o ricettacolo abbasso del tubo, sia di tale larghezza, che la superficie del mercurio ch'egli contiene, resti sensibilmente alla medesima altezza, mentre quello del tubo ascende o discende. Si dee ancora por mente, che la scala de' gradi sia puntualmente divisa; imperocchè sarebbe un difetto notabile, se si trovasse sbaglio ed errore d'alcune linee su li 27 pollici e mezzo d'altezza mezzana la qual cosa è pur troppo possibile, quando un si contenta di attaccare sopra la tavola una stampa già bell'e divisa, siccome per lo più si suol fare.

Se i Fisici son d'accordo fra loro, che il mercurio del barometro è sostenuto alla sua mezzana altezza, dal peso dell'aria dell'atmosfera, non son d'accordo affatto circa le variazioni che vi si osservano. Ben si sa, che una maggiore elevazione del mercurio, dinota una maggior pressione dalla parte dell'aria; ma per quai ragioni l'aria preme più in un tempo che in un altro, e quale affinità v'è tra questa pressione più o men grande, e la mutazione de' tempi la qual succe-

de

S P E R I M E N T A L E. 217

de qualche volta, sol 10, o 12. ore dopo? Ciò si esaminerà da noi altrove, quando avremo fatto conoscere più ampiamente le proprietà dell'aria, e gli stati differenti dell'atmosfera.

VI. ESPERIENZA.

P R E P A R A Z I O N E.

Si applica alla superficie d'un vaso pieno d'acqua colorata, un tubo di vetro aperto dai due capi, e si fuccia colla bocca, o d'altra guisa, l'aria ch'egli contiene, CD, *Figura 20.*

E F F E T T I.

Dacchè si fuccia l'aria che è nel tubo; l'acqua vi ascende, e lo riempie.

S P I E G A Z I O N I.

Poichè l'aria è un fluido universalmente diffuso sopra tutti i corpi, che stanno su la superficie della terra, bisogna concepir l'acqua del nostro vaso, come avente due sorte di pesi, che la fan gravitare sul fondo; cioè quello che a lei viene dalla sua propria massa, e quello d'una colonna d'aria, che corrisponde alla sua superficie, e cui ella sostiene. Imperocchè abbiain veduto di sopra, che più liquor l'un sopra l'altro, esercitano la loro gravità in comune sul medesimo fondo. Supponiamo adesso, che l'acqua sia divisa in un certo numero di picciole colonne simili a quella che corrisponde all'orifizio del tubo; ciascuna
di


218 · LEZIONI DI FISICA

di queste colonne corrisponderà ad una colonna d'aria simile in diametro, e si potrà di lei dire quello che abbiamo poc'anzi detto della massa totale, ch'ella pesa o che tende al fondo del vaso per sè medesima, e per lo peso dell'aria ch'ella porta.

Finchè non si succiona l'aria del tubo, tutte le estremità di queste colonne d'acqua sono nel medesimo piano, perchè essendo egualmente pesanti, ed egualmente caricate, non vi è ragione che obblighi l'una o l'altra a starsene più alta, o più bassa del resto; ma se l'una di esse trovisi scaricata del peso dell'aria ch'ella portava, (ed ella appunto se ne scarica, col levar l'aria dal tubo di vetro) allora questa colonna deve elevarsi al di sopra dell'altre, perchè non è più in istato di far loro equilibrio. E non permettendo la fluidità della massa, che questa colonna così elevata lasci alcun vuoto nel fondo; ella ristorasi continuamente a spese dell'altre, che scemano in lunghezza, ed il vase in questa maniera si vuota.

Se la pressione dell'aria su la superficie dell'acqua fosse infinita, si potrebbe così con un tubo assai lungo elevar l'acqua, o qualunque altro liquore, ad una altezza non limitata. Ma se il peso dell'aria non ha se non un certo valore, quando l'acqua sarà giunta a tale altezza, che il suo proprio peso sia eguale a quello dell'aria che la solleva, si potrà ben quanto si vorrà succionar quella del tubo, non averà più oltre effetto la potenza dell'aria esteriore già esaulta.





VII. ESPERIENZA.

P R E P A R A Z I O N E .

Questa Esperienza si fa , come la precedente ; ma si adopra mercurio in luogo d'acqua , ed il tubo debbe avere almeno 30 pollici di lunghezza , e non eccedere una linea di diametro .

E F F E T T I .

Il mercurio arrivato a 27 pollici e mezzo o in circa , non si solleva d'avantaggio , quantunque si continui a succiar l'aria del tubo .

S P I E G A Z I O N E .

Niente abbiain da aggiungere alla Spiegazione dell'Esperienza precedente , per far capir questa ; se non che , siccome il mercurio è molto più pesante che l'acqua , il peso dell'aria esteriore , che serve ad innalzarlo , trovasi in equilibrio con una colonna men lunga . Se vi fosse qualche fluido ancor più pesante del mercurio , lo vedremmo senza dubbio fermarsi ancor più basso .

A P P L I C A Z I O N I .

Vuotar d'aria un tubo , succiandola con la bocca , over strascinando per entro , e da giù in su un turacciolo ben combaciante , è la stessa cosa quanto

220 LEZIONI DI FISICA

to all'effetto che ne dee seguire; è sempre un dar luogo alla pressione dell'aria che corrisponde al ricettacolo, o catino, e questo basta per elevare il fluido. Ciò vedesi appuntino nelle siringhe, o trombe aspiranti; imperocchè lo stantuffo passando da giù in su del cilindro cavo che lo contiene, solleva la colonna d'aria, che pesa sul suo piano superiore; fatti di sotto un vuoto, dove il peso dell'atmosfera fa salir l'acqua, come nel tubo dell'Esperienza precedente. Vedi la *Figura 27.*

Ma essendo il peso dell'atmosfera limitato, e facendole equilibrio una colonna d'acqua di circa 32 piedi, ne' nostri climi, e ne' luoghi che sono poco elevati sopra'l livello del mare, ben si concepisce che una tromba, qual è quella di cui favelliamo, e che si chiama *aspirante*, non può elevar l'acqua a qualsivoglia altezza. Quando questa non basta, si adoprano quelle, delle quali abbiamo parlato di sopra, e che chiamate abbiamo *trombe pressorie*. Posciachè in quest'ultime la colonna d'acqua che si solleva, è immediatamente portata dallo stantuffo, e questo stantuffo è guidato da una potenza che si può aumentare quanto si vuole, è manifesto che la salita dell'acqua non è limitata ad alcuna altezza.

Se le trombe pressorie hanno l'avantaggio di portar l'acqua a qualunque sorte di altezza, non hanno poi quello di poter essere collocate fuori del pozzo o della doccia donde si vuol trarre l'acqua, come le trombe aspiranti. Ed è un incomodo grandissimo, collocare e mantenere queste sorte di macchine in luoghi assai profondi, stretti, difficili a vuotare, e per lo più in paesi, ne quali





li la scarfezza di lavoratori periti accresce la difficoltà de' ristoramenti.

Schifansi cotali inconvenienti, e godefi d'un doppio vantaggio, con fabbricar le trombe in maniera tale, che sieno nel medesimo tempo aspiranti e pressorie, come per esempio, son le rappresentate dalla *Fig. 28*. Il turacciolo, o stantuffo, aspira ascendendo, e schiaccia o preme discendendo. Il tubo che conduce l'acqua dalla fontana alla tromba, non può per verità avere, se non 32 piedi al più di altezza perpendicolare; ma ciò spesso basta per alluogare la tromba in un sito comodamente accessibile, ed il tubo ascendente che porta l'acqua riscalcata, può avere tanta lunghezza, quanto permette la forza motrice.

Quando si fa uso di trombe aspiranti, convien badare alla situazione del luogo; imperocchè non sollevando elleno l'acque, se non con l'aiuto dell'atmosfera che pesa su la superficie della sorgente, quanto più questa sorgente è elevata sopra 'l livello del mare, tanto meno è lunga la colonna d'aria che la preme. Io ho portato un barometro su la maggior altezza dell'Alpi (23. Luglio 1739.) ed ho trovato, che il mercurio stava in circa un quarto men alto che in Piemonte. Se avessi colà portata una tromba aspirante, e l'avessi fatta operare, non m'avrebbe dunque sollevata l'acqua, che 24 piedi al più; e per la ragion del contrario, ne sotteranei profondissimi, si potrebbe aspettare dal peso dell'aria effetti più grandi, che quelli che ella opera altrove.

Per una meccanica molto simile a quella delle trombe aspiranti, gli uccelli da becco lungo, come gli aironi, le cigogne, le beccacce ec., e la
mag-

222 LEZIONI DI FISICA

maggior parte de' quadrupedi, i cavalli, le vacche, i cervi ec. sollevano l'acqua nel loro stomaco: questi animali bevono succhiando, e succhiare non è altro che rarefar l'aria interna, dilatando le capacità che la contengono, per dar luogo all'atmosfera d'operare colla sua pressione. Il petto alzandosi, simile ad un mantice, di cui si slargano e si scostano le cuoja, produce un nuovo vacuo; che l'aria esterna va ordinariamente a riempire, (lo che chiamasi *respirare*) ma se la bocca trovasi bagnata, o piena d'acqua quando quest'ultimo fluido fosse al di sotto dello stomaco, dove si fa il vuoto, è colà portato dal peso dell'aria, della quale egli è sempre pieno.

Se rimanesse ancora qualche incertezza dopo le spiegazioni, che abbiain date dell'aspirazione delle trombe, e degli altri effetti di questa spezie: se tuttavia si dubitasse, che la pressione dell'aria siane la vera causa, si potrebbe terminarla di convincersene coll'Esperienza, che qui rechiamo.

VIII. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Su la piafretta d'una macchina pneumatica ponesi una picciola tazza, *Figura 29.*, che contiene del mercurio: copresi d'un recipiente, a cui è soprapposta una picciola tromba aspirante, il tubo della quale, ch'è di vetro, s'immerge nel picciolo vase, e si fa il vacuo più accuratamente che sia possibile.

EF-

E F F E T T I .

Quando levafi lo stantuffo della piccola tromba, si sente una resistenza considerabile, ed il mercurio non s'innalza nel tubo: ma se l'aria rientra nel recipiente, la tromba allora ha il suo effetto ordinario.

S P I E G A Z I O N I .

Noi pretendiamo, che il peso dell'aria faccia salire i fluidi nelle trombe aspiranti; questo peso si toglie, con vuotare il vase, sotto 'l quale sta il mercurio, e la tromba non ha più il suo effetto. Dunque è dimostrato, che ciò che si è tolto (l'aria, e la sua pressione) è la vera causa dell'ascesa de' liquori nelle trombe.

La difficoltà che si prova, nel sollevare lo stantuffo, quando il recipiente è vuoto, è ancor una prova del peso dell'aria. Che la siringa metta capo in un vase vuoto d'aria, o ch'ella sia otturata da basso, e lo stesso; fin che lo stantuffo premuto nella sua parte superiore da una colonna d'aria che pesa di su in giù, è altresì premuto nel tempo istesso da un'altra colonna della medesim'aria che sostiene la sua parte inferiore, o immediatamente, o coll'intermezzo d'un altro fluido ch'egli spigne, cotesto stantuffo è in equilibrio tra due potenze eguali; e per muoverlo non s'ha da vincere che il suo sfregamento; ma quando si toglie via la colonna d'aria che lo sostiene di sotto, non si può più tirarlo da giù in su, se non si solleva l'aria che regge sopra di lui,

224 LEZIONI DI FISICA

lui, e quest'aria è un cilindro, che ha tutta l'altezza dell'atmosfera, e di cui lo stantuffo medesimo è la base.

APPLICAZIONI.

Si richiami quì alla memoria il mezzo da noi adoperato nella seconda Lezione *, per sforzar l'acqua ed il mercurio, a passar per li pori del legno e della pelle. E si capirà, da ciò che poc' anzi abbiám detto circa la pressione dell'aria, perchè que' fluidi hanno penetrato il fondo del loro vase, quando si è fatto il vuoto ne' cannoni di vetro, su i quali erano posti, imperocchè è facile intendere, che togliendo via, come abbiám fatto, l'aria che fa equilibrio di sotto, e quella che preme di sopra, questa esercita tutto il suo peso sul liquore, e la sforza a passare.

Un mantice chiuso da tutte le parti, non ha più il moto libero; perchè, siccome l'animella della siringa della passata Esperienza, egli porta una massa d'aria considerabile, a cui nulla fa equilibrio di dentro.

Per la stessa ragione, il petto degli animali non può più dilatarsi, come è solito fare per la respirazione, dacchè si chiude ogni azione dell'aria, che deve entrarvi; e gli Anatomici consentono, che gli animali che si annegano, muojono meno dalla quantità d'acqua cui inghiottono, che per l'interruzione del moto necessario per respirare.

La gravità o la pressione laterale dell'aria può provarsi con l'Esperienza che siegue.

IX. ES-

I. e II. Esperienza Tom. I.

IX. ESPERIENZA.

P R E P A R A Z I O N E .

Convien porre e fermare su la piastrina della macchina pneumatica, un picciolo mulinetto, e coprirlo d'un proporzionato recipiente, forato lateralmente, e eguernito d'un picciol capo di tubo che si tiene otturato col dito, mentre si rarefa l'aria con una pinta di stantuffo solamente. *Figura 30.*

E F F E T T I .

Dacchè si leva via il dito per lasciare il canale aperto, sentesi un soffio, e vedesi girare il mulinetto rapidissimamente.

S P I E G A Z I O N E .

Il soffio che si sente, non può essere attribuito ad altro che all'aria, la quale passa con grande velocità dal di fuori al di dentro del recipiente, per succedere a quella che si è sottratta; e però che il canale che le dà ingresso, è orizzontale, non si può far a meno di confessare, che l'aria, come tutti gli altri fluidi, esercita la sua gravità per fianco, non meno che da su in giù.

A P P L I C A Z I O N I .

Tutti fanno, che una botte piena, e sturata abbasso solamente, non si spande, se il buco non

Tomo II.

P

è mol-

226 LEZIONI DI FISICA

è molto grande: la ragione si è, perchè l'aria col suo peso sostiene il liquore che tende ad uscire, e che pesa meno di lei, perchè non ha il liquore un'altezza sufficiente; ma se si farà un'apertura nella parte superiore della botte, l'aria che pesa sul liquore per questo nuovo foro, fa tanto sforzo per sospingerlo fuori da su in giù, quanto una colonna d'aria simile ne fa per impedirne l'uscita da basso, ed allora esso liquore se n'escie per il suo proprio peso. Questa spiegazione può servire a render ragione d'un fatto, che a prima giunta sembra singolarissimo. Empiesi d'acqua un fiasco *Figura 31.*, forato in A con un picciol buco, il quale si tien chiuso con una pallottola di cera; a traverso del turacciolo, che chiude puntualmente l'orificio, passa un tubo di vetro B, ch'è aperto da i due capi; e s'empie d'acqua il fiasco ed il tubo. Se si distura il foro ch'è in A, l'acqua se ne scorre fin a tanto, che il tubo sia vuoto; e subito dopo ella si ferma.

Ciò ch'è contenuto nel tubo, dee scorrer giù per il suo proprio peso, perchè l'aria preme tanto in B, quanto resiste in A; ma quando questo tubo è vuotato affatto, dee cessare lo scorrimento; imperocchè l'acqua che è al di sotto di AC, è ritenuta dal suo proprio peso, come lo è ordinariamente in una tazza; e quella ch'è al di sopra di cotesta linea, riman sospesa, non solamente per la pressione dell'aria in A, ma ancor per quella d'una colonna, che agisce per B lungo il tubo.

Finalmente tutti gli effetti, che dipendono dal peso dell'aria, si fanno in una camera, egualmente che fuori; nel barometro, per esempio, il mercurio stassi colà nella medesima altezza,

tezza, e le trombe sollevano egualmente l'acqua in luoghi coperti: lo che prova, che i solaj, o pavimenti non limitano la colonna d'aria, che sostiene il mercurio, o gli altri liquori, ma ch'ella prende il suo peso dall'atmosfera, con la quale comunica per le finestre, o per le porte.

Venghiamo adesso alle prove della resistenza, che fa l'aria di giù in su.

X. E S P E R I E N Z A.

P R E P A R A Z I O N E.

Riempiasi d'acqua il cannone di vetro rappresentato dalla *Figura 32.* coprasi con un pezzo di carta, che tocchi bene gli orli: mettasì la mano sopra, e si rovesci il vase in una situazione perpendicolare all'Orizzonte.

E F F E T T I.

Quando si leva via la mano che tiene il pezzo di carta applicato alla bocca del vase, l'acqua rimane costantemente sospesa, e la carta che serve di base vi resta attaccata.

S P I E G A Z I O N I.

L'acqua contenuta nel vase non può discendere e sfuggirsene, se non ricalcando e sospingendo una colonna d'aria DE, appoggiata contro terra, o contro il suolo, ma questa colonna non può rifluire lateralmente, perchè è sostenuta da tutti i lati dall'atmosfera medesima, il cui peso

228 LEZIONI DI FISICA

sarebbe capace di portare una massa d'acqua , che avesse 32. piedi d'altezza ; così la resistenza della colonna DE, che regge e sostiene alle colonne vicine , è più che bastante per impedire la caduta dell'acqua fuori del vase.

Il pezzo di carta in questa Esperienza non serve , che ad ovviare alla division de' due fluidi , che stenterebbono a contenersi , a cagione della grande differenza delle loro densità. Quando l'aria e l'acqua si toccano per basi men larghe , quest'avvertenza è inutile , come si è potuto osservare nelle precedenti Esperienze .

APPLICAZIONI.

Qui si può richiamare all'esame la fontana intermittente, della quale ci siamo serviti per provare la resistenza * de' corpi col mezzo di quella dell'aria ; e si scoprirà facilmente , donde se venga l'intermittenza del suo scolo . Imperocchè , fin tanto che il canale , che porta l'aria nel serbatoio , è otturato abbasso , l'aria che corrisponde all'orificio de' canaletti diretti verso la conca , è più forte di quel che fa di mestieri per fermar la caduta dell'acqua , il cui peso non può avere il suo effetto , se non quando ella è tra due arie d'egual forza ; e questo avviene ogni volta che l'acqua della conca essendo scorsa , l'apertura inferiore del canale resta scoperta . Nel luogo citato abbiain fatto parola ancora d'una spezie di tromba , o di canna corpacciuta , che praticasi nelle officine per attigner l'acqua , che mettesi a rinfrescare in gran fiaschi di stagno . I liquori re-

* I. Lezion. Sez. III. Esper. II.

S P E R I M E N T A L E. 229

restano ancora sospesi in cotesto istrumento, per la resistenza dell'aria da giù in su, che ha sempre il suo effetto, quando si ottura col dito l'orificio superiore, per impedire che l'aria, la qual vi corrisponde, non unisca il suo peso a quello del liquore.

XI. E S P E R I E N Z A.

P R E P A R A Z I O N E,

FGHI, Fig. 33., è un tubo di vetro ritorto, che ha una gamba più lunga dell'altra, e che *sifone* si noma: immergesi la gamba più corta in un vase pieno d'acqua, ed applicando in I la bocca, od una picciola tromba, si succhia l'aria ch'egli contiene.

E F F E T T I.

Col fucchiare che si fa in I, il sifone s'empie d'acqua, e dacchè si stacca la bocca dal sifone, comincia un effluvio, il quale continua, finchè vi è della acqua nel vase.

S P I E G A Z I O N I.

L'acqua del vase essendo premuta in tutta la sua superficie, dal peso dell'atmosfera, deve scorrer fuori per quella parte, dov'ella cessa di provare la medesima pressione: laonde ella riempie tutto il sifone, subito che se ne succhia l'aria, e che si sospende la sua azione in F. Se le due gambe fossero eguali, come FG, GH, dopo il

P 3

fucchia-

230 LEZIONI DI FISICA

facchiamento non vi sarebbe effluvio di liquore, perchè la colonna d'aria che resisterebbe in H , essendo così alta come quella che preme in F , le farebbe equilibrio, e l'acqua ricaderebbe per il suo proprio peso. Ma quando l'una delle due gambe ha il suo orifizio al di sotto della superficie del vase, come $G I$, quantunque la colonna d'aria che le corrisponde, sia più lunga di quella che pesa in F , non è in istato d'impedire lo scorrimento dell'acqua.

Per ben cogliere la ragione di ciò, bisogna considerare la colonna totale d'aria IK , come divisa in due parti, una delle quali KH , fa equilibrio a LF , e sarebbe capace di fermar l'acqua se il tubo finisse in H : L'acqua che riempie la parte HI del sifone, non trova dunque altra resistenza in I , che una colonna d'aria della medesima sua lunghezza, e che pesa molto meno. Questa porzione d'acqua scorre dunque per l'eccesso del suo peso: ma nel mentre ch'ella cade, nulla sostiene quella ch'è al di sopra: perciò ella è di continuo supplita, e ne viene sempre in luogo della prima: così l'effluvio segue, non perchè l'aria non resiste, ma perchè ad altezza eguale, l'acqua pesa più dell'aria. E per quest'ultima ragione, la resistenza dell'aria in I , ch'è sempre vinta, tanto più lo è, quanto la parte HI del tubo è più lunga; la pression in A diviene tanto più forte; e ciò evidentemente si vede dalla seguente Esperienza.

XII. E S P E R I E N Z A .

P R E P A R A Z I O N E .

A B, *Figura 34.*, è un grosso tubo di vetro, di circa pollici 15 di lunghezza, chiuso in B, e guernito in A d'una staffetta di metallo, con un fondo, a cui sono ben attaccati e saldati due tubi che possono avere interiormente 2 linee $\frac{1}{2}$ di diametro. Il più corto di essi, il quale fa gomitto, si solleva 2 o 3 pollici in forma di coperchi bucati nel cannone grosso; l'altro più lungo, aperto pure da i due capi, non eccede il fondo al quale è saldato, ma si divide in due parti, che possono separarsi in D, e riunirsi a vite. Si rovescia quest'istrumento; affine di farvi scorrere per lo tubo più lungo alcuni pollici d'acqua; quindi rimettesi nella sua situazione naturale, e nello stesso momento s'immerge la gamba che fa gomitto in un vase pieno d'acqua.

E F F E T T I .

Subito l'acqua scorre fuori per la gamba più lunga, e scorgeasi un getto d'acqua nel grosso cannone; ma questo getto, molto più alto sollevasi, quando il tubo, per ove si fa l'effluvio, è composto delle sue due parti, che quando se ne leva via una.

S P I E G A Z I O N I.

I due piccioli tubi, ed il cannone grosso, a cui metton capo, devono essere considerati come un sifone, l'acqua che ascende per la gamba più corta, e che slanciafi fuor della sua estremità, è alzata dal peso dell'aria, che opera su la superficie del vafe; e poichè quello slancio dell'acqua è tanto più grande, quanto l'altra gamba è più lunga, quest'è segno certo, che la pressione che lo cagiona, cresce a proporzione di quest'allungamento, come abbiain detto di sopra.

A P P L I C A Z I O N I.

Il sifone, che abbiain poc' anzi adoperato, può essere fatto in tal maniera, che il corpo o catino, ed i rami sieno appiattati in un piedistallo, o in altra guisa; ed allora ne proviene un getto d'acqua sopra della sua sorgente. Vedi la *Figura 35.*

Generalmente i sifoni sono molto in uso nelle cantine, ne' laboratorj Chimici, nelle officine ec. per attignere i liquori a chiaro e più limpidi: poichè questo istrumento li attrae per la superficie, senza essere obbligati di agitare i vasi, il mezzo è sicuro per attingere senza feccia i vini, i rosolj ec.

La figura e la materia del tubo, niun cambiamento apportano all'effetto del sifone. Se trovasi in una montagna una vena di sabbia, che abbia la forma di quest'istrumento, e che sia racchiusa tra la ghiaia, o in qualche altra materia men atra
a fil-

a filtrar l'acqua; questo sifone naturale esaurirà una cavità piena d'acqua, a cui corrisponderà la sua gamba più corta, e se gli scoli dell'acqua, che ne somministrano al serbatoio, od alla doccia, si faranno più lentamente che la sua evacuazione, l'estremità della gamba più lunga sarà una sorgente, od una fontana naturalmente intermittente e periodica.

Il bicchiere a sifone, rappresentato colla *Figura 36.* renderà sensibile quest'idea. La coppa d'esso bicchiere, che s'empie d'acqua, può rappresentare la cavità, che noi supponiamo nella montagna: il tubo ritorto, la cui gamba più lunga passa a traverso del piede, cagiona un'evacuazione, che comincia subito che l'acqua è arrivata al di sopra della curvatura del tubo, e che, finita ch'ella è, non ricomincia se non quando il bicchiere sia di nuovo riempito.


Forza è confessare, che per dedurre da questa Esperienza una compiuta spiegazione delle sorgenti periodiche, suppor si dee un esaurimento perfetto nella cavità che serve di ricettacolo o di conserva: imperocchè l'effluvio del nostro bicchiere a sifone, cominciato che ha una volta, non finirebbe, se si avvertisse di mantener dell'acqua nel vase; e si durerà fatica a concepire, che la sorgente che fassi all'estremità del ramo più lungo del sifone, possa avere delle intermittenze, se gli scoli che somministrano dell'acqua al ramo più curto, non ne hanno. Ma queste sorte d'effetti naturali hanno per ordinario più cagioni a un tratto, ed è sempre un vantaggio poterne indicare qualcuna.


Siccome i liquori debbono ascendere nella gam-
ba

234 LEZIONI DI FISICA

ba più corta del sifone, prima che scorrere fuora per la più lunga, ed ivi sono elevati dal peso dell'aria che opera sulla doccia, haffia a regolare l'altezza di questa parte del tubo, secondo il peso attuale dell'atmosfera, e la densità del liquore, cui dee contenere. Imperocchè, secondo quello che abbiamo insegnato intorno alle trombe aspiranti, l'acqua comune non si solleverebbe in un sifone, al di là di 32 piedi, nè il mercurio al di là di 27 o 28. pollici; oltrechè non bisognerebbe, che il uogo dell'Esperienza fosse molto elevato sopra l'ivello del mare.

Questa riflessione m'ha fatto pensare, che si potrebbe facilmente comparare assieme, ed in poco tempo, le densità di due liquori, col mezzo di un sifone aperto nella sua curvatura, e a cui fosse proposta una picciola tromba aspirante, siccome rappresenta la Fig. 37. Imperocchè, essendo quest'istrumento attaccato sopra una tavola divisa in gradi, a pollici e linee, se i rami sono immersi egualmente in due vasetti, l'uno de'quali, per esempio, contenga del mercurio, e l'altro dell'acqua, rarefacendo l'aria de'tubi col mezzo della piccola tromba, ciascun liquore ubbidirà alla pressione dell'aria esterna, ch'è ad ambedue comune, secondo la misura o proporzione della sua densità; se il mercurio si solleverà 1 pollice, l'acqua ascenderà al 14. Ma se si facesse uso di questo istrumento, bisognerebbe che i tubi da una parte e dall'altra, avessero almeno 3 o 4 linee di diametro interamente. Ne diremo la ragione in fine della Lezione che segue.





SPERIMENTALE.

LEZIONE OTTAVA.

Si continua a ragionare dell' Idrostatica.

III. SEZIONE.

Della Gravità e dell' Equilibrio de' Solidi,
immersi ne' liquori.

QUando un corpo solido è immerso, occupa il luogo d' un volume di liquore eguale al suo; quando egli non fosse una qualche materia spugnosa, la quale ammette una porzione del liquore ne' suoi pori, o pure un corpo dissolubile, le cui parti disunte possono allungarsi ne' pori medesimi del dissolvente. Imperocchè, in questi due casi, i volumi, o le grandezze apparenti così del solido, come del liquore, si confondono un poco; e quando sono mescolati, accade per lo più, che occupino men di luogo, che non ne facea d' uopo per contenerli separatamente: un vase, d' esempigrazia, la di cui capacità eguagliasse due sestari, non farebbe pieno, se vi si mettesse un sestario d' acqua, ed una pari misura di zucchero in polvere, o di pezzi di spugna. Noi non ci proponiamo adesso di esaminare queste sorte di effetti: consideriamo bensì i corpi immersi, come

me interi e impenetrabili a que' fluidi che li ricevono; tal'è una palla d'avorio, che si cala nell'acqua, e che fa che l'acqua si sollevi verso gli orli del vafe, dov'è contenuta.

Quel volume di liquore smosso del suo luogo dal corpo immerso, o sia la quantità che sollevasi al di sopra del piano, nel quale s'era fermata la superficie del liquore avanti l'immersione; quel volume, dico, pesa più o meno secondo la sua densità: imperocchè i fluidi, siccome anco i solidi, varian fra essi, per la quantità di materia propria, che racchiudono sotto un certo volume; ed il medesimo liquore non è sempre ugualmente denso.

Si può far quì due supposizioni: 1. Che il volume di liquore di cui trattasi, eguagli in densità, e per conseguenza nel peso, il corpo solido che ha pigliato il suo luogo: 2. ovvero che l'un de' due pesi più che l'altro. Chiameremo *gravità rispettiva*, la quantità di che il più pesante supererà il più leggiero; di maniera che, se un volume d'acqua pesante una lira, è smosso da un solido che pesa una lira $\frac{1}{2}$, la gravità rispettiva di questo, sarà una mezza lira.

PRIMA PROPOSIZIONE.

Un corpo solido immerso, è compresso da tutti i lati dal liquore che lo attornia; e la pressione ch'egli prova, è tanto più grande, quanto il liquore ha più densità, e quanto il corpo è più profondamente immerso.

Nella

S P E R I M E N T A L E. 237

Nella prima Sezione della Lezion precedente, noi abbiain fatto vedere, che il peso de' liquori s' esercita per tutti i versi. Abbiamo inoltre provato, che questa pressione cresce in ragione dell' altezza del liquido; e finalmente, nella seconda Sezione è stato dimostrato, che vi è equilibrio tra due liquori, le cui altezze sono in ragione reciproca delle lor densità, o gravità specifiche. La proposizione che quì abbiain recata, è una conseguenza delle teste annoverate: dalla prima egli ne segue, che *un corpo immerso, è compresso da tutte le parti*. Dalla seconda ne segue, che *la pressione ch'egli prova, è tanto maggiore, quanto è più profondamente immerso*. E dalla terza finalmente segue; che *date eguali profondità, il carico è tanto più grande, quanto il fluido ha più di densità, o di gravità*.

PRIMA ESPERIENZA.

P R E P A R A Z I O N E.

La Fig. 1. rappresenta un gran vase di vetro pieno d'acqua chiara, nella quale immergesi una vescichetta piena d'acqua colorata, e legata ad un tubo, il quale è aperto ne' due capi.

E F F E T T I.

Quando la vescica è intieramente immersa, d'acqua colorata comincia a salire nel tubo, e vi si solleva sempre più, a misura che ella vi s'immerge

merge più addentro, di maniera che ella è sempre così alta, come la superficie dell'acqua contenuta nel gran vase.

S P I E G A Z I O N E

L'acqua colorata, che si solleva nel tubo nel tempo dell'immersione, prova incontestabilmente, che la vescica è compressa, e che il suo volume è diminuito: quando si vede quest'effetto crescere a misura ch'ella più addentro s'immerge; forza è confessare che la pressione dell'acqua che n'è la cagione, cresce anch'essa; e come non ha ella a crescere, se il corpo immerso si trova allora caricato di colonne più alte, e che hanno sempre, o con pochissimo s'vario, basi egualmente larghe? Dico, con pochissimo s'vario; imperocchè la compressione diminuisce il volume totale della vescica, e la sua superficie non è così grande nel fondo del vase, come ella lo è a fior d'acqua.

L'acqua colorata sollevasi nel tubo, a misura, che egli s'avvicina verso il fondo, ma non eccede mai la superficie dell'acqua del gran vase; perchè essendo i due liquori della medesima densità, quando mettonsi in equilibrio, debbono le loro altezze essere eguali. Così non farebbe, se la vescica in luogo d'acqua, contenesse spirito di vino, o mercurio; l'ultimo di questi due fluidi terrebbe più basso che l'acqua del vase; e l'altro s'innalzerebbe un poco al di sopra.

Quando si adopera una vescica alquanto grossa, s'osserverà, che la compressione ch'ella prova, non è eguale da tutte le parti, e ch'ella è più pre-

S P E R I M E N T A L E . 239

premuta di giù in su, che lateralmente; imperocchè la sua figura si muta, e viene ella un poco a schiacciarsi. Quantunque la refrazione della luce cambj l'immagine dell'oggetto in simil caso, deesi concedere che in una tale apparenza, qualche cosa vi sia di reale, se si pon mente che le colonne d'acqua corrispondenti alla parte inferiore della vescica, sono più lunghe e più pesanti, che quelle che circondano i suoi lati, e che la flessibilità di questo corpo lo rende idoneo a soggiacere all'effetto di tali differenze.

A P P L I C A Z I O N I .

Tutti gli animali, che appartengono alla terra, vivono o nell'aria, o nell'acqua; per conseguenza ciascuno d'essi è esposto alla pressione d'un fluido, che lo attornia da tutte le parti, e che ha un peso od un carico notabile, se si riguarda alla sua altezza. Una colonna dell'atmosfera equivale, come l'abbiam precedentemente veduto, ad una colonna d'acqua di simil base, che avesse 32 piedi d'altezza. Se per esempio tal colonna è un cilindro d'un pollice di diametro, il peso n'è considerabilissimo; ma quante basi somiglianti o quanti cerchi d'un pollice di larghezza avrebbono da contare sopra la superficie intera d'un uomo? Applicando il calcolo a questa considerazione, trovasi, che una persona di mezzana statura corrisponde ad una massa d'aria, che eccede il peso di 20000.

Ma un pesce nel fondo d'un fiume o d'un lago, sostiene non solamente la pression dell'aria, come gli animali terrestri, ma ancor quella dell'

ac-

240 LEZIONI DI FISICA

acqua, in guisa che s'egli sta 32 piedi a fondo, è caricato di due volte il peso dell'atmosfera. Qual sarebbe dunque la pressione, fatta sopra d'un animale, il quale vivesse in fondo del mare?

Questi pesi enormi, applicati continuamente alla superficie de' corpi, non li distruggono tuttavia, perchè, come la vescica della premessa Esperienza, sono interiormente sostenuti dal medesimo fluido che li circonda. Noi respiriamo la medesima aria, che ci comprime al di fuori: ed i pesci sono nel medesimo caso, in riguardo all'acqua; imperocchè se respirano dell'aria con l'acqua, quest'aria avanti che passi nel loro corpo, è in equilibrio, mercè della sua elasticità, con la pressione del fluido, di cui è caricata. Il moto del petto nel tempo della respirazione, non è libero se non in quanto vi ha equilibrio tra l'aria esterna e quella di dentro; ogni accidente, che rendesse questa più debole o più forte, farebbe sì che si respirasse con difficoltà.

Non solamente la pressione esteriore de' fluidi non distrugge i corpi sopra i quali ell'adopera; ma li conserva al contrario nella lor forma naturale, a cagione della sua egualità; ella contribuisce bene spesso alla coerenza delle loro parti, e ferma in parecchie il progresso della fermentazione, o della corruzione, che tende a dissiparli. Possiam di ciò rinvenir le prove, senza partirsi dal genere animale. Quando si applica una ventosa, operazione le molte fiate più dolorosa che salutare, e che in Francia è andata in disuso, si solleva un tumore nella parte carnosa del corpo, su cui si fa cessar la pressione dell'aria, ap-
pli-

SPERIMENTALE. 241

plilandovi una piccola tromba, od una piccola campana di vetro, nella quale si accende un po di stoppa per rarefar l'aria. Cotesta elevazione della pelle è causata dall'afflusso del sangue e degli altri fluidi, che essendo per tutt'altro luogo più compressi, si portano al sito dove è minor la pressione.

Per una sospensione eziandio del peso dell'aria, simile a un dipresso alla descritta, gli animali appena nati traggono il latte dalle mammelle delle loro nutrici essendo tutta la parte ove la natura ha raccolto quest' alimento, compressa come il resto del corpo, eccettuato il luogo che si succhia, si fa uno scolo, siccome avverrebbe, se restando il capezzolo esposto alla pressione dell'aria, il rimanente fosse più compresso che al solito. E' dunque manifestò da questi esempi, che la pressione eguale dei fluidi ambientali, e la resistenza ch'eglino fanno interiormente, contiene i corpi nel loro stato naturale, e ch'ella è necessaria a tal effetto.

E' tuttavia da presumere, che l'equilibrio delle due pressioni, l'interna e l'esterna, non basterebbe sempre per conservare l'economia animale nel suo intiero tuono. Vi sarebbe senza dubbio un qualche grado di compressione, che la sconcerterebbe. Supponiamo, per esempio, che la vescica della nostra Esperienza, in luogo d'essere una membrana sottile e solida sia una sostanza lassa, e spongiosa; certo è, ch'essendo ella ben addentro tuffata nell'acqua, la sua grossezza sarebbe molto premuta da un canto e dall'altro, che le sue fibre si ravvicinerebbono, e ch'ene verrebbe cambiato l'ordine. Così un animale,

Tomo II.

Q

che

che se ne sta a suo comodo nel proprio naturale elemento, patirebbe, se la pressione alla quale è avvezzo, s' accrescesse notabilmente, benchè egualmente crescesse tanto al didentro quanto al di fuori.

Sarebbe forse questa ragione principale, per cui non possono i palombari rimaner sott' acqua lungo tempo, in profondità grandi? Imperocchè si fanno essi calare a fondo in una grande campana piena d' aria, la qual aria s' ha il secreto di rinovare, dacchè s' è conosciuto che questo era necessario per respirare senza pericolo e liberamente. Tuttavolta ad onta delle cautele che fin' ora si son sapute usare, vedesi che un uomo il quale si espone nella detta macchina, ivi quasi sempre si trova in uno stato violento, e bene spesso si è veduto uscirne fuora cogli occhi gonfi, e con uscita di sangue dal naso e dalle orecchie; di maniera che questa invenzione provata in differenti paesi, e in molte guise, non ha per anche avuto gran successo. La ragione si è, perche non basta provvedere il palombaro di aria nuova; bisognerebbe che quest' aria non fosse molto differente dalla sua ordinaria densità; lo che non par praticabile sotto un volume di acqua non picciolo, di cui dee' necessariamente sopportar la pressione. La più bella prova di questo genere, che sia stata fatta, si è quella del Sig. Halley, che restò sott' acqua più d' un ora, senza patirne incomodo; ma la sua campana non fu immersa a maggior profondità di 54 piedi Francesi, il che non basterebbe in molte occasioni; oltre di che ella era assai grande, e se questa condizione era necessaria per l' esito ch' ella sortì, come si può cre-

S P E R I M E N T A L E. 243

crederlo, non si potrebbe se non di rare servirsene; e in casi d'una grande importanza, a cagione delle grandi spese, e degl'impacci che sono inevitabili nell'uso d'una tal macchina.

II. P R O P O S I Z I O N E.

Se il corpo immerso è più pesante, che il volume di liquore, ch'egli ha mosso di luogo, la sua gravità rispettiva lo fa cadere al fondo del vaso, se ha libertà per ubbidirgli.

I I. E S P E R I E N Z A.

P R E P A R A Z I O N E.

L'istrumento rappresentato nella *Figura 2.* è una bilancia idrostatica, che ha per base una cassa foderata di piombo. I tre vasi di vetro A, B, C, si regono e fermano a vite su' loro piedi i quali son cavi, e comunicano con un canale nascosto sotto il coperchio della cassa. Questo canale è corredato di tre chiavette, o fori di comunicazione, due alle estremità che si vedono in D, e in E; ed altre due in F ed in G. Questi ultimi due fori aprono, disserrandosi colle lor Chiavi, comunicazione fra li tre vasi, di maniera che quello ch'è nel mezzo essendo pieno d'acqua od altro liquore, quei de' fianchi insieme, o l'un senza l'altro, possono empirsi per il fondo: i due fori D, E, servono ad evacuare nella cassa, i vasi laterali; ed anche quello di mezzo, se le comunicazioni sono aperte. Il capitello del vaso grande porta uno stilo di bilancia, con due

244 LEZIONI DI FISICA

piccioli bacini, che si possono levare quando bisogna, e sotto i quali stanno due uncinetti che girano, *b*, *k*, ai quali s'appendonfi i corpi che un vuol pesare ne' vasi laterali, ai quali corrispondono.

Quest'istrumento fornito di tutti i pezzi che ne dipendono, s'adopera commodamente, e senza causare immondezze, per far tutte le sperienze, che riferisconsi a quest'ultima parte dell'idrostatica. Ma per non ripetere più volte la medesima figura, non riferiremo per cadauna esperienza se non le cose necessarie al fatto che si laverà tra mani, supponendo il resto, come poc'anzi si è da noi descritto.

Per la prova della nostra seconda Proposizione, essendo il vaso *B* quasi pieno d'acqua, vi si tuffa una picciola palla d'avorio, sospesa per un filo al braccio della bilancia. Vedi la *Fig. 3.*

E F F E T T I.

1. Se non si mette niente nella bacinetta opposta a quella che sostiene la palla sospesa, questa palla cade al fondo del vase.

2. Se si carica la bacinetta opposta per tener la palla in equilibrio nell'acqua, il peso che a tal uopo s'impiega, è sempre molto minore, che quello della palla pesata nell'aria.

S P I E G A Z I O N I.

La palla d'avorio della nostra Esperienza, tien luogo d'un volume d'acqua, il quale, se ci fosse, sarebbe perfettamente in equilibrio con tutte le

le parti simili della medesima massa, fluida, secondo la quarta proposizione della prima Sezione; cotesto volume non potrebbe nè smuovere o trasportare col suo peso quello di sotto, nè essere smosso o trasportato da quello di sopra, perchè questi non avrebbe maggior forza ch'esso per andare a fondo, e quegli n' avrebbe tanta quanta esso pot resistere alla sua caduta; ma quando in luogo suo vi è un corpo più denso o più pesante, il volume d'acqua ch'è di sotto, deve cedere, non già a tutto il suo peso, ma all'eccesso, ch'egli ha sopra di lui; laonde per impedire che la palla immersa non cada al fondo, non è bisogno di mettere nel bacino opposto un peso che sia eguale al suo, ma solamente una quantità, che pareggi quella, della quale l'avorio supera un egual volume d'acqua.

Non occor immaginarsi, che un corpo il quale affonda sott'acqua, cresca nel peso per l'aumento della colonna ch'egli lascia sopra di sé. Imperocchè il peso di questa colonna è sempre contrabilanciato dalla resistenza di quella ch'è di sotto; e questa resistenza è sostenuta dalla pressione delle colonne vicine, che pareggiano in altezza quella che pesa sul corpo immerso. Questi è dunque sempre in equilibrio, rispetto alle due pressioni di sopra e di sotto; e s'egli cade, ciò è, perchè ha, in virtù d'una maggior quantità di materia, la forza di smuovere di luogo continuamente una quantità di liquori che non gli è eguale se non nel volume.

L'accelerazione, che si osserva nella caduta de' gravi, non può dunque essere attribuita come hanno pretelo alcuni Filosofi al fluido, la cui

246 LEZIONI DI FISICA

altezza si aumenta al di sopra di essi, secondo che cadono; oltre a che, quest' aumentazione di altezza dalla parte del fluido, non corrisponde a' progressi dell' accelerazione de' corpi, che ubbidiscono alla loro gravità, nè alla natura della gravità, che affetta, i corpi in ragione della loro massa, e non in ragione del loro volume.

CONSEGUENZA.

Segue dalla proposizione, fin ora provata, che un corpo, qualunque egli sia, non cade, o non tende mai a cadere con tutta l' intensione della sua gravità assoluta; imperocchè in qualunque luogo che succeda la sua caduta, egli è sempre immerso in un mezzo materiale, di cui smove e trapianta un volume simile al suo; e però, siccome alla palla d' avorio della nostra Esperienza, non gli resta, per gire dall' alto al basso, fuorchè la sua gravità rispettiva: le gocce di pioggia, i grani di tempesta, i fiocchi di neve, non discendono verso la superficie della terra, se non in quanto eccedono nel peso la quantità d' aria, di cui occupano il luogo. Essendo l' aria un fluido molto leggiero, la gravità rispettiva dei corpi ch' ella circonda da tutte le parti, poco differisce dalla loro gravità assoluta: tuttavolta se ne scorge la differenza, allorchè si pesa un medesimo corpo successivamente nell' aria e nel vuoto, come nell' Esperienza seguente.

III. ES.

III. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Dispongasi in un largo recipiente una bilancia mobile e giustissima, in così fatta guisa, che si possa sollevarne l'asta con tirare l'ansa o manico 1. Fig. 3. Prima di fare il vacuo con la macchina pneumatica, convien aver messa in equilibrio una picciola palla di piombo da una parte e dall'altra una grossa palla cava di carta, ed avvertire che questi due corpi non posino sopra niente d'umido odì grasso, che possa impedire gli effetti naturali della gravità, quando si leva la bilancia.

EFFETTI.

La palla di carta, che nell'aria era in perfetto equilibrio col piombo, trovasi più pesante di esso nel vacuo.

SPIEGAZIONE.

La palla di carta nell'aria, ha solamente la sua gravità rispettiva da opporre al piombo; nel vuoto ella gode della sua gravità assoluta, non essendo sensibilmente sostenuta da alcun fluido. Ora la gravità assoluta è sempre maggiore che la gravità rispettiva, poichè questa è solo un residuo di quella. Si può rispondere, che il piombo nel vuoto ritorna anch'egli alla sua gravità assoluta; ma vedrassi fra poco (e si potrebbe già

248. LEZIONI DI FISICA

scorgerlo in qualche modo) che quando i volumi in equilibrio differiscono fra essi, come quei che abbiamo adoperati, quello che ricuperano della lor gravità, quando cessano d'essere immersi, non è eguale da una parte e dall'altra.

APPLICAZIONI.

Se l'immersione riduce i corpi ad una gravità rispettiva, sempre minore che la loro gravità assoluta, le forze che li sostengono, non hanno più bisogno d'essere tanto grandi, quanto esser dovrebbero, se non fossero immersi. Perciò ben si scorge questa differenza, allorchè si trae fuori dell'acqua qualche massa d'un volume considerabile. I pescatori, che hanno ben empiuta la rete, non temono di romperla, se non quando la sollevano dall'acqua nell'aria; si salva senza fatica una persona, ch'è in pericolo d'annegarsi, quando si può afferrarla per la parte anche più fragile delle sue vestimenta, un aiuto simile non basterebbe ad uno, che fosse in atto di cadere per una finestra: la ragione si è, perchè un uomo nell'acqua, non ha talor più d'una libra o due di gravità rispettiva, e n'ha bene speso più di 130, nell'aria.

III. PROPOSIZIONE.

Quello che un solido immerso perde del suo peso, è uguale al peso del volume di liquore trasportato dal suo luogo.

Abbiamo veduto dalle prove della proposizione antecedente, che un corpo immerso perde una par-

SPERIMENTALE. 249

parte del suo peso, durante l'immersione: con questa vogliamo dar a conoscere qual sia questa quantità del suo peso, che gli manca mentre egli è immerso; e secondo il nostro asserito, se il volume di liquore trasportato dal suo luogo, e sospinto pesa due oncie, ed il corpo immerso ne pesa quattro, questi perde la metà del suo peso; e la forza che s'impiegherà, per impedire ch'ei non cada al fondo del vase, non averà più da sostenere se non due oncie.

IV. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

L, Fig. 2. è un piccolo cilindro solido di metallo, capace di puntualmente riempire il picciolo vaso M, sotto l'quale è sospeso. Attaccasi tutto, e mettesi in equilibrio col peso N all'asta della bilancia, e si fa venir dell'acqua nel vase A, fin che il piccolo cilindro sia interamente immerso.

EFFETTI.

Con l'immersione del corpo L, il peso N diventa troppo pesante, e l'equilibrio cessa; ma si rimette, dacchè riempiesi d'acqua il picciol vaso M.

SPIEGAZIONI.

Il piccolo cilindro, dacchè è immerso, diventa troppo leggiero, perchè l'immersione gli toglie

250 LEZIONI DI FISICA

glie una parte del suo peso; ma come quella quantità che gli manca è eguale nel peso al volume d'acqua dasè trasportato, o smosso di luogo, l'equilibrio si rimette, quando si carica il braccio della bilancia con una quantità d'acqua, che ha la stessa grandezza che il corpo immerso. Questa proposizione, così da noi provata, ha molte conseguenze, che qui dedurremo.

PRIMA CONSEGUENZA.

Poichè il volume di liquore trasportato di luogo, misura la quantità che il corpo immerso perde del suo peso, segue, che, date eguali quantità di materia, quanto più grandi sono i corpi, tanto più perdono del loro peso con l'immersione. Una lira d'avorio sarebbe dunque più sostenuta nell'acqua, che una lira di marmo, la gravità rispettiva sarebbe differente in entrambi, quantunque queste due materie fossero immerse nel medesimo fluido.

V. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Mettete in equilibrio nelle braccia della bilancia una palla d'avorio, ed una palla di piombo e fate venir l'acqua nei due vasi, ai quali detti due corpi corrispondono, *Fig. 4.*

EP.

S P E R I M E N T A L E. 251

E F F E T T I.

Subito che vi è tant' acqua ne' vasi, che basta per sommergere le due palle, l'asta della bilancia non può più rimanere in una situazione orizzontale, il piombo traporta l'avorio.

S P I E G A Z I O N E.

Ciascuno di questi due corpi perde una parte del suo peso nell' acqua; ma queste quantità perdute sono ineguali fra esse; imperocchè sono proporzionali ai volumi d' acqua traportati di luogo e il piombo ne traporta meno che l'avorio: questi perde dunque più che l'altro del suo primo peso, il che rompe l'equilibrio.

A P P L I C A Z I O N I.

Il piombo, il ferro fuso, il rame sono le materie, comunemente praticate, per far pesi di bilancia. Questi metalli hanno per ordinario molto meno di volume, che i corpi coi quali si mettono in equilibrio; ma per fare quest'equilibrio nell'aria, ove si pesano sempre le mercanzie, bisogna supplire con una maggior quantità, all'inegualità della perdita che fanno due corpi pesati nel medesimo fluido, quando le loro grandezze sono ineguali; così il mercante dà più di una lira di piuma, quando la pesa a rincontro d' una lira di piombo: imperocchè queste due materie nell'aria non hanno se non la lor gravità rispet.

rispettiva, vale a dire, che cotesto fluido toglie loro una parte della lor gravità assoluta, e ne toglie più a quella delle due, che ha più volume; di maniera che se si riportasse la bilancia carica nel vuoto, bisognerebbe necessariamente levar via della piuma, per conservar l'equilibrio. Il mercante dunque s'avantaggia, se riduce al più picciol volume che è possibile, quello che egli vende a peso: e se le materie preziose, come il diamante, si pesassero sotto volumi, che portasse la spesa di considerare, come grandi, più si guadagnerebbe a venderle al peso di ferro, che al peso d'oro o di piombo, particolarmente quando l'aria nella qual fosse la bilancia, diventasse più densa.

II. CONSEGUENZA

Segue in oltre dalla terza proposizione, che quanto più il volume di liquore mosso e sospinto è materiale, tanto più il corpo immerso vien sostenuto: così la gravità rispettiva d'un medesimo corpo dopo l'immersione, debb'essere tanto maggiore, quanto il liquore è men denso.

VI. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Tengonsi in equilibrio su le braccia della bilancia due picciole palle d'avorio eguali in grossezza; empionsi d'acqua i due vasi ai quali elle-

S P E R I M E N T A L E . 253

no corrispondono; quindi vuotato uno delli due, si sostituìce all'acqua ch'ei conteneva, dell'acquavite, o dello spirito di vino, *Figura 5.*

E F F E T T I .

1. Finchè i due vasi sono pieni del medesimo fluido (d'aria, o d'acqua,) l'equilibrio sussiste tra le due picciole palle immerse;
2. Quando una di esse si ruffa nell'acqua, e l'altra nello spirito di vino, o nell'acquavite, questa trasporta la prima.

S P I E G A Z I O N I .

I volumi di liquori smossi e sospinti dal loro luogo, sendo misurati da corpi d'eguali grandezze, e questi volumi essendo presi nel medesimo liquore, sono perfettamente simili tra essi, avutosi riguardo alle loro quantità di materia, e per conseguenza resistono egualmente ai corpi immersi che hanno da sostenere; e però che queste due palle hanno gravitadi assolute, molto eguali fra loro, la lor immersione nella stess'acqua toglie quantitati eguali a quantitati eguali, i residui sono eguali, e l'equilibrio sussiste. Ma quando l'una delle due palle è immersa in un liquore meno denso dell'acqua, ella è men sostenuta, perde meno del suo primo peso, la sua gravità rispettiva è più grande; e la vince su l'altra.

III. CONSEGUENZA

Essendo che la densità è più o men grande, non solo in fluidi differenti, ma nel medesimo fluido ancora, in cui ella variar può per lo freddo, per lo caldo, o d'altra guisa; ed alle stesse variazioni essendo soggetti i solidi che s'immergono: avvenir può che la gravità rispettiva d'un medesimo corpo varj, quantunque nel medesimo liquore.

VII. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

La *Figura 6.* rappresenta una piccola caraffa di vetro piena di spirito di vino, e dentro la quale s'è chiusa una figurina di smalto, che ordinariamente sta sollevata, perchè è più leggiera d'un simil volume del liquore nel quale si sta: la caraffa mette capo in un bagno maria, che fassi riscaldare, col mezzo d'una lampanetta accesa di sotto.

E F F E T T I.

Quando lo spirito di vino ha ricevuto un certo grado di calore, vedesi discendere la piccola figura al fondo della caraffa, e quando il liquore è raffreddato ella rimonta.

S P I E G A Z I O N E .

Il calore dilata tutti i corpi , come lo farem vedere , parlando dell' azione del fuoco . Lo spirito di vino , che s' è scaldato , è dunque meno denso , di quel che fosse , essendo più freddo . Ma se la massa totale di questo liquore occupa uno spazio più grande di prima , bisogna che le sue parti sieno più rare , più scostate l' une dall' altre ; in somma meno di queste parti vi a nel volume misurato dalla figura di smalto ; e per conseguenza non è più capace di sostenerla ; va ella al fondo della caraffa , e vi resta , fin che le cose sono in questo stato ; ma quando lo spirito di vino si raffredda , le sue parti si ravvicinano , si condensano , ed il volume che corrisponde alla picciola figura , crescendo di materia , e di peso per conseguenza , diventa in istato di sostenerla e sollevarla . Vero è che il medesimo calore che dilata il liquore , dilata pure la figura di smalto ; ma la dilata meno , e questo basta per far nascere gli effetti , che abbiamo spiegati .

V I I I . E S P E R I E N Z A .

P R E P A R A Z I O N E .

Il vase rappresentato dalla Fig. 7. è una specie di lunga bottiglia di vetro , elevata sopra una zampa o base della stessa materia ; ell' è ripiena d' acqua , e se si vuole che l' inverno ella non si geli , vi si può mettere un terzo di spirito di vino , Otturasi con un pezzetto di vescica ammollata ,

236 LEZIONI DI FISICA

lata, la quale si distende su l'orifizio, e si ferma attorno del collo con un filo. In questa bottiglia, v'è una figurina cava di smalto, più leggiera che il liquore, e appie della quale s'è apposta fatto un piccol buco, quasi per passarvi un ago.

E F F E T T I.

1. Quando colla cima del dito si preme su la vescica, la figurina discende al fondo della bottiglia, ed ivi resta fin che la medesima pressione sussiste.

2. Se si preme un po men forte, o si cessa di premere, ella subito rimonta.

3. Se si modera la pressione, quando la figura è in istrada per discendere, stassene ella a quel segno che si vuole.

4. Se si preme la vescica, a maniera di scosse, la figura va saltarellando in giro, e volgendosi sopra se stessa.

Questi effetti sono i medesimi, quando si rovescia la bottiglia, e si fa la pressione di giù in su; quindi è che questa speienza si può altrui mostrare con cert'aria di mistero, schierando più rubi in un tetajo, e facendo la pressione necessaria sopra i loro orifizj; in una maniera nascosta agli occhj de' riguardanti, o per via di lieve che hanno corrispondenza o rimando, o per via di cordicelle nascoste nella grossezza del legno; o in altra guisa. Vedi la *Figura 8.*

SPIEGAZIONI.

I liquori e non si comprimono, o si comprimono difficilmente; come abbiamo insegnato nella seconda Lezione. L'aria al contrario è un fluido flessibile, e che si può comprimere con molta facilità; lo che proveremo altrove. La picciola figura cava di smalto è ripiena d'aria, ed è immersa nell'acqua. Ella è dunque piena d'una materia compressibile, e circondata da un'altra che non è tale. Quando si preme col dito sulla vescica, premesi tutta la massa dell'acqua ch'è nel vase, la colonna che corrisponde al forellino da noi mentovato, non potendo rientrare in sè stessa a cagione della sua inflessibilità, porta tutto lo sforzo ch'ella riceve dalla pressione, contro l'aria ch'è nella figura; e però che questo fluido lasciassi comprimere, e restringere in un minore spazio, egli cede all'acqua una parte di quello ch'egli occupa; allor la figura di smalto è più pesante di quel ch'ell'era, imperocchè la si dee considerare, come un composto di smalto, d'aria più condensata, e d'un poco d'acqua intramesa. Se il tutto insieme è più pesante che il volume d'acqua corrispondente, egli va al fondo rimonta al contrario, quand'è più leggiero, cioè, quando una minor pressione spinge meno d'acqua nella figura, o si lascia all'aria compressa la libertà di rispignere colla sua molla, quella ch'è entrata: e facilmente si capisce, che regolando col dito questa pressione, si ritien nella figura una quantità d'acqua tale, che il tutto insieme sta in equilibrio nella massa. Finalmente essendo il forelli-

258 LEZIONI DI FISICA

nò per ove può l'acqua entrare od uscire, fatto in una delle due gambe, cioè sul fianco di questo picciolo corpo immerso, se il fluido che vi passa, è spinto o rispinto con grande velocità, l'impulsione obliqua dee far girare la figura sopra se stessa; imperocchè essendo così sospesa nell'acqua, è lo stesso che se fosse mobile sopra due perni, o sopra un asse.

Questa figura diventa dunque ora più leggiera ora più pesante del liquore in cui è immersa, non perchè il volume d'acqua corrispondente muti densità, ma perchè il corpo immerso diventa egli medesimo alternativamente più denso, e più leggero di materia, senza cambiar volume,

APPLICAZIONI.

Siccome di tutti gli animali che respirano l'aria, alcuni stanno su la superficie della terra, ed altri sollevansi nell'atmosfera, ed ivi a lor talento si muovono; così quelli che abitano l'acque, ve n'ha quantità di spezie che non lasciano mai il fondo, e parecchie altre al contrario, che si sollevano da già in su, e che discendono con eguale facilità, quando il lor bisogno lo esige. Nella più parte di quest'ultimi ritrovasi una doppia vescica piena d'aria, che ci muove a credere che il pesce, con l'aiuto di questo fluido elastico, aumenti o diminuisca il volume del suo corpo, quando vuole alzarfi, o discendere; imperocchè dopo ciò che di sopra si è detto, ben s'intende che l'animale crescendo in grandezza, senza crescere di materia, può divenire più leggero, che il volume d'acqua, al quale corrisponde attualmente;

te: e che al contrario s'egli diminuisce il suo proprio volume; spinge e muove dal suo luogo men d'acqua, e può a questo modo rendersi più pesante del fluido, che alla sua caduta si oppone.

Verisimile ancora più si rende questa spiegazione, perchè se si dilata l'aria della doppia vescica, mettendo il pesce nel vuoto; finchè un tale stato dura, egli fa de' sforzi vani per gire, o per restarsene al fondo dell'acqua, ma suo malgrado nuota sulla superficie: e prova un effetto affatto contrario, allorchè se gli è tolta cotest'aria interiore, o facendo crepare la doppia vescica, o vuotandola in parte.

Gli animali che si annegano, vanno prima al fondo dell'acqua, perchè sono più pesanti di essa; ma da lì a qualche spazio di tempo si vedono di nuovo comparire a galla, e comunemente queste comparse ricominciano più volte. La ragione è, perchè cotesti cadaveri alternativamente diventano più pesanti, e più leggieri del volume d'acqua a cui corrispondono. L'animale soffocato nel fondo d'un fiume, si corrompe in pochigiorni: la corruzione non è altro che un trasporto o cambiamento di luogo delle parti d'un corpo; ed allorchè si fa un generale movimento nelle parti d'un composto, il suo volume cresce. Un tal corpo dunque galleggia, perchè senza avere più di materia, ha più di grandezza, e corrisponde a un volume d'acqua più pesante di sé. Quest'è una cosa che non può ignorarsi da quelli che hanno avuto occasione di vedere tai corpi, che così su l'acqua ritornano. Si farà da loro osservato, ch'eglino sono sempre gonfiati, e tesi

260 LEZIONI DI FISICA

come palloni; ma se restano qualche tempo così tra l'acqua e l'aria, la corruzione cresce, si fanno delle dissoluzioni e delle evacuazioni, che occasionano un avvallamento nelle parti più solide, le quali van raccostandosi così, che il volume totale scema, e corrisponde a minor quantità d'acqua, che non è più idonea a sostenerlo; e se dopo questa nuova sommersione, qualch'altra fermentazione vien di nuovo a gonfiare il cadavere notabilmente, egli si vede ricomparire di nuovo.

Un corpo, qualunque egli sia, non ha bisogno che il suo volume sia aumentato per soprannuotare in un fluido, basta che sia unito a qualch'altra materia più leggiera del fluido in cui è immerso, e che il tutto insieme pesi meno che il volume corrispondente. Coloro che imparano a nuotare, guerniscono il corpo con vesciche piene d'aria, o con delle zucche vuote. Questi auxiliarj volumi li mettono in istato di sostenersi più facilmente su l'acqua, ma con tutte le cautele sì fatte, i mal destri corrono molto rischio nè più nè meno; imperocchè, per annegarsi, basta aver la bocca ed il naso nell'acqua; e colui il quale non sapeffe tenersi sempre in una situazione comoda a lasciargli respirar l'aria, perirebbe anche prima di andare a fondo.

Se, per nuotare a primo tratto e senza disciplina, hanno gli altri animali qualche vantaggio sopra l'uomo, non penso ch'è ne sien tenuti, come da alcuni è stato, detto, all'ignoranza del pericolo, o alla mancanza di riflessione. Quando un cavallo, un bue, un cane si trova in necessità di nuotare, qualunque sia la maniera in cui egli

egli giudichi del suo stato, io duro fatica a persuadermi, che non ne senta il pericolo. Io gli vedo fare tutto quello, che un uomo imitar vorrebbe in caso simile; e dacchè è giunto a terra, egli da segni di allegrezza, e si diporta con certi riguardi e cautele, che provano abbastanza la paura ch' egli ha avuta. Ma la ragione, perchè un quadrupede si salva a nuoto più facilmente, si è, a mio credere, perchè il suo peso, che tende ad affondarlo, non muta niente nella sua natural positura; e quando anco il resto del corpo fosse intieramente immerso a fior d'acqua, la sua testa stassene tuttavia fuori d'acqua senza un grande sforzo. Dell'uomo non è così; il luogo del suo corpo il più pesante, e quello che primo s'immerge, è verso la testa, e quand'ei nuota sì che non vada a fondo, ha da avvertire qualch'altra cosa, ed ha da fare degli altri sforzi, per schivare di aver nell'acqua il viso: quindi i nuotatori, in ischiena più che in altra maniera stanno agiati e comodi.

Questa spiegazione, della quale mi servo nelle mie Lezioni, ha già nove anni; vieppiù mi pare probabile, perchè trovasi conforme a quella d'un uomo dotto, a cui sì di facile non ha potuto giungere la notizia de' miei pareri in Fisica, e che del suo proprio fondo è ricco abbastanza, nè può sospettarsi, che approprij a sè i pensieri altrui. Questi è M. Bazin, Dottore in Medicina a Strasburgo, degno corrispondente di M. de Reaumur dell'Academia delle Scienze, ed autore di molte opere di Fisica giustamente applaudite, il quale ha dato alle stampe nel 1741. un volume in ottavo, dove trovasi una Dissertazione

assai curiosa , circa la differenza che vi ha tra l'uomo e le bestie , rispetto alla facilità di nuotare. Il Lettore che averà vaghezza d'addottrinarsi appieno su questa materia, troverà nello scritto citato di che appagarli.

Se le zucche, o le vesciche piene d'aria ostano all'affondamento ed alla sommersione d'un uomo: mezzi somiglianti adoperati convenevolmente possono sollevare, e condurre alla superficie dell'acqua de' corpi sommersi, ai quali si fossero aggiunti. Quando un vascello ha rotto su la rena, od è incagliato, per rimetterlo all'acqua, gli si attaccano, nel tempo della bassa marea, alcune casse grandi fortissime, e i volumi delle quali sono proporzionati al peso del vascello, ed allo sforzo che si giudica necessario per distaccarlo. Nella marèa crescente, se il volume d'acqua, che corrisponde a tale aggregato o composto, pesa più di esso, non manca di trasportarlo, e di metterlo in istato d'esser tirato a riva.

Quando questa operazione si debbe fare in siti, dove non vi ha marèa, cioè dove la superficie dell'acqua resta sempre alla medesima altezza, si empiono d'acqua le casse che si vuole unire al vascello, per farle affondare più giù che sia possibile, senza però sommergerle, e quando sono attaccate, si vuotano con delle trombe, per render loro la primiera leggerezza che avevano, e cui debbono partecipare al corpo arenato; e tal metodo ha l'istesso effetto che il primo, se si faranno osservate le proporzioni necessarie.

Il più difficile di tali operazioni si è, passare le corde o gomene sotto il vascello arenato, massi-

massimamente quando vi è stato da lungo tempo e che la sabbia ed il limo vi si sono attorno indurati, e considerabilmente accumulati. Questa difficoltà è stata superata, non ha guari, con molto coraggio e assai ingegnosamente, dal Sig. Goubert, Ufficiale delle navi del Re, che sa accoppiare al più sperimentato valore, la sagacità de' più abili Ingegneri, e che è finalmente venuto capo di portar a galla un de' vascelli, i quali sono periti nel 1792. nell'acque di *Vigo* in Spagna; intrapresa ch'era stata tentata inutilmente, e con grave dispendio da molte Compagnie formate in Francia ed altrove. E' peccato, che da una sì bella e felice riuscita non abbi il Signor Goubert riportato altro che applausi; le speranze delle quali egli potea lusingarsi, erano senza riparo andate a vuoto, ed avean, dirò così, rotto in un col vascello. Non è da dubitare, che all'aspetto del naufragio, erane stati tolti tutti gli effetti; perochè non vi si trovò niente, che risarcir potesse gl'Impressarj delle grandi spese, alle quali li ha impegnati tale opera.

IV. PROPOSIZIONE.

Se il corpo solido è men pesante, che un egual volume del liquore, nel quale egli è immerso, galleggia in parte, e quel che ne rimane immerso, misura una quantità di liquore, che pesa quanto il corpo intero

IX. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Il vafe rappresentato dalla *Figura 9.* è di vetro, quasi cilindrico, e guernito abbaſſo d'un foro o condotto di comunicazione colla ſua chiave; vi ſi mette dell'acqua appreſſo a poco fino a due terzi, dove ſi fa un ſegno; quindi vi ſi tuffa una palla di cera ben rotonda, e quaſi così groſſa come il vafe è largo: queſta immersione innalza la ſuperficie dell'acqua; per lo foro o chiaveſta, ſi detrae tant'acqua, quanta baſta per far sì che la ſuperficie ſ'abbaiſſi fino al ſegno dov'ella era in primo luogo; ſi leva via la palla di cera, ſi aſciuga, e ſi peſa a rincontro della quantità d'acqua, che ſ'è tolta dal vafe.

EFFETTI.

La palla e coſteſta quantità d'acqua; ſono reciprocamente in equilibrio fra loro; o ſe ciò non ſi fa a rigore, così poco vi manca, ch'è facil coſa vedere, che queſta piccola differenza naſce da un diſetto d'eſattitudine nell'operazione; imperocchè baſta per ciò, che cavando l'acqua dal vafe, ne ſieno uſcite alcune gocce di più o di meno del biſogno.

SPIEGAZIONE.

La palla di cera immerſa non affonda intieramente ſott' acqua, perchè è un poco più leggiera;

SPERIMENTALE. 265

giera; ma la più gran parte che resta immersa, sospigne una quantità d'acqua che s'alza al di sopra del disegno. Quando s'apre il foro, e per esso si fa derivar dell'acqua fuor del vaso, finchè la superficie ritorni a questo medesimo segno, si è certo d'avere la quantità ch'è stata sospinta per l'immersione della palla; e poichè questa quantità d'acqua fa equilibrio con la palla intera, non è questa una prova; che *la parte immersa misura una quantità di liquore, che pesa quanto il corpo intero*, come l'abbiamo asserito nella nostra Proposizione 2.

CONSEGUENZE.

Segue dalla Proposizione precedente, 1. Che d'un corpo che sta a galla, la parte immersa è tanto più picciola, quanto è più denso il liquore, o quanto è men pesante il corpo immerso.

2. Che vi ha sempre una parte immersa, quando il solido che riposa sul liquore, ha un peso ed una grossezza sensibile. Imperocchè, se è pesante, come si suppone, vi abbisogna qualche cosa che gli faccia equilibrio; e ciò che fa quest'equilibrio, è il volume di liquore sospinto, come provato abbiamo nell'ultima Esperienza.

X. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

In un picciolo vase lungo e stretto, empito di qualche liquore, sino a' trè quarti della sua capacità, *Figura 10.*, s'immerge una bottiglietta di

266 LEZIONI DI FISICA

di vetro sottilissima, che ha un collo lungo diviso in gradi, ed è nel fondo rassodata con una specie di zavorra, cioè con un poco di mercurio, sicchè stia facilmente in una direzione perpendicolare.

E F F E T T I.

Questa bottiglietta a collo lungo, ordinariamente è chiamata *Arcometro*, o sia *Pesa-liquori*, affonda più o meno nel vase, secondo ch'egli è ripieno di un liquore più o men denso; vale a dire, ella discende più profondamente nel vino che nell'acqua, e nell'acquavite ancora più che nel vino. E se si mette su la sommità del suo gambo qualche laminetta di metallo, quell'*Arcometro* affonda più addentro, benchè nel medesimo liquore.

S P I E G A Z I O N I.

La parte immersa dell'*Arcometro*, solleva tanto liquore, quanto ne bisogna per fare equilibrio all'istrumento intiero. S'egli pesa un'oncia, per esempio, solleva meno d'acqua che di vino, quanto al volume, perchè è mestieri di maggior quantità di vino, che d'acqua per il peso d'un'oncia; e però ch'ei non solleva il liquore se non affondando, dee dunque tanto più addentro immergersi, quanto il liquore è più leggiero.

Se si cresce il peso dell'*Arcometro*, con la giunta di qualche laminetta di metallo, o in altra guisa, egli affonda ancor più nel medesimo liquore, perchè allora ne abbisogna una maggior quantità per fargli equilibrio.

AP

APPLICAZIONI.

Poichè tutti i corpi che fiottano, siccome l'abbiam fatto vedere coll'Esperienza dell'*Arcometro*, affondano più o meno, secondo la densità del fluido; una barca carica in mare, averà dunque meno parti fuori dell'acqua, se viene ad imboccare un fiume; imperocchè l'acqua salza pesa più che l'acqua dolce, e i Nuotatori affermano, che ne sentono la differenza. Deesi dunque badare a questo effetto, e non prendere il carico, sì grande che far si potrebbe, se si prevede d'aver a passare per un'acqua men caricata di sale, di quella in cui fa l'imbarco.

Vedute si sono talvolta delle Isole *natanti*, cioè, delle porzioni di terra considerabili, le quali staccandosi dal continente, e trovandosi meno pesanti dell'acqua, sostengono sulla superficie, e fiottano in balia de' venti. L'acqua mangia di sotto a poco a poco certi terreni più che altri, idonei a dissolversi; tali escavazioni s'aumentano col tempo, e si stendono da lontano: la parte di sopra resta legata per le radici delle piante e degli alberi, ed il suolo o terreno non è d'ordinario che una terra bituminosa, leggiera di modo, che questa specie di crosta è meno pesante che il volume d'acqua, sopra l'quale ella è ricevuta, quando uno od un altro accidente la distacca dalla terra ferma, e la fa ondeggiare.

L'esempio dell'*Arcometro* mostra che non fa d'uopo, per galleggiare su l'onde, che il corpo natante sia d'una materia più leggiera dell'acqua. Imperocchè questo istrumento non si sostiene in
virtù

virtù del vetro o del mercurio di cui è fatto, ma solamente perchè egli ha, con poca solidità, un volume considerabile, che corrisponde ad una quantità d'acqua più pesante. Quindi potrebbe farsi delle barche di piombo o d'altro metallo, le quali non affonderebbono. Ed in fatti, i carri d'artiglieria portano bene spesso, dietro agli Eserciti, certe, le direm, gondole di rame, che servono a stabilir dei ponti, per lo passaggio delle Truppe.

Della Bilancia Idrostatica, e de' suoi Usi.

La Bilancia Idrostatica che abbiamo adoperata nell'Esperienze precedenti, è un istrumento comodissimo, per conoscere la gravità specifica de' fluidi e de' solidi, che possono essere immersi senza disciogliersi; e senza mutar volume. Non possiamo gran fatto diffonderci sopra i suoi usi, perchè li fatti divisamenti oltrepassano i limiti, che ci sian prescritti in quest'Opera; i curiosi di saperli, potran leggere ciò che ne hanno scritto il Boyle, e dopo lui Cotes, Desaguilliers, s'Gravelande ec. a noi basterà far vedere, che gli effetti di questa bilancia sono mere applicazioni de' principj di sopra posti, e ci ristigneremo ad alcuni esempi che basteranno per provarlo.

PRIMO USO.

Conoscere la gravità specifica d'un Liquore.

LA gravità specifica d'una Materia, è il peso ch'ella ha sotto un noto volume: e ciò pur anche si chiama la sua *Densità*. Un solido intieramente immerso, sospigne o muove del suo luogo un volume di liquore eguale a sè. S'averà dunque la soluzione del problema, se si presenterà un mezzo di conoscere il peso di questo volume sospinto: ora la quarta Esperienza ci ha insegnato, che questo peso è precisamente quello, che il solido perde con la sua immersione; quindi procederà nella maniera seguente.

Abbiate in pronto un corpo solido, che possa immergerfi senza cambiar di volume, e senza ammettere il liquore ne' suoi pori, e.g. del vetro; un cotal corpo può essere sferico, cilindrico, cubico, ec. come vorrete. Sospendetelo con un cappello, con una crena, al braccio della bilancia, per conoscere a prima giunta la sua assoluta gravità; fatelo poi immergere intieramente nel liquore, l'equilibrio sarà tolto rotto per coteſta immersione; quello che doverete aggiugnervi per rimettere l'equilibrio, sarà appunto il peso del volume di liquore che è stato sospinto dal corpo immerso. Se questo corpo era un cubo d'un pollice, e se dopo averlo immerso vi avete perſervar l'equilibrio, aggiunto 4 grossi, conchiuderne dovreste, che un pollice cubico del liquore pesa 4 grossi, od una mezz'oncia.

Si

270 LEZIONI DI FISICA

Si può opporre contro l'esattezza dell'esposto metodo, che la gravità di questo cubo di vetro, pesato all'aria, non è la sua gravità assoluta, poichè l'aria, come fluido ambiente, gli toglie una parte del suo peso; ma il piombo che lo tiene in equilibrio; soffre una perdita appresso a poco simile; e l'aria è sì leggiera, che la gravità rispettiva e la gravità assoluta, sono sensibilmente le stesse, quando i corpi che vi sono immersi, hanno volumi di poco momento.

Ma un'attenzione, che non è mai sufficientemente usata in così fatte Esperienze, è questa: che il solido immerso, ed il liquore, ove si fa l'immersione; non variano di densità, durante la operazione. Imperocchè, se il liquore si condensa, ovvero il volume del solido cresce o scema, ne risulterà dello sbaglio; ed è possibilissimo che tal variazione succeda per il caldo; per il freddo, e perchè forse si giudicherà dello stato d'un liquore dal suo nome, senza badare che tutto quello, che acqua comune si chiama, o spirito di vino, od altro ec. non è sempre d'una densità eguale.

Per rimediare ad una parte di tali inconvenienti, io vorrei che in vece d'immergere un corpo solido di vetro, si adoprassero una palla cava, terminata da un tubo capillare, e ripiena di mercurio, come un termometro; con tal mezzo si potrebbe assicurarsi del grado di densità del liquore; almeno di quello che risulta dal freddo o dal caldo attuale; e si sarebbe certo nel medesimo tempo, che il volume del corpo immerso non è mutato. Imperocchè, se la temperatura del liquore venisse a cambiarsi, se ne verrebbe

be

be avvertito dall'ascesa, o dall'abbassamento del mercurio nel tubo capillare.

II USO.

Paragonare le gravità specifiche di due liquori.

QUando si è conosciuta la gravità specifica d'uno de' due, mercè l'uso precedente, si ripete l'operazione su l'altro, e la differenza de' pesi che conviene aggiugnere, per rimetter l'equilibrio dopo l'immersione, è altresì la differenza delle loro specifiche gravità.

In queste così fatte comparazioni, bisogna avvertir bene, che il grado di fluidità non c'entri per qualche cosa. Vi son de' liquori più viscosi, più difficili a dividere, ne' quali l'immersione del corpo solido si fa più difficilmente, indipendentemente dalla densità, quando ciò è così, bisogna ricorrere a qualch'altra procedura, per conoscere con esattezza la gravità specifica.

III USO.

Paragonare le gravità specifiche di due corpi solidi.

CON la quinta Esperienza abbiám provato, che i solidi, le cui gravitadi assolute sono eguali, ne perdono con l'immersione, quantitadi proporzionali a' loro volumi.

Met-

272 LEZIONI DI FISICA

Mettete dunque in equilibrio nell'aria due pezzi di materie, fateli, poscia immergere in due vasi pieni del medesimo liquore. Se i loro volumi sono eguali: l'equilibrio sussisterà, perchè le perdite saranno eguali da una parte e dall'altra; se sono ineguali, il più piccolo volume trasporterà l'altro; e quel che converrà a questo aggiugnere, per rimetterlo in equilibrio, sarà la differenza tra le gravitadi specifiche degli due.

Se i dati corpi non sono così pesanti, che s'immergano affatto per la lor propria gravità, vi si può aggiugnere de' pesi, che nell'effetto nulla cambieranno se perfettamente simili saranno di quà e di là. Ma conviene avvertir bene, che non si attacchino alla superficie de' corpi immersi, delle bollicole d'aria o qualche cosa di pingue, che osti al liquore, e non lo lascia da tutte le parti ben abbracciare il corpo solido; imperocchè i volumi d'essi corpi farebbono allora aumentati, e la loro gravità ne parrebbe altrettanto diminuita.

IV. U S O.

Paragonare la gravità specifica d' un
Corpo solido, con quella d'
un Liquore.

QUando si è pesato un Corpo solido nell'aria, ciò che gli resta del suo peso in appresso, quando è immerso nel liquore, è la differenza che passa trà le gravità specifiche di esso corpo, e del volume corrispondente del liquore.

Se,

S P E R I M E N T A L E . 273

Se, per esempio, un pezzo d'oro pesa 19 grossi nell'aria, e ne pesi sol 18 immerso nell'acqua comune, questo è un segno, che una tale immersione gli toglie $\frac{1}{19}$ del suo peso, e che la gravità specifica dell'acqua è a quella dell'oro, come 1 a 19.

Osservazioni sopra l' Areometro o sia il

Pesa-liquori.

L' Areometro, che rappresentato abbiamo con la *Figura 10.* è altresì un istromento, col quale si può conoscere di due Liquori qual sia il più pesante; ma se si vuol servirsene per conoscere puntualmente la proporzione de' pesi, bisogna costruirlo e adoperarlo con certe avvertenze, nelle quali per ordinario si manca, e senza le quali non si può sperarne esattezza.

1. Bisogna, che i liquori ne' quali s'immerge l' Areometro, sieno esattamente allo stesso grado di calore o di freddo, Affinchè si possa esser certo che la lor differenza di densità non viene dall'una di queste due cagioni, e che il volume dell'Areometro non ne ha pur egli ricevuta alcuna mutazione.

2. Che il collo dell'istromento, sopra'l quale sono segnati i gradi, sia per tutto d'una grossezza eguale; imperocchè, s'egli è d'una forma irregolare, i gradi segnati a distanze eguali, non misureranno volumi di liquor simili nell'immergerli; sarà più sicuro e più facile graduare cotesta scala relativamente alla forma del collo, caricando successivamente l'istromento di più pesi ben eguali,

Tomo II.

S

ciascun

ciascun de' quali produrrà l'affondamento d' un grado.

3. Si deve aver cura, che l'immersione faccia-
si perpendicolarmente affatto alla superficie del li-
quore; altrimenti l'obblività impedirebbe il con-
tare con adeguatezza il grado d'affondamento.

4. Essendochè l'uso di questo istrumento è li-
mitato a liquori, i quali poco differiscono tra lo-
ro nella gravità, si deve ben por mente, che la
parte che sta a galla, non si carichi di qualche
vapore, o sporcizia donde proverrebbe qualche sba-
glio od errore nel computo, tanto più che trattasi
di poco considerabili differenze. E quando l'Areo-
metro passa da un liquore all'altro s'avverta be-
ne che la sua superficie non porti alcuna tinta
o lieve sopra coperta, che impedisca l'esatto com-
baciamento del liquore in cui egli entra, colla di
lui superficie.

5. Finalmente ad onta di tutte queste cautele,
riman tuttavia la difficoltà di ben giudicare il
grado di affondamento, perchè certi liquori s'ap-
plicano meglio che altri al vetro, ed altri parec-
chi quando lo toccano, si sollevano più o meno
al di sopra del loro livello.

Quando si fa uso dell'Areometro, di cui favel-
liamo, bisogna prima immergerlo nel liquore men
pesante, ed osservare a qual grado s'incontri la sua
superficie: quindi s'ha a riportarlo nel più denso,
e caricare la sommità dell'asta, o sia del collo
di pesi noti, fin a tanto che il grado d'affonda-
mento sia eguale al primo. La somma de' pesi,
che si faranno aggiunti, per rendere questa secon-
da immersione eguale alla prima, sarà la differen-
za delle gravità specifiche tra i due liquori.


Il Sig. Homberg , e dopo lui molti Fisici , si sono serviti per pesare i liquori d'un picciol vascello di vetro sottile , che si vede rappresentato dalla *Figura 11.* a fianco del collo di cotesto vase s'è apposta fatto un tubuletto ascendente , col mezzo del quale han preteso d'empire il vase sempre egualmente , perchè è più facile stimare l'altezza giusta del liquore in un picciolo tubo , che nel collo dell'istrumento , che abbia la superficie più estesa . In questa maniera si è creduto di poter sempre misurare de' volumi eguali , de' quali fosse facile conoscere il peso , applicandoli ad una bilancia . Ma noi non possiam dissimulare , che questo metodo è soggetto , come gli altri , a più inconvenienti ; il maggiore di tutti si è , che il tubuletto ascendente è molto angusto , e che i liquori non vi si pongono a livello : la maggior parte vi stanno più elevati , come fra poco lo diremo , e quest'eccesso non è il medesimo in tutti .

Parecchi Dotti si son presa la briga d'esaminare le gravità specifiche d'un gran numero di materie , così solide , come fluide , e di ridurle in tavole . Deesi senza dubbio sapere lor grado di tal fatica , di cui ben si conosce la difficoltà , quando si pensa alle attenzioni scrupolose , e al tempo che forza è di spendere in tali ricerche , quando diventano necessarie , ma le loro Esperienze , per esatte che state sieno , non ci possono servire di regole inappuntabili , ma riduconsi all'appresso poco . Imperocchè gl'individui di ciascuna specie , variano tra essi , quanto alla densità ; nè si può dire , che due diamanti , due pezzi di rame , due gocce di pioggia ec. sieno per-

setteamente simili. Però, quando trattasi di sapere appuntino la gravità specifica di qualche corpo, bisogna metter lui medesimo alla prova; e questi è il solo mezzo di giudicarne. Nel vero ci ha parecchie occasioni, nelle quali è superflua così grande esattezza, ed allora si può riportarsi alle ricerche d'un fisico valente ed accurato; con tal fine, ed a tal uopo noi non abbiam tralasciato di qui porre una Tavola, ordinata su l'Esperienze del Muschenbroekio, la cui sagacità ed accuratezza sono bastevolmente note.

Le gravità specifiche di tutte le materie mentovate in questa Tavola, son paragonate con quella dell'acqua comune; e pigliasi per acqua comune quella della pioggia in una mediocre temperatura. Così quando si vedrà nella Tavola, acqua di pioggia . . . 1, 000, oro di copella 19, 640, aria 0, 001 $\frac{1}{4}$, vuol dire che la gravità specifica dell'oro più fino, è ver quella dell'acqua, come 19. $\frac{1}{4}$ appresso a poco, verso 1. e che la gravità dell'aria è quasi la millesima parte di quella dell'acqua.








TAVOLA ALFABETICA.

Delle Materie più cognite e volgari, sì solide
come fluide.

*Delle quali è stata provata la Gravità
Specificca.*

A	Bete - - - - -	0, 550.
	Aceto di vino - - - - -	1, 011.
	distillato - - - - -	1, 030.
	Acciajo flessibile o non temprato - - - - -	7, 738.
	Acciajo temprato - - - - -	7, 404.
	Acqua comune di pioggia - - - - -	1, 000.
	Acqua distillata - - - - -	0, 993.
	di fiume - - - - -	1, 009.
	Agata d' Inghilterra - - - - -	2, 512.
	Alabastro - - - - -	1, 872.
	Allume - - - - -	1, 714.
	Ambra - - - - -	1, 040.
	Amianto - - - - -	2, 913.
	Antimonio di Germania - - - - -	4, 000.
	Antimonio d' Ungheria - - - - -	4, 700.
	Ardozia (Gall. <i>Ardoise</i> *) - - - - -	3, 500.
	Argento di copella - - - - -	11, 091.
	Aria - - - - -	0, 001. $\frac{1}{4}$.
	Avorio - - - - -	1, 825.

S 3

Bis-

* Certa pietra leggièra e bruna, che si sfoglia, ed
è in uso in Francia per far tegole da tegole da tetti.

278 LEZIONI DI FISICA

Bismut	9, 700.
Borrace	3, 720.
Camfora	0, 995.
Carbone di terra	1, 240.
Cera gialla	0, 995.
Cinabro naturale	7, 300.
artificiale	8, 100.
Corallo rosso	2, 689.
bianco	2, 500.
Corno di bue	1, 840.
dicervo	1, 875.
Cristallo di Rocca	2, 650.
d'Irlanda	2, 720.
Diamante	3, 400.
Ferro	7, 645.
Gomma Arabica	1, 375.
Granato di Boemia	4, 360.
di Svezia	3, 978.
Karabe od ambra gialla	1, 065.
Latte vaccino	1, 030.
Legno di Brasile	1, 030.
Cedro	0, 613.
Olmo	0, 600.
Guaiaco	1, 337.
Ebano	1, 177.
Acero	0, 755.
Frassino	0, 845.
Bosso	1, 030.
Litargirio d'oro	6, 000.
d'argento	6, 044.
Maganele	3, 530.
Marmo nero d'Italia	2, 704.
bianco d'Italia	2, 707.
Mercurio	13, 593.
Noci	

SPERIMENTALE 279

Noci di galla	- - - -	1, 034.
Oglio di lino	- - - -	0, 932.
d'olive	- - - -	0, 913.
di vetriuolo	- - - -	1, 700.
Oro faggiato, o di copella	- - - -	19, 640.
d'una ghinea	- - - -	18, 888.
Osso di bue	- - - -	1, 656.
Pece	- - - -	1, 150.
Pietra sanguigna	- - - -	4, 360.
calaminare	- - - -	5, 000.
Pietra focaia opaca	- - - -	2, 542.
trasparente	- - - -	2, 641.
Rame di Svezia	- - - -	8, 784.
gittato in forma	- - - -	8, 000.
Sale di Glauber	- - - -	2, 246.
Ammoniaco	- - - -	1, 453.
Gemma	- - - -	1, 143.
Policresto	- - - -	2, 148.
Sangue umano	- - - -	1, 040.
Sasso	- - - -	2, 542.
Scaglie o gusci d' ostrica	- - - -	2, 092.
Solfo comune	- - - -	1, 800.
Spirito di vino rettificato	- - - -	0, 866.
di trementina	- - - -	0, 874.
Stagno puro	- - - -	7, 320.
con lega d'Inghilterra	- - - -	7, 471.
Talco Veneto	- - - -	2, 780.
Tartaro	- - - -	1, 849.
Turchese	- - - -	2, 508.
Verderame	- - - -	1, 714.
Vetro bianco	- - - -	3, 150.
Vetro comune	- - - -	2, 620.
Vino di Borgogna	- - - -	0, 953.
Vitriuolo d'Inghilterra	- - - -	1, 880.

~~~~~

## A P P E N D I C E,

Ove si tratta de' Tubi Capillari, e delle cause immediate della fluidità e della solidità de' corpi.

~~~~~

A R T I C O L O P R I M O.

De' Tubi Capillari.

IO metto qui, ciò che importa sapere circa i Tubi capillari, come tante eccezioni delle leggi dell'Idrostatica, le quali si sono da noi precedentemente stabilite. Non già ch'io pensi, che sia assolutamente impossibile ridurre a queste leggi generali, quello che vi è di singolare in apparenza in coteste sorte di fenomeni; ma tutto che siasi tal cosa tentata più volte, e da Fisici di prima sfera; non dissimuleremo, esserne ancora dubbioso l'esito ed il da loro detto su questa materia, non poter riceverfi che come probabilità, per lo più ingegnose, ma che lasciano sempre difficoltà da sciogliere. Altri forse più fortunati nelle lor ricerche, troveranno il mezzo di conciliare con principj generalmente accordati, quegli effetti, a' quali vorrebbero

rebbeſi quaſi aſſegnare cagioni novellamente immaginate e d' un genere particolare , ſe non ſi ſapeſſe , che in Fiſica l' immaginazione non ha gran peſo , ſe non è ſoſtenuta dall' Eſperienza .

Tubi Capillari ſ' appellano ; quelli che ſon minuti : ponno eſſer fatti di vetro , o di ogni altra materia capace di contenere i liquori . Queſto nome ſenza dubbio è ſtato dato ad eſſi , per la reſomiglianza che poſſono avere co' capelli , i quaſi conſideranſi ordinariamente come piccioli canali , cavi in tutta la loro lunghezza , ed atti a trasferire certi umori .

Queſta comparazione nulladimeno non limita la groſſezza de' Tubi capillari a quella d' un capello , quei che comunemente ſono in uſo per l' Eſperienze , ſono molto minuti , e gli effetti che a coſì fatti tubi propriamente appartengono , ſi laſciano ancora ſcorgere , quando il loro diametro è eguale a due linee , o due linee e mezza . La loro forma è indifferente aſſatto : due pezzi di laſtra da ſpecchio ; i piani de' quali ſ' accoſtano parallelamente ad una convenevole diſtanza , producono gli effetti medefimi , che una ſerie di piccioli tubi ; e tutti i corpi ſpongioſi , o poroſi tanto che ammettano i liquori , poſſono eſſere altresì conſiderati come adunamenti o faſci di canali capillari . Noi qui eſporremo nelle ſeguenti Eſperienze , ciò che più intereſſa in queſta materia . Nelle preparazioni ſi vedranſi le diſtinzioni differenti che aver poſſono i tubi capillari , le loro proprietà ſi conoſceranno dagli effetti riſultanti da cadauna operazione .

PRIMA ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

In una piccola tazza AB, Fig. 12., la qual si riempie successivamente di diversi liquori, s'immerge il piccolo tubo CD, le due estremità del quale sono aperte, ed il quale si è attaccato sopra una picciola assicella di carton bianco, diviso secondo la sua lunghezza in parti eguali.

EFFETTI.

Prima proprietà de' Tubi Capillari.

Dacchè il Tubo è immerso, il liquore si solleva verso D; e se si caccia più entro il tubuletto nella tazza, il liquore ascende altrettanto al di sopra del sito dove s'era prima fermato; questo effetto è generale per tutti i liquori, uno solo eccettuato, di cui faremo qui appresso menzione.

II. ESPERIENZA

PREPARAZIONE.

Si procede in questa Esperienza, come nella precedente; i liquori de' quali si riempie successivamente la tazza, sono l'orina, lo spirito di vino, lo spirito di nitro, l'acqua salata, l'olio di vitriolo. Convien porre cura di far passare dell'acqua netta nel picciolo tubo, ogni volta che si cambia liquore, far sì che abbiano tutti la medesima

S P E R I M E N T A L E. 283

sima temperatura, e osservare a qual grado ciascuno s'innalza.

E F F E T T I.

Seconda proprietà.

Questi liquori s'innalzano nel medesimo tubo ad altezze differenti, secondo l'ordine che segue, cominciando da quelli che ascendono più alto; l'orina, l'olio di vitriolo concentrato, l'acqua salata, lo spirito di nitro, e lo spirito di vino; lo che dà a vedere, che i liquori non si sollevano ne' tubi capillari, in ragione inversa della loro densità, poichè lo spirito di vino, ch'è più leggero, è quello di tutti gli accennati liquidi, che si solleva meno.

III. E S P E R I E N Z A.

P R E P A R A Z I O N E.

Nell'acqua colorata s'immergono due tubi della medesima lunghezza, ma che hanno diametri interiormente della metà differenti. *Fig. 13.*

E F F E T T I.

Terza proprietà.

L'acqua si solleva una volta più alto in quel de' due tubi, che ha il diametro una volta più piccolo; e però che quest'effetto segue ognora alla maniera stessa la proporzione mutua de' diametri,

284 LEZIONI DI FISICA

metri, in generale dedur si può, che i liquori s'innalzano ne' tubi capillari, in ragione inversa della loro larghezza, cioè che il liquore v'ascende tanto più alto, quanto eglino sono più stretti.

VI. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Bisogna ripetere l'Esperienze precedenti, con adoperar del mercurio in vece de' liquori prima usati in esse, ovvero infondere del mercurio in un sifone ripiegato, uno de' rami del quale sia capillare, come lo rappresenta la Fig. 14.

E F F E T T I.

Quarta proprietà.

Si osserverà, che il mercurio stassi ognor più basso del suo livello; e che il suo abbassamento è tanto maggiore, quanto il tubo è più stretto. Nel sifone rovesciato, per esempio, il mercurio in vece di alzar si in G nel ramo capillare, per essere a livello con quello dell'altro ramo, stassene in H e terrebbe si più basso ancora, se questo tubo che lo contiene fosse d'un diametro più piccolo.

Sino ad ora non ci è noto altro liquore, che così adoperi ne' tubi capillari, se non se il mercurio: è bensì asserito da ognuno, che tutte le materie metalliche le quali si tenessero in fusione, farebbono l'istesso effetto; io per me ne giudico dalla propria esperienza che ho fatta collo stagno e col piombo liquefatti.

SPIE.

SPIEGAZIONI.

Tutti questi fatti, siccome si vede, pajono contrarj alle regole ordinarie dell' Idrostatica , per le quali s' è veduto che un liquore sempre si mette in equilibrio con sè medesimo, tanto in un solo e medesimo vaso , quanto in molti , i quali insieme comunichino ; che se egli obbedisce a una forza, che lo innalza al di sopra del suo livello , le cede proporzionalmente alla sua densità ec. La differenza che scorge si ne' tubi capillari, non è nota; se non da un secolo al più in quà ; questa scoperta s' è fatta in un tempo , in cui già si pensava, che quanto porgesi da spiegare in Fisica , non può bene spiegarsi, che per via di cause meccaniche, presentate alla mente in un modo intelligibile; i più valenti Fisici in conseguenza di ciò si sono affaticati, e ci hanno su studiato ; ma ha poi al loro zelo corrisposto la riuscita?

Si possono schierare in tre classi le opinioni , che sono state proposte su questa materia.

La prima comprende quelle, che attribuiscono tali fenomeni alla pressione ineguale del fluido che attornia, supponendo ch' egli eserciti il suo peso più liberamente, e in una maniera più completa, su la superficie del vase AB, che per l' orificio superiore del tubo immerso. Fig. 12.

Questo fluido che attornia, è secondo alcuni l' aria , le di cui parti ramosi s' intralciano , e si muovono difficilmente in un canale angusto , mentre adopera senza ostacolo su la superficie della tazza . Questo sentimento è naturalissimo , e sem-

186 LEZIONI DI FISICA

e semplice; ma una sola esperienza lo rende quasi insostenibile: tutto quello che i tubi capillari fanno ad aria piena ed aperta, lo fanno parimenti sotto il recipiente d'una macchina pneumatica, ove si è effettuato il vacuo.

Che riman egli da rispondere? Dirassi per avventura, che il vacuo non è mai perfetto, e che quello che restad'aria, dopo gli ultimi sforzi della tromba più esatta, è tuttavia capace di sostenere alcuni pollici d'acqua al di sopra del suo livello.

Facilmente ognun s'accorge, che la risposta non soddisfa all'obbiezione; ma ella non è però assolutamente priva di forza; tutta l'aria del recipiente si rarefa egualmente; se la pressione su la superficie della tazza scema, decresece pure a proporzione la resistenza nel tubo; e le cause dell'ineguaglianza d'azione sussistono. Ma una seconda Esperienza fa vedere, che non si può sostenere questa inegualità di pressione, che suppone che l'aria non adopera liberamente nel tubo. Se ciò fosse, bisognerebbe che il liquore s'alzasse proporzionalmente alla lunghezza del tubo; imperocchè è certo, che se l'aria vi provasse dell'impaccio, più ancora ne proverebbe in un più lungo, che in un più corto: pure ciò non succede, il diametro del tubo è quello che regola il grado d'elevazione, e quando l'acqua è arrivata al punto a cui dee salire, non s'abbassa, tuttochè si tolga via la parte del tubo, che è al di sopra di lei.

Avendo queste ragioni fatto abbandonare l'opinione che rendea conto del fenomeno con l'aria grossiera, si è fatto ricorso ad un altro fluido più sottile, e quale appunto sussiste ne'vasi, ne'quali si fa il vuoto Boileano. Suppongonsi in questo tenuiss-

nuissimo fluido delle parti globulose , e dimostra che una colonna di esso non empie mai puntualmente un tubo , e che una pressione dipendente da questa pienezza , dee scemare a proporzione che il tubo è più angusto ; quindi viene , dicono , il difetto d'equilibrio tra la pressione che fassi sul liquore nel tubo , e quella che s'esercita su la superficie del vase , ove il tubo s'immerge .

Questa ipotesi è ingegnosa : dà ella azione ad un fluido , di cui non si può contrastar l'esistenza ; ma gli accorda funzioni , che si dura fatica ad ammettere . Un mezzo , le di cui parti sono più sottili che quelle dell'aria comune , e che lo sono tanto , che penetrano i pori del vetro , come mai lascia tanto vuoto nel tubo , e come s'applica così male alle pareti del vetro , che la sua pressione differisca sensibilmente da quella , ch'egli esercita al di fuori , su la superficie del vaso grande ? In oltre , perchè la pressione più libera e più intiera su la superficie del vaso , non alza i liquori ad altezze che sieno proporzionali alle loro densità ? E finalmente , per citare tuttavia l'Esperienza , vedesi manifesto , che l'effetto di cui trattiamo , non dipende da una pressione che sia più o meno libera , secondo la larghezza della base ; imperocchè in luogo d'immergere il tubo in un vaso , se si fa scorrere fuori e nella sua lunghezza una goccia di liquore , tosto ch'ella è arrivata all'orifizio inferiore , ella rimonta nel tubo come in ogni altro caso .

Ciò non ostante , altra più verisimile deduzione non han saputo recare fin ora , quelli che si sono posti a spiegar l'ascesa de' liquori ne' tubi capil-

288 LEZIONI DI FISICA

pillari, per via della pressione ineguale d' un fluido ambiente. Vediamose le opinioni della seconda classe sono più plausibili o più felici.

Queste tuttochè divise per diversi scopi, riunisconsi e accordansi in un punto: pretendono, che quando si è immersa l'estremità d' un tubo capillare, la colonnetta di liquore ch' egli racchiude, perde il suo peso per la sua aderescenza al vetro, e che cessando di pesare sul fondo del vase, ove si fa l' immersione, le colonne esteriori al tubo, e che esercitano liberamente la loro gravità, ne spingono una simile sotto la prima, un'altra sotto la seconda, e che tutte coteste parti s' accumulano in una colonna totale, la di cui altezza è proporzionale allo sfregamento, che cresce, come il diametro del tubo scema.

Ben s' intende, come una picciola colonna d' acqua, posta una volta in un tubo capillare, sievi sostenuta mercè lo sfregamento, o l' aderescenza alle parti del vetro; ma io non comprendo mica, come l' acqua del vase, per il suo peso, la spinga dal suo luogo e la sollevi, per sostituirle una colonna somigliante: imperocchè quest' acqua che attornia, ha sol quella forza che basta per spingere nel tubo una colonna che riempia la sua parte immersa, o (il che è lo stesso) non può ella portar questa colonna se non fino al suo livello; ma come ve la porterà, se convien ch' ella sollevi nel medesimo tempo una colonna simile, che occupi il luogo? Dirassi per avventura; che questa non pesa sul fondo, perchè è ritenuta dallo sfregamento del vetro? Ciò è vero, finchè ella è in quiete; ma se bisogna farla ascendere, s' ha da vincere il suo peso, o, (ch' è l' equivalen-

lente) l'adescenza, o lo sfregamento, che hanno annichilato il suo peso.

Ma per dar a vedere quanto poco s'accordi questo sistema con l'Esperienza, basterà dire, che i tubi capillari hanno i loro effetti con egual prontezza, e si compiutamente, quando sol toccar si fanno leggerissimamente i liquori, che quando vi s'immergono ben addentro; lo che in contrastabilmente dinota, che la pressione delle colonne che attorniano la parte immersa del tubo, non entra per niente in quest'effetto.

E perciò vediamo infatti, che alcuni di loro che hanno assegnata questa cagione, n'hanno oramai sentita l'insufficienza. „ L'acqua, dicono, „ rimane sospesa ne' tubi capillari, per la sua aderenza naturale al vetro; ma vi è sollevata per un'altra cagione. „ Qual è per tanto questa cagione, che viene da loro associata all'aderenza del liquore al vetro, e che spiegar ci dee gli effetti de' tubi capillari? Ell'è, dicono, la medesima forza, che fa che due gocce d'acqua s'uniscano insieme, quando molto da presso si accostano. Passiamo alla terza classe.

Qui si suppone che il vetro attragga il liquore; ma qual fondamento ha mai una tale supposizione? Come s'ha da intendere questa attrazione? e qual norma seguita ella ne' suoi effetti? Imperocchè se non se n'avessero altre prove, che il fatto di cui trattasi, e se si convertisse questa cagione in una qualità astratta, a niuna misura o norma soggetta, la cosa somiglierebbe gran fatto alle simpatie, ed alle qualità occulte de' Peripatetici, con tanta ragione sbandite dalla Fisi-

ca moderna, vale a dire, dalla Fisica ragionevole.

I Fisici che ammettono l'attrazione, (imperocchè ve n'ha un numero assai grande, a cui piace quest'opinione, nè dissimuleremo che tra quelli che l'hanno seguitata, alcuni si trovano, il nome solo de' quali potrebbe aver gran peso per favorire questo sentimento, se l'autorità dovesse essere la regola delle nostre fisiche cognizioni:) questi Fisici, dico, si spartiscono in due classi. Gli uni, conforme al vero sentimento di Neuton, considerano l'attrazione come un fatto, che ha luogo in tutta la natura, e che potrebbe avere, come tutti gli altri, una causa meccanica, ch'è lodevole rintracciare, ma che in qualche modo disperano di poter rinvenire. Gli altri trapassano ogni confine: più arditi in ciò, che non fu il loro capo, pretendono che la virtù attrattiva sia un principio, il quale non abbia altra causa immediata che la volontà del Creatore. Secondo i primi, quando due corpi s'avvicinano, e tengonsi uniti l'uno all'altro, senza che si scorga ciò che cagiona la loro riunione, o adescenza, questi è un effetto, dicono, di cui vi ha molti esempj, e a cui si dà il nome particolare d'*attrazione*, sol per distinguerlo da un gran numero d'altri fatti simili, la cagion de' quali è già nota. Secondo gli ultimi, tutto questo si fa in virtù d'una forza innata, d'una propensione naturale, per cui, da sè solo e senza alcuna impulsione straniera, un corpo si porta verso d'un altro, e opera sopra di esso avanti che toccarlo nè per sè, nè per altri corpi intermedj.

Coloro che non ammettono le attrazioni, se non

non come fatti, mi pajono starfi nell'ordinario e trito sentiere. I Cartesiani, che s'attengono il più fedelmente alle cagioni meccaniche, si fondano tutto di sopra fenomeni, de' quali è ancor oscura la cagione, e danno loro que' nomi che più ad essi piacciono: l'*aderescenza*, la *viscosità*, la *flessibilità*, la *molla* di certe materie, servono bene spesso a spiegare le loro proprietà, nè ciò sorprende o fa offesa: siccome, a mio credere, non dee far offesa ne sorprendere la parola d'attrazione, s'ella esprime unicamente un fatto, che si tralascia di spiegare.

Ma così forse si ha da giudicare della virtù attrattiva, considerata come principio della natura? Passi, in quanto a me, ch'ella non sia metafisicamente impossibile (e questa grazia non le fan già tutti;) io suppongo con quelli che meglio difesa hanno questa cagione, che il Creatore, stabilita avendo l'impulsione per causa molto ordinaria del moto de' corpi, sia stato libero a stabilir pure l'*attrazione*, e che questi due principj non sieno incompatibili; che altro se ne può conchiudere, se non che Dio è stato il padrone di adoperare due mezzi in luogo d'uno? Ma del poter forse una cosa essere, ne segue egli, che in effetto sia? Se certi moti non sono stati ancor bene spiegati con le leggi dell'impulsione, v'è forse dimostrazion che sieno inesplicabili? Or ella ci vorrebbe, per fondatamente sostenere l'introduzione d'un nuovo principio, massime sapendosi che la natura affetta tanta semplicità nelle cause, quanta fecondità negli effetti; che la mente umana limitata nelle sue cognizioni, non può mai lusingarsi d'aver veduto tutto il visibile, e

ch' ella non mai meno è stata illuminata circa gli effetti naturali, che quando si è fatte lecite le spiegazioni arbitrarie. Pare a me savissimo, e giudiziosissimo il pensiero d'un uomo dotto*, il quale aveva nel corso della sua vita avuto molte occasioni di sapere tutto quello che dir si può di favorevole per lo sistema delle attrazioni, e nello stesso tempo tutto quello, che rimproverar si può all' uso che si è fatto delle impulsioni. „Non
 „occor lusingarsi, dic'egli, che nelle nostre ri-
 „cerche di Fisica noi possiam mai superar tutte
 „le difficoltà: ma non lasciam non per tanto di
 „filosofar sempre su la base di principi chiari di
 „meccanica; le abbandoneremo questi, tutta la
 „luce che aver potremo sarà spenta: ed eccoci
 „in poco di che ringolfati nelle antiche tenebre
 „del Peripatetismo, da che ci prelevi il Cielo „.

Il Sig. Neuton vedendo ne' corpi che ci son d' intorno, quantità d' attrazioni, cioè, effetti che così nomar si possono sospettò che per tutto ve ne fossero; e fermandosi meno a spiegare questi effetti, che a misurarli; suppose che tutte le parti della materia si portassero reciprocamente l' una ver l' altre, che due corpi per conseguenza si attrassero in ragione diretta delle loro masse; che se l' un de' due per esempio, contiene una volta più di parti, la sua attrazione è doppia di quella dell' altro. Parvegli in oltre che questa tendenza reciproca de' corpi non dovesse essere egualmente forte da lontano, che da presso; ed alcune ragioni lo determinarono a credere, ch' questa azione, simile a tutte quelle, che si estendono in forma di sfera, potrebbe fors' essere in

ragio-

* M. Saurin. Mem. de l' Acad. 109 p. 131.

ragione inverfa del quadrato della diftanza, vale a dire, che in lontananza di due gradi i corpi s'attraeffero 4 volte meno, in lontananza di tre gradi nove volte meno, di quattro gradi fedici volte meno, ec.

Sin qui il tutto termina in fofpetti e conghietture; e che altro poteva farfi di più, attesa la idea medefima che s'era il Neuton formata dell'attrazione? Quefta forza, fecondo lui, è proporzionale alla maffa de' corpi; tutto quello che è in balia nofta, e sì poca cofa, in paragone del globo ful quale fiamo, che l'attrazione di quefto rende infenfibili tutte le altre piccole attrazioni particolari, come la luce del Sole impedisce, non appaia quella d'una candella. Bifognava dunque trasportare quefta ipotefi a de' corpi ifolati, e lontani affai gli uni dagli altri, per vedere, fe fi potea fupporre che fi attraeffero, efe la loro attrazione facevafi fecondo le leggi immaginate; imperocchè, lo ripeto, quefte leggi non potevano verifarfi nelle piccole attrazioni, e fe fi potea dubitarne: l'attrazione in generale era un'ipotefi mal puntellata. Il Filofofo Inglefe meglio d'ogni altro fentendo, quanto abbia d'autorità l'Efperienza nelle queftioni di Fifica, e non potendo farla parlare, almeno in modo decifivo, fu la fuperficie della terra, cercò prove in un campo più vafto, e a lui ben noto. Ragguagliò il moto de' corpi celefti con le confequenze del fuo principio, e vi trovò tanta conformità, che ognuno è tentato dicredere, che quefto grand'uomo abbia indovinato il fecreto della natura.

Qualunque vantaggio o prerogativa, che aver poffa l'ipotefi Neutoniana, fopra tutte quelle che

l'han preceduto; tuttochè ella spieghi più adeguatamente d'ogni altra il moto delle Stelle, e si estenda fino a render ragione delle loro irregolarità apparenti, il fondo o la sostanza della cosa resta sempre da discutere. Gli argomenti del Sig. Neuton (lo confesso) guidano a credere che i pianeti hanno una tendenza reciproca gli uni verso gli altri; che questa forza opera secondo le leggi ch'ei le attribuisce, ma tutto questo può essere primitivamente l'effetto di qualche impulsione fisica, nè ha osato il Sig. Neuton di negarlo. Con qual diritto dunque i suoi discepoli vogliono convertire l'attrazione di fatto in virtù inerente, in attributo primitivo; in nuovo principio? Forse che rivedendo eglino i fatti, che hanno mosso il maestro a sospettare l'attrazion generale, v' hanno altra cosa veduto, ch'egli non vide? Hanno forse scoperto manifestamente nella cosa stessa, l'impossibilità d'una spiegazion meccanica? oppure assumono per prove dell'attrazione, tutte le applicazioni infruttuose, fatte fin ora dell'impulsione, a certi fenomeni difficili da spiegarli? Le due prime ragioni non sono state per anche allegate da alcuno; e quelli che si sono avventurati recando in mezzo la terza, sono stati di buona loica privi; imperocchè non è già raziocinio regolato il dire, *questo non è colle leggi dell'impulsione spiegato, dunque è un effetto della virtù attrattiva*: bisognerebbe innanzi tutto, far due cose, 1. provare che questi due principj sussistono. 2. che il primo non può aver luogo nel fatto che si discute.

Queste sorte di fenomeni, per conchiudere una volta il nostro divisamento, che indicano secon-

do

do i nuovi Neutoniani, l'attrazione, sono dunque così frequenti come quelli che provano l'Impulsione? e s'attengono eglino alla natura per tante specialmente diverse parti, quante un potrebbe immaginarfelo? Quando si mira ben da presso la cosa scopresi che tutto quello che tanto si pena a spiegare per via della pressione de' fluidi ambienti, o per via di tutt'altra causa meccanica, toltene alcune eccezioni, si può facilmente ridurre ai tubi capillari; tal è la salita de' liquori ne' corpi spongiosi; tali sono le dissoluzioni, l'effervescenze, ed altre operazioni chimiche, dove fassi una penetrazion reciproca d'una materia ne' pori d'un'altra: che solo, che non si possa ancora qua rapportare quell'unione spontanea di due gocce d'acqua che si confondono in una, innanzi che una cagione esterna e nota occasioni il contatto? Imperocchè tutti i corpi, e massimamente i fluidi, s'esalano in vapori; sono circondati da una piccola atmosfera più rara, più porosa che la massa, e due gocce d'acqua, per conseguenza, si toccano, avanti che noi ce n'accorgiamo.

La scola d'Aristotele credeva all'orrore del vacuo, perchè sembravale di vederne de' segni in tutta la natura: l'aderenza, o combaciamento ne' corpi levigati; la difficoltà di scostare i lati o le ale d'un mantice otturato da tutte le parti la salita dell'acqua nelle trombe aspiranti, la resistenza dell'animella d'una seringa, che ha l'estremità chiusa, ec. tutti questi fenomeni, dappoichè fu conosciuto il peso dell'aria, facilmente alla vera cagione approssimar si fecero, checchè fin allora fossero stati creduti separatamente al-

trettante prove del principio oscuro. Quest' avvenimento è una lezione per quelli, che pensano di vedere dappertutto degl' indizj della virtù attrattiva. Se tutte queste pretese prove, che pare dicano la stessa cosa in tante diverse maniere sono tuttavia riducibili al medesimo genere; se tutto quello che i difensori delle attrazioni han di più forte da addurre, è soltanto il fenomeno de' tubi capillari, presentato sotto varie forme, dassi senza dubbio un circolo vizioso nel loro argomentare; imperocchè se si prevalgono della virtù attrattiva per spiegare i tubi capillari, e chiamano questi tubi medesimi in prova dell' attrazione; segue una delle due, o non provano, o la spiegazione si riduce al fatto; ed è lo stesso che supporre, come si suol dire, ciò che è in questione. Qual è l'uom di senno, che ignorando la natura e la forza del vento, creder volesse di primo lancio, che l'impulsione dell'aria è quella che fa girare tutti i mulini da vento, che trasporta i vascelli da un capo all'altro dell'Oceano, e che opera tutti i moti di tale spezie? massimamente se egli avesse in tutta la sua vita veduto de' mulini abbraccia, e delle barche tirate con delle corde.

Ma supponiamo per un momento, che la virtù attrattiva sia provata in altra guisa, e vediamo quel ch'ella possa, maneggiata da più valenti Neutoniani per spiegare l'effetto de' tubi capillari, per occasione de' quali siamo in questo divisamento intorno all'attrazione entrati.

„ Il vetro, dicesi, attrae l'acqua più di quel
 „ che l'acqua attraga sè stessa: tosto che l'orificio del tubo viene a toccarla, ella s'innalza
 „ fin

„ fin a tanto che il suo peso faccia equilibrio alla
 „ virtù attrattiva , che risiede nella superficie in-
 „ teriore del tubo.

„ L'acqua sollevasi più alto ne' piccioli tubi ,
 „ che ne' grossi ; perchè la loro superficie è più
 „ grande relativamente alla solidità della col-
 „ na d' acqua , e le parti del mezzo sono meno
 „ lontane dal vetro che le attrae.

„ Il mercurio si tiene più basso del livello in
 „ cotesti piccioli tubi , perchè essendo più denso
 „ che 'l vetro , attrae più sè stesso , di quel che
 „ il vetro possa lui attrarre.

A prima vista l' attrazione fa quì bella mo-
 stra ; ma esaminiamo più da vicino la cosa , e
 seguitiamo passo passo le conseguenze del princi-
 pio , che serve di fondamento a queste spiegazio-
 ni . Tutti i corpi penetrabili dall' acqua , e che
 per questo conto debbonsi considerare come tubi
 capillari , non ammetton forse ne' loro pori , e
 non sollevano sopra del livello , i fluidi meno
 densi di loro ? L' altezza della colonna elevata nel
 tubo , è forse regolata sempre dall' eccesso d' attra-
 zione del vetro , e dalla gravità specifica del li-
 quore ? Non si vede egli de' liquori più pesanti ,
 sollevarsi nel tubo medesimo , più su che altri i
 quali son più leggieri ? Si fa , che l' Esperienza
 risponde a queste quistioni poco favorevolmente
 alla spiegazione poc' anzi da noi veduta . Ma la-
 sciamo ragionare uno de' più ingegnosi partigiani
 dell' attrazione * . Ecco la sua obbiezione .

„ E' un fatto costante , che i liquori si solle-
 „ vano ne' tubi capillari in ragione inversa del lo-
 „ ro

* M. Jurin Trans. Phil. n. 255. art. 2. e n. 363.
 art. 2.

298 LEZIONI DI FISICA

ro diametro : quindi è che se la colonna elevata sopra del livello , farà un pollice alta in un tubo largo mezza linea , in un tubo una volta più grosso averà 6 linee . Ma quest'ultima colonna, benchè più corta , comprende più acqua, come si fa , della prima ; pure la superficie del vetro che tocca la più minuta e sottil colonna, e maggiore che quella che contiene l'altra colonna, avuto rispetto alla quantità dell'acqua . La forza attrattiva non è dunque proporzionale alla superficie interna del tubo ; o (il che ammetter non si può) la cagione medesima non avrebbe un effetto costante .

Il Sig. Jurin * avendo esposta con questa difficoltà , e con decisive Esperienze , l'insufficienza della precedente spiegazione , glie ne sostituisce un' altra . Egli pretende che l'attrazione del tubo adoperi sol per la parte anulare dell' interna superficie , ove termina la colonna di liquore . Fonda egli la sua opinione sopra ingegnose e speciosissime Esperienze . Immerge il tubo AB Fig. 15. formato di due parti AC, CB, le quali hanno diametri assai differenti . Quantunque un tubo della grossezza di CB non potesse sollevare il liquore se non al punto E, se tuttavia egli s' empie fino in D, l'acqua vi resta sospesa, purchè questa porzione del tubo sia d' un tal diametro , che un tubo della sua grossezza dovesse inalzar l' acqua all' altezza B D.

E se

* Le dissertazioni di M. Jurin si trovano alla fine delle Lezioni di Fisica sperimentale di M. Cotes , tradotte in Francese da M. le Monnier. Parigi, 1740.

S P E R I M E N T A L E. 299

E se si rovescia questo tubo, come FG, l'acqua non s'alza e non riman sospesa se non nel punto F, altezza alla quale ella solleverebbe col mezzo d'un tubo il qual fosse, in tutta la sua lunghezza, d'un diametro uguale alla parte F.

Appar dunque da talisperimente, siccome il Sig. Jurin ha osservato, che se l'altezza delle colonne d'acqua sostenute, dipendesse dall'attrazione di tutta la superficie interna, il liquore non dovrebbe sostenerfi più alto che il punto E nella prima; e nella seconda eccederebbe l'altezza F, poichè la più lunga parte del tubo che la contiene, è, per supposizione, d'un diametro idoneo a farla ascendere una quantità eguale a BD. Questa elevazione, o sospensione di liquore, dipende dunque più tosto dalla parte anulare del vetro ove termina la colonna; poichè l'altezza dell'acqua si cambia in un col diametro di quest'anello.

Il dotto e giudizioso autore di queste sperienze, meno adoperando per anticipata opinione in favor del sistema delle attrazioni da lui non abbandonato, che per amore della verità preferita da lui ad ogni cosa, non dissimula niente, ma reca in mezzo tutto quello che indebolir può la sua opinione; la prima sua Esperienza può essere fatta in modo che provi troppo, e diventi ella stessa un nuovo fenomeno, che merita d'essere spiegato.

In luogo del tubo AB, Fig. 15. si serve egli d'un imbuto, che aver può molti pollici di larghezza, e che finisce in tubo capillare, siccome si può vedere nella Fig. 16. Se quest'imbuto così rovesciato, non eccede l'altezza alla quale si
po-

potrebbe elevar l'acqua in un tubo grosso, come la parte H, potrà resar pieno affatto, come DB della precedente Esperienza. Se l'attrazion anulare sostiene la colonna HI, come la grande quantità d'acqua, che la circonda, si sostiene mai?

Non si è mancato di rispondere; che cotesta massa d'acqua è sostenuta dall'attrazione della parte convessa, cioè, che ogni punto del vetro K; L, ec. attrae la colonna, che gli è sotto-messa; ma una nuova Esperienza distrugge questa risposta.

Quando si dà all'imbuto la forma ch'egli ha nella Fig. 17. e si riempia solo in parte, più però di quello ch'esser lo potrebbe, se l'acqua vi si sollevasse in virtù unicamente della proprietà del tubo capillare; se si tocchi l'orifizio superiore col dito inzuppato, così che vi entri una goccia d'acqua, la colonna resta sospesa, come se egli fosse affatto pieno: non è più allora la parte convessa del vetro che l'attrae.

A questo modo il Sig. Jurin confuta le spiegazioni, nelle quali intruttuosamente è adoperata la virtù attrattiva; ma questo principio, ch'ei non crede di dover abbandonare, gli porgerà poi una volta il vero scioglimento del modo? Ella è sempre util fatica, distruggere le insufficienti ragioni, le quali sono tanti ostacoli nel sentiero della verità, tolti i quali s'appiana il cammino. Non perdiam di vista questa materia, trattata così per le mani d'un uomo, che pare averci posto uno studio ed una profonda applicazione, più di qualunque altro che a lui precedente.

Con ragione accordando il Sig. Jurin, che
non

S P E R I M E N T A L E. 301

non si può verisimilmente attribuire la sospensione di tutta la massa d'acqua nell'imbuto, all'aderenza ch'ell'ha con la piccola colonna del mezzo, che è immediatamente attratta dalla parte capillare H; e vedendo per Esperienze replicate nel vuoto, che il peso dell'aria grossolana non ha parte in tali effetti con ottime intenzioni verso l'attrattiva virtù e con tutta la destrezza d'un Fisico avvezzo da lungo tempo alle sperienze, finalmente è costretto di ricorrere alla pressione d'un mezzo tanto sottile, che penetri il recipiente, e che adoperando più liberamente tu la superficie del vaso che vi è immerso, esser può la cagione di cotesta sospensione sopra del livello. Che altro è ciò, se non riconoscere l'insufficienza dell'attrazione a spiegare le proprietà de' tubi capillari? ma saria desiderabile, che molto più si dicesse per far conoscere come questo mezzo sottile, che si ammette, comprima più liberamente l'acqua del vaso, che la contenuta nel tubo.

M. Cleraut * in una dotta Dissertazione, ch'egli ha poc'anzi data in luce, applica felicemente alcuni principj da lui posti e stabiliti in prima, ai fenomeni de' tubi capillari. A lui pare; che il Sig. Jurin non adoperi nell'esame di questa questione, principj che bastino, per trarne una spiegazione completa; e in vece d'attenersi, come fa egli, alla sola attrazione del picciolo anello di vetro che termina la colonna di liquore, esamina il fatto secondo le leggi generali dell'idrostatica, e calcola poi, quanto l'attrazione possa

alte.
* Teoria della Figura della terra, tratta da' principj dell'Idrostatica.

302 LEZIONI DI FISICA

alterare il livello, quando il tubo è capillare. Le sue deduzioni sono all'Esperienza in tutto conformi; ma quello che vi ha di singolare, si è che secondo la teoria di M. Cleraut, tant'è lungi che l'effetto provenga dall'attrazione della parte superiore del tubo, a cui sembra che attribuir si debba, secondo le sperienze del Sig. Jurin, che al contrario è la parte inferiore quella che adopera; e la superiore non ci ha parte veruna, la sua attrazione essendo contrappesata, da una attrazione eguale, nella parte mezzana del tubo.

Da tutto questo risulta, che questi fenomeni o non sono per anche bene spiegati, o che le spiegazioni che se ne danno; s'attengono ad ipotesi, non ricevute generalmente. Forse ciò nasce, dall'esserfi i Fisici ostinati a voler produrne una sola e unica cagione; quanti effetti naturali vi sono, che hanno più cause, e che non si possono per tutte le lor facce conoscere, fuorchè esaminandoli sotto diversi punti? La pressione ineguale di qualche fluido è probabilmente il punto fondamentale della spiegazione, ma l'aderescenza o la viscosità naturale de' liquori, la grandezza e la figura delle loro parti, e forse un certo movimento lor proprio ec. sono altrettanti mezzi che può la natura impiegare per così fatti effetti, e sono altrettanti oggetti che considerare dobbiamo nelle nostre ricerche.

APPLICAZIONI.

Quantunque ben chiaramente da noi non si veda, qual sia la cagione immediata dell'elevazione e della sospensione de' liquori ne' tubi capillari,

ri, questi fenomeni ben liquidati sono di non poco momento, perchè pare che abbiano gran parte nelle operazioni della natura, e perchè quello che ne sappiamo; ci può guidare a molte altre scoperte. Non sappiamo bene qual sia la vera cagione della gravità de' corpi; tuttavolta mercè la cognizione che abbiamo delle sue leggi, siamo in istato di render ragione di moltissime cose, che sarebbero altrimenti sepolte in una profonda oscurità. Similmente, quando io so che i liquori sollevansi, ad onta della lor gravità, ne' canali angusti, di qualunque materia e figura che sieno, non rimango più attonito nel trovare umidi sino, alla cima, ora un mucchio di sabbia, ora una pietra tenera, ora un troncone collocato in piedi; ec. eziandio se questi corpi non foran se non in parte immersi nell' acqua. Imperocchè, essendo porosi, l'acqua vi trova de' piccoli canali, per li quali ascende, come farebbe in piccioli tubi di vetro, perchè in un canale eguale diritto, il liquore oppone tutto il suo peso alla causa che lo solleva, dovechè ne' passaggi tortuosi, che gli porge l'interno d' un corpo solido, egli trova come de' riposi, dai quali ripiglia probabilmente le sue mosse, e forse con nuovo vigore.

Ma quello che vediamo succedere in piccolo, non potrebbe forse avvenire anche in grande? Il mucchio di sabbia bagnato sino alla sommità, forse spiegar potrebbe l'origine di certe sorgenti inesaurite, che somministrano sempre un' egual quantità d'acqua, e che par non ne sien debitrice alle stagioni, nè ai vapori, nè ad altre influenze dell' atmosfera, e che si trovano eziandio vicine al mare. Questi è un pensiero molto plausibile,

bile, e che da molti autori * è stato ricevuto; tuttavia egli perde una parte della sua verisimiglianza, se si bada, che un tubo capillare non produce mai effluvio per la sua parte superiore, e che la sabbia, tuttochè ammollata molto più sopra del livello dell'acqua, lo è quasi solamente nell'interno, o se lo è anche al di fuori, non ne nasce sorgente.

Il troncone, che si ammolle e s'inzuppa fino in quella parte che non è immersa; può svegliare alcune idee sopra l'arcano della vegetazione; si sa che le piante crescono, per quell'umor nutrizio, il quale passa dalle radici al gambo, e da questo ai rami; ma qual è la potenza che solleva così questo liquore? ciò tuttavia s'ignora; Finchè se ne venga a chiara notizia, si potrebbe forse considerare que' sentieri per li quali il detto succo scorre, quasi tanti piccioli canaletti capillari, o come un tessuto continuo di corpi spongiosi, per li quali trasportarsi di giù in su, e più o meno abbondantemente, secondo lo stato attuale delle parti che lo ricevono.

Ma il più mirabile in ciò, si è che cadauna fatta di piante par ch'abbia il suo particolar umore o succo nutrizio; imperocchè è noto che la terra si vuota, e s'esaurisce a forza di nutrire la medesima spezie, e che le si dà sollievo, dirò così; con variar la semenza sul medesimo fondo. Come dunque in un giardino ciascun albero riceve il nutrimento che gli è proprio! come il pomo non piglia il succo conveniente alla

* Plot. *Tentamen Philosoph. de origine fontium.*
Derham. *Theolog. Phys.*

la vite? come il mirto non succia quel che appartener dee al gelsomino, o al caprifoglio?

Non si può a tali questioni di presente rispondere se non imperfettamente, perchè siamo tuttor poco informati di quello che in realtà succede per cotal verso. Ma se è vero che i canali che portano l'umore nutrizio, faccian l'opra de' tubi capillari, presentasi un esempio di questo genere, che potrebbesi riputare per una rozza imitazione della natura, quanto all'oggetto presente. Se si porranno in un medesimo vase due liquori assai diversi l'uno dall'altro, come olio, vino, e vi s'immergeranno due capi di striscia di drappo, una delle quali sia stata imbevuta di vino, e l'altra d'olio, entrambe si diporteranno come una spugna, ma la prima non tirerà a sè se non il vino, l'altra l'olio solamente. Tutti i corpi di questo genere sono atti a sollevar liquori; ma impregnansi dell'uno più tosto che dell'altro, secondo l'analogia ch'egli ha con loro. Questa analogia consiste senza dubbio nella figura, nella grandezza, nella disposizione delle parti, &c. ogni specie di pianta fa forse non so che di simile, e per le medesime ragioni.

E' vero, che la salita de' liquori in un piccolo tubo di vetro, ad alcuni pollici di altezza, paragonata coll'elevazione del sugo nutrizio d'una quercia, o d'un abete, lascia scorgere una portentosa differenza, e fa quasi credere, che questi due effetti non abbiano una sola ed unica cagione. E appunto perciò non ho accennata questa comparazione, come una spiegazione completa; i canali dell'umor delle piante non son meri tubi, ma sono organizzati; e per questa ragione

a lor funzione di tubi capillari può avere effetti ai quali egli sarebbe incapace di estendersi, se, fosse altrimenti. Un tronco, od un albero morto sul suo fondo, più non vegeta; non già perchè manchino in esso i canali dell'umor nutritivo; ma perchè l'organizzazione è distrutta.

Esaminando noi nella sesta Lezione, come i vapori e l'esalazioni sollevino, e sostengansi nell'atmosfera, supposto abbiamo, che questa massa d'aria la qual copre la superficie del nostro globo, sia una gran spugna la quale riceve ne' suoi pori tutte le parti esalate delle materie pertinenti alla terra; ecco quello che render può probabile questa opinione.

1. L'aria è compressibile; quest'è un fatto che non ammette dubbio. Qualunque figura che si dia alle sue parti, bisogna sempre concedere, che elleno non sono così strette le une appresso dell'altre, come lo potrebbon essere, e che vi ha de' piccioli intervalli, che si schierano, dirò così l'un dietro l'altro, e si toccano, sicchè formano de' canaletti tortuosi, più o meno capillari in un tempo che in un altro, secondo la densità attuale dell'aria; e che si possono riempire di tutt'altra materia.

2. I vapori e le esalazioni, quando sono staccate dalle masse, di cui facean parte, sono nello stato di fluidità; e per questa ragione sono suscettibili, come i liquori, di tutti gli effetti propri de' tubi capillari.

3. Siccome i liquori si sollevano più o meno alto, secondo lo stato attuale de' tubi capillari, cioè secondo la grandezza del loro diametro, e l'analogia della lor propria materia con quelle, ch'

ch'è san montare; così riputar si può come cosa indubitata, che i vapori ascendano più o meno, secondo la disposizione dell'atmosfera.

Qui presentasi una difficoltà notabile. Per la terza Esperienza, *Fig. 14.* si sa, che il liquore tanto più sollevasi nel tubo capillare, quanto il tubo è più angusto. I pori dell'aria sono più chiusi e ristretti nel verno che nella state; ne segue, secondo la mia ipotesi, che i vapori devono dunque sollevarsi più alto nell'inverno che nella state, lo che non è verisimile.

Nè io tampoco lo credo, che più alto si sollevino; ma concederei volentieri ch'eglino sollevansi appresso a poco alla medesima altezza in tutte le stagioni; imperocchè quali prove abbiain noi del contrario? e il barometro essendo d'ordinario un po più alto l'inverno che la state, bisogna bene che qualche cosa mantenga, ed anche aumenti il peso dell'atmosfera; la densità dell'aria aumentata nelle stagioni fredde, compenserebbe forse ella sola la diminuzion de' vapori? Quando si volesse ciò conchiudere, non si potrebbe, avvertendo che le evaporazioni sono molto abbondanti anche nel gran gelo; se quello che allor svapora, trova troppo angusto sito nell'aria, dee dunque cercarne più alto. Oltre che ell'è una supposizione generalmente accettata, che la temperatura dell'atmosfera non varia tanto nella mezzana regione ove sollevansi i vapori, quanto quaggiù su la superficie della terra; la porosità dell'aria vi è dunque appresso a poco la stessa in ogni tempo. Or l'Esperienza del Sig. Jurin, *Fig. 15.* ci addita che l'elevazione de' liquori ne' tubi non dipende dalla larghezza che

398 . LEZIONI DI FISICA

hanno nel lor dilungo ; ma da quella dove termina la colonna ; così qualunque cambiamento che quaggiù avvenga alla densità dell'aria , se la mezzana regione poco si muta , siccome con tutti i Fisici è giusto supporlo , la conseguenza che segue dalla mia ipotesi ; non è una obbiezione , che la debba far rigettare .

4. Siccome un tubo capillare che sostiene una colonna di liquore , o siccome una spugna piena d'acqua , non ne attigne di più : così anche l'aria troppo caricata , non tira su maggior copia di vapori ; le acque , e generalmente tutti i corpi svaporano molto meno in un tempo umido e di calma , che quando spira un vento secco . Nel primo caso , l'aria è una spugna caricata di liquore , nel secondo , una spugna vuota , e che di continuo rinovasi su le medesime superficie .

5. Tutti i Fisici accordano , che ciò che fa cadere i vapori in forma di pioggia , è qualche grado di freddo , che condensa la parte dell'atmosfera , dov' eglin regnano , e che ravvicinando le particelle d'acqua , le unisce in gocce così pesanti , che un pari volume d'aria non le può sostenere ; questa spiegazione , la quale è naturalissima , non distrugge l'idea , ch'io mi formo dell'atmosfera : l'aria che si condensa , è una spugna premuta , e attribuisco questa compressione non solo al raffreddamento , che può essere la cagione più ordinaria , ma eziandio ai venti , che restringono le nubi , cioè la parte dell'aria ; carica d'acqua ; e in fatti la pioggia (particolarmente la tempestosa) cade per lo più a scosse , simili affatto allo spremimento d'un corpo spugnoso , pieno d'acqua .

6. Vi sono certe pioggie, che vengono all'improvviso, con un tempo quieto e caldo; di tal maniera che si stenta a conciliarle con le cause, delle quali poc'anzi abbiamo parlato; pare a me che nella mia ipotesi molto bene anch'esse si spieghino: Quando un tubo capillare ha innalzata l'acqua a due pollici, in virtù d'un diametro; che ha sol un quarto di linea; se diventasse la metà più largo, ben si capisce che l'acqua non vi resterebbe alla stessa altezza; una spugna, che contiene particelle d'acqua, le lascerebbe scorrer fuori, se per qualche mezzo, ella venisse dilatata al di là del naturale suo stato. Fate che un raggio di Sole diretto, o riflesso, riscaldi, e per conseguenza rarefaccia una parte dell'atmosfera, carica di vapori, in sufficiente quantità: questo piccole masse, lasciate in balia del loro proprio peso, cominceranno a cadere, e si uniranno in forma di pioggia, nel tempo della loro caduta. Questa spiegazione sembra eziandio confermata dall'Esperienza; imperocchè quando cominciasi a rarefar, con la macchina pneumatica, l'aria contenuta nel recipiente, non si lascia di scorgervi un vapore, che cade come una pioggia sottile sopra la piastrina*.

Con attribuire all'atmosfera le proprietà de' tubi capillari, sembra che si sbandisca, per quello riguarda tal fenomeno; ogni spiegazione appoggiata alla pression d'un fluido ambiente, che pur appare il principal fonte de' lumi sperabili su questa oscura materia: imperocchè se la massa d'aria adopera come i tubi capillari, non si può

V 3

* *Memoir. de l'Academ. des Scienc. l'An. 1740. pag. 243.*

310 LEZIONI DI FISICA

più pensare a render ragione di quest' effetto con la sua pressione.

Questa considerazione ci dee rendere circospetti; ma non deve già ostare all' ammettere una verità, la quale fosse altronde ben provata: in secondo luogo, le sperienze fatte e ripetute nel voto da un gran numero di Fisici, hannoli costretti a confessare comunemente, che l'aria grossolana, di cui qui si favella, niente contribuisce ai mentovati fenomeni: e lasciando noi da parte nella presente questione, il peso di questo fluido, non rigettiamo in veruna maniera, nè altro mezzo più sottile, di cui generalmente si conviene tra Fisici, e che aver può le sue funzioni a parte.

ARTICOLO II.

Intorno alle cause della fluidità e della durezza de' Corpi.

QUANDO ho definito i fluidi nella Lezione precedente, li ho rappresentati, come ammassamenti di corpuscoli solidi, mobili cotanto, gli uni rispetto agli altri, che al menomo urto si separano. Parecchi Fisici pretendono, che non basta attribuire una grande mobilità alle parti de' fluidi e de' liquori; si vuol di più, e con ragioni plausibili, che oltre l'essere dispostissime a muoversi, si muovano in effetto. Alcuni tuttavolta più ritenuti, in quello che concerne un tal movimento, sol quello n'ammettono, che abbi-

so-

SPERIMENTALE. 311

fogna per spiegare certi fenomeni, de' quali credono che si durerebbe fatica a render ragione, senza una tale supposizione: danno a questo moto intestino de' liquori, ogni sorta di direzioni immaginabili, e nello stesso tempo gli danno sì poca estesa, che non giugne a smuovere sensibilmente di luogo le parti. In questi limiti contengono i più di coloro, che hanno più familiarità le osservazioni e le sperienze, che i sistemi. Allora questa specie di agitazione attuale de' fluidi non differisce da quella, che il calor naturale mantiene ne' solidi; e se questo moto è la cagion immediata di certi effetti, che son proprij de' liquori, io son molto stimolato a credere, che ciò avviene solo in conseguenza della grande mobilità delle parti, ch'egli avviva. Spiegomi con un esempio. Una piccola motta di terreno, dissolvesi più facilmente nell'acqua (quand' anche fosse vicina a gelarsi) che nella neve, la quale avesse soltanto quel freddo che le abbisogna per non liquefarsi. Questa differenza nasce ella forse da un eccesso di moto nelle parti dell'acqua come liquida? o pur dal troppo poco di mobilità nelle parti della neve? Finchè l'acqua è liquore, il grado di calore ch'ella ha, appartiene a parti libere, e che per una così fatta indipendenza reciproca, seguono le loro determinazioni particolari, e penetrano i pori del corpo dissolubile: non è già la stessa nella neve, le cui molecole sono legate sotto la forma di piccioli diacciuoli; elleno son determinate, come quelle dell'acqua, verso i pori che son loro aperti; ma per entrarvi bisognerebbe ch'elleno si spartissero in volumi proporzionati alle aperture, e se il moto che in lor si sup-

312 LEZIONI DI FISICA

pone, non giugne a cagionare, e mantenere la lor divisione, non debbe avere il medesimo effetto, che egli hà nell'acqua: ma tutta la differenza, siccome vedesi, non nasce che da un difetto di mobilità sufficiente nelle parti.

Io crederei dunque volentieri, che i liquori non hanno in sè stessi un moto particolare, che tali gli renda; ma ch'eglino sono in questo stato solamente perchè le loro parti son estremamente mobili fra esse. L'oggetto di quest'articolo è dunque, far conoscere, per quanto si potrà, ciò che può mantenere questa rispettiva mobilità; e però che esser duro è lo stato opposto a quello di liquore, le cause dell'uno, indicar ci debbono quelle dell'altro. Vediamo prima, per qual cagione certi corpi son duri, ed altri meno, e come possa farli che nol sieno sensibilmente. Con questa divisione, abbracciamo tutti i differenti gradi di consistenza, che convengono alla materia, *durezza, mollezza, fluidità, liquidità*.

Non trattasi qui d'una durezza perfetta, quale converrebbe, per esempio, alle parti inescabili ed elementari, agli atomi. Ciò che presentemente forma l'oggetto delle nostre ricerche, è quella coerenza che costituisce una massa solida; che s'oppona alla sua divisione, ma che può sempre cedere ad una forza finita; tal è la durezza del legno, delle pietre, de' metalli &c.

Se i corpi fossero duri solamente all'esterno; se i pezzi che compongono la loro solidità, fossero così grandi, che ci lasciassero scorgere le lor figure, e la proporzione mutua fra loro; se niente di quanto è materiale potesse a' nostri sensi sot-

SPERIMENTALE. 313

sottrarsi, forse lusingar si potremmo di dare una spiegazione diretta de' fenomeni qua' pertinenti. Ma i corpi son solidi internamente come all'esterno, e le loro molecole più sottili nol son meno, che la massa totale; quindi la causa di tale coerenza, opera sopra soggetti che sfuggono dagli occhi; ed in luoghi, dove non le possiam tener dietro. Per sola analogia dunque e per conghiettura giudicar ne possiamo: questa strada non è la più sicura per giungere al vero: ma possiamo permettercela, quando non ne abbiamo una migliore; oltre che servendosene con moderazione, ci può ella guidare ad utili scoprimenti.

PROPOSIZIONE.

Più corpi possono insieme attaccarsi, per la pressione d'un fluido, che li cuopre; o che li attornia da tutte le parti.

PRIMA ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

Il pezzo A, *Figura 18.* è un boccone di foghero cilindrico, la cui base è guernita d'una staffa, e d'una piastrina di rame sottile, e ben diritta: in maniera che il tutto insieme pesa meno che dell'acqua. B è un pezzo somigliante per la forma, ma che è intieramente di metallo. Si tingono i due piani con un leggiero strato d'olio d'olive, e dopo d'averli puntualmente applicati l'un sopra l'altro, s'alluogano come a, b, nel son-

fondo d'un gran vase, il qual si riempie d'acqua.

EFFETTI.

Quantunque il pezzo *a* sia più leggiero d'un pari volume d'acqua, e questa leggerezza rispettiva lo solleciti a separarsi dal pezzo *b*, che è ritenuto dall'eccesso del suo peso nel fondo del vaso, puro vi resta costantemente attaccato.

SPIEGAZIONE.

Quest'effetto proviene, dal non essere la colonna d'acqua che riposa perpendicolarmente sopra, contrappellata da verun'altra, che adoperi di sotto, a causa dell'unione stretta delle due superficie. Che questa ne sia la vera ragione, si prova: perchè se cotesti due pezzi, in luogo d'olio, si bagnino d'acqua, per unirli, rimessi poi nell'Esperienza, la massa d'acqua onde si cuoprano li disunisce, introducendosi frammezzo l'un e l'altro, poichè non vi trova fuorchè una materia a sè simile, la quale non gli fa ostacolo, come un liquor grasso.

II. ESPERIENZA.

PREPARAZIONE.

C D, Fig. 19. son due scatole di rame, nelle quali si sono inserite ed incollate due placche di marmo ben lavorate, ovvero due lastre di specchio grossette. Sopra la staffa della scatola C, si son congegnati quattro piccoli cannoncini, che ricevere debbono altrettanti piccioli schidioni di legno, i quali sanfi eccedere il piano del marmo, quando n'è l'uopo.

EFFETTI.

1. Ammollati che si sono i due marmi, e applicati l'un contro l'altro, sfregandoli un poco, per rendere più puntuale il combaciamento, e per scacciarne via tutte le particelle dell'aria ch'esser vi potessero, queste due placche separansi facilmente, se lo sforzo si fa parallelamente ai loro piani.

2. Ma se quando sono unite, si caccian ben entro i piccioli schidioni, per impedire che sdruciolino; o se si tirano perpendicolarmente alle loro facce, convien adoprare una forza notabilissima per separarle.

SPIEGAZIONE.

Questa Esperienza, la quale è antica, serviva un tempo per prova dell'*orrore del vacuo*; ma dopo

216 LEZIONI DI FISICA

po che si è scoperto manifestamente l'abuso di queste parole, che nulla significavano, ella si è spiegata meccanicamente, mercè la pressione dell'aria, che attornia i due piani applicati. Si sa, che i fluidi pesano per ogni verso; questo peso è una forza che deve avere il suo effetto, se qualche azione o potenza contraria non la tiene in equilibrio; cotesti due piani, uniti insieme, e sottoposti al peso dell'atmosfera, non debbon portarsi nè da un lato nè da un altro, perchè sono egualmente premuti da tutte le parti, ma ciascun d'essi è spinto contro il suo simile, e deo starvi attaccato, perchè fra i due piani non vi è reazione che s'opponga al peso dell'aria esterna: Per una simil ragione, i fanciulli sinovono o trasportano delle pietre con una rotella di cuojo ammollato, che attaccano, e tirano con una corda. Un'ombrella, o parasole disteso, e rovesciato, radente a un terreno pulito ed eguale, fa ancor egli resistenza sensibilissima, quando si tira alla rimpazzata: essi corre rischio di rompere una lastra di specchio, che si leva su perpendicolarmente al piano, sul quale ella riposa, se questo piano è levigato ed eguale assai.

Nulla ci sarebbe da opporre a questa spiegazione; se i nostri due marmi, dopo d'essere stati uniti nell'aria, si separassero da sè stessi nel vuoto, come si dice comunemente che accada. Ma quando si procede con esattezza e si schifano tutti i moti stranieri che possono ajutare la separazione, forza è confessare, che spessissimo l'unione sussiste, dopo rarefatta l'aria quanto è mai possibile con una perfetta macchina pneumatica. L'aderenza, o lo stretto combaciamento per ordina-

dinario va scemando, ma non cessa intieramente, ed il grado di forza che gli resta; e che io ho procurato di misurare con dei pesi, m'è sembrato dipendere dalla natura de' piani, dalle lor dimensioni, e dalle materie interposte per unirli; Vedi la Fig. 20.

Quest' effetto tanto più merita attenzione, quanto che ha luogo non solo ne' corpi solidi, ma eziandio ne' liquori. Il Sig. *Hughens* * osservò egli il primo, che l'acqua restava nel vuoto molto più alta del suo livello, e che quello che ci mancava, non si potea attribuire a quella picciola quantità d'aria, che una buona tromba lascia necessariamente nel recipiente. Dopo lui, il *Boyle* avvertì la medesima cosa, e s'avanzò con l'Esperienza, fino a sostenere 75 pollici di Mercurio nel tubo Torricelliano, cioè 47 pollici di più che sostener non può il peso dell'atmosfera. Una circostanza essenziale da osservarsi, si è che i liquori non rimangano così sospesi, se non quando toccano immediatamente la sommità del vase nel quale sono; imperocchè ogni poco di vuoto, una picciolissima bollicola d'aria che vi s'incontri, sempre impedisce o fa cessare codesto effetto; di maniera che non occor aspettarfi di vedere una colonna di mercurio di 75 pollici, alzata al di sopra del suo livello in un tubo più lungo di questa misura.

Il Sig. *Hughens* cercando una spiegazione a cotai Fenomeni, vuol dire, all'aderenza o combaciamento tenace de' due marmi, ed alla sospensione de' liquori nel vuoto, suppone, che oltre l'aria crassa che circonda tutti i corpi, e che

ope-

* *Recueil de l'Acad. des Scienc. Tom. 10, p. 529.*

318 LEZIONI DI FISICA

opera col suo peso sopra le loro superficie, ve n'è un'altra ancora più sottile, la quale passa, dove non può penetrar la prima, ed a cui i pori stessi del vetro danno libero passo; e che alla pressione di questo sottile mezzo, od ambiente attribuir si debbe un infinito numero d'effetti, che abbiamo di continuo sotto gli occhi, e ch'è impossibile spiegare con l'azione dell'aria comune e nota, l'assenza, o la rarefazione estrema della quale chiamasi impropriamente il *vacuo*.

In quanto all'esistenza d'un cotal fluido, pochi Fisici vi sono, da quali non sia ammessa; e nel picciolo numero di coloro che s'ostinano a negarla, non possiamo contenerci dalla maraviglia quando vi troviam di quelli, che incontrastabilmente hanno un genio felice per le osservazioni, e sono avvezzi alle sperienze. Imperocchè non ci è lecito supporre, che codesti ignorino i fatti, che citar si possono a favore di questa opinione. Di tutti i Filosofi moderni, quegli, alle cui opinioni pare che meglio s'affaccesse il vacuo, fu il Sig. Neuton, or'egli non ha lasciato d'ammettere *un mezzo molto più sottile dell'aria, il qual mezzo, dic'egli, resta nel vuoto, dopo che se n'è tolta colla macchina pneumatica l'aria* *. Vedesi dall'uso ch'egli ne fa, dall'estensione che gli dona, dalle funzioni che gli attribuisce, quanto ei credeva che questa sottil materia potesse aver parte nelle operazioni più segrete della natura. Il Sig. Jurin, più puntualmente Neutoniano che la maggior parte de' seguaci della virtù attrattiva, non fa difficoltà ve-

runa

* Trattato dell'Optica l. 3. qu. 18. &c.

runa, siccome l'abbiam detto di sopra, d'ammettere quest'aria sottile, quando trova mancargli nel bisogno l'attrazione; e per risparmiar la fatica di provarne l'esistenza, si rimette all'autorità, ed ai passi da noi poc'anzi citati.

Se codesto mezzo resistente è da quei medesimi ricevuto, a' quali meglio conveniva oppugnare il sistema del Piano, chi non vede essere superfluo fermarsi qui a provare, quanto meriti d'essere ricevuto da ogni Fisico che ammettesse le ragioni meccaniche; perciò basterà dire che dopo il Cartesio, la regola più generalmente osservata, è stata quella di cercare una spiegazione, nell'urto o nell'impulsione de' fluidi invisibili, di tutti i fenomeni che non possono spiegarsi con l'azione dell'aria sensibile, o degli altri corpi, de' quali possiam vedere le operazioni.

Ciò che ordinariamente fa strabiliare coloro; che s'appigliano ad un altro partito, si è la fecondità degli effetti, e il gran numero di proprietà, che si suppongono, nel divisamento de' fenomeni, e s'attribuiscono ad una materia, la cui esistenza è tuttavia presso che ipotetica.

Vero è, che alcuni Filosofi han lasciato libero campo alla lor immaginazione, per spiegare le diverse funzioni di cotesti fluidi sottili; ma quando anche il Cartesio si fosse ingannato quanto al numero, e ce ne fossero più o meno di tre forte; quand'anche i moti speziali delle parti di essi fluidi fossero diversissima cosa dai vorticetti, immaginati dal P. Malebranchio; per farla corta, quand'anche si potesse avere in conto d'arbitrario sistema, tutto quello che è stato detto circa la maniera d'essere e d'operare di cotesta

testa materia, la quale può essere per tutto dove gli altri fluidi più grossolani non hanno accesso: seguirebbero forse, che la sua esistenza fosse dubbia? Perfettamente convengono tutti oggidì ed affermano; darli una materia *, che ci rischiara, e che ci fa veder gli oggetti: Averrebbe forse diritto di negarla, perchè intorno alla natura delle sue parti, ed alla sua propagazione, molti e varj sono i sentimenti?

Raffreniamo del resto la nostra immaginazione, siccome è dovere, in un'opera, ove s'iamci prefissi d'insegnare altrui sol per mezzo de' fatti; s'ammetta da noi bensì l'aria sottile con quasi tutti i Fisici; ma non le si attribuisca se non quello che sembra indicato da' fenomeni in modo chiaro e distinto; nè si supponga se non ciò che la più semplice e la più conseguente analogia potrà permetterci.

L'aria sottile fa sentirsi nel vuoto Boileano; passa ella dunque a traverso de' pori del vetro; e si può presumere, ch'ella penetri parimenti in tutt' i corpi solidi.

Ma questa sua prima proprietà, non la rende incapace degli effetti che le si attribuiscono? Può ella contenere un marmo applicato ad un altro, se liberamente passa e penetra, per tutti e due i corpi? Può ella sostener dell'acqua o del mercurio, se penetra la sommità del vaso o del tubo, ove questi due liquidi son compresi?

L'obbiezione, non v'ha dubbio, è di momento; ma le si risponde in maniera che appaga, con dire che l'aria sottile applicata alla superficie d'un corpo, è solo in parte amMESSA ne va-

cui

* La luce.

cui ch'ella vi trova, e del resto opera sopra le parti solide che s'oppongono al suo passaggio, e che diventano tanti punti d'appoggio. Quello che in sostanza può avvenirne, si è che i corpi i più porosi sfuggono maggiormente dalla di lei azione, e che ne risulta un'adesione minore, lo che conformasi con l'Esperienza. Imperocchè di due placche di metallo, ch'io aveva preparate, per unirle insieme, come i due marmi della precedente Esperienza, n'ho pertugiata una in più luoghi, ed in più volte; ed ho osservato che l'adesione scemava, a misura che io interrompeva vieppiù la continuità della sua superficie.

Se dimandisi ora, come l'aria sottile sostenga nel vacuo un liquore sopra del suo livello non ostante la porosità del vetro, che le permette di passare per la sommità del tubo: io risponderò; che l'azione di questo fluido è perfettamente libera sulla superficie del vaso *AB*, *Fig. 21.* ma ch'ella è interrotta sulla cima dalle parti solide del vetro, lo che accresce la pressione che si fa nella parte inferiore.

E' vero che le colonne intermedie *ef*, *ef*, *ef*, che corrispondono a ciascun de' pori del vetro, sono sottoposte all'azione del fluido, e ch'essendo così tra due pressioni appresso a poco eguali, il lor proprio peso le sollecita a cadere. Ma sono ritenute dallo sfregamento e dall'aderescenza delle colonne che le attorniano e le premono, siccome elleno stesse son circondate e premute dall'aria sottile; imperocchè quest'aria, in virtù della sua fluidità, pesa in tutte le direzioni; ed il tubo è poroso in tutta la sua lunghezza, siccome lo è nella parte convessa della sua estremità.

APPLICAZIONI.

Le spiegazioni, che abbiain fin ora date del combaciamento, o dell'aderefcenza di due marmi, e della fofpensione de' liquori fopra del lor livello nel vuoto Boileano, ci additano in molto verifimil guifa le cagioni immediate della durezza e della fluidità de' corpi. Se vi ha un'aria fottile che li penetra, e che porta la fua azione al di dentro come al di fuori; fe queft'azione non cade a vuoto fopra parti folide così tenui, così poco eftefe, come fon quelle de' liquori, fi ha fondamento di credere, che quefto medefimo fluido rattenga l'uno attacco all'altro i pezzi ammaffati fotto il medefimo volume, e che l'aderefcenza che rifulta dalla fua preffione, diventa più o meno falda, fecondo la figura delle parti che fi toccano, la grandezza delle fuperficie, il più o meno di puntualità nel contatto ec.

Concepir dobbiamo, che fe vi foffe una materia, le di cui parti più femplici foffero in sì fatto modo tagliate che immediatamente s'uniffero, fenza lafciar intervallo fra effe, tutta la preffione dell'aria fottile opererebbe al di fuori di cotefto ammaffamento; bisognerebbe per fconnetterlo, impiegare una forza fuperiore al pefo di cotefto fluido ambiente; e chi fa, qual doveffe effere una cotal forza?

Ma una maffa di fimil fatta è un ente di ragione: tutti i corpi fon porofi; folamente il più ed il meno li diverfifica: i pezzi che li compongon non fon uniti che in parte, ed i vacui che reflano frammezzo, fon fuor di ogni dubbio,

bio, ripieni di que' fluidi, ne quali sono stati i corpi formati; imperocchè li diremo forse spazj assolutamente vuoti? Non già. Le concrezioni, che si fanno nell'acqua, non son elleno sempre umide internamente? E non vediam noi uscire da ogni fatta di materie, una grandissima quantità d'aria, quando cessar si fan le cagioni che ve la imprigionano? Vi è dunque dell'aria sottile in tutti i corpi, e tanto più ve n'è quanto la loro porosità è meglio proporzionata alla sottigliezza di questo fluido; imperocchè potrebbe darsi che un corpo più composto contenesse tanto o più d'aria sottile, quanto un altro corpo più poroso, se questi insieme con questo fluido, ammettessero ancora qualche altra materia più crassa, esempigrazia, l'aria o l'umido dell'atmosfera.

Più che vi ha d'aria sottile nell'intorno d'un corpo, men questo corpo è durò; perchè allora le parti solide che lo compongono, si toccano per meno di superfizie, e la pressione esterna è più sostenuta da quella che il fluido trasmette al di dentro. Quando esempigrazia la cera: sensibilmente s'ammollisce, questo avviene perchè l'aria sottile ond'ella è penetrata, dilatata dal calore, dilata similmente gli spazj ch'ell'occupa; e però che codesti spazj non possono crescere se non per l'allontanamento mutuo delle parti solide che li circondano; il contatto di queste divien più raro, la loro congiunzione meno puntuale, la loro coerenza men salda.

La dilatazione de' pori non solamente fa crescere la pressione, che l'aria sottile trasmette al di dentro de' corpi, somministrandogli una base

più larga, ma fa nascere eziandio comunicazione d' interstizj con interstizj ; uno od un altro però isolato tra le parti solide, s' apre e lascia un libero accesso al fluido che le separa ; quindi avvengono delle divisioni e delle suddivisioni, che fanno apparire la massa totale sotto diversi gradi di mollezza, fin a tanto che finalmente le parti divise, quanto lo possono essere per lo stato attuale del fluido, e non toccandosi quasi più, sono disposte a muoversi indipendentemente le une dall' altre, il che si chiama *essere liquido*.

Ma però che tutti i corpi non sono egualmente porosi, che le loro parti non hanno la medesima figura, e si toccano, e si schierano in diverse infinite maniere ; il grado altresì di durezza non è lo stesso in tutti, e non si perde con la medesima facilità. Il calore che regna ordinariamente ne' nostri climi, basta per far scorrere l' acqua ; ne abbisogna di più per render liquida la cera, e molto più ancora per mettere in fusione i metalli.

Quando i corpi sono arrivati allo stato di liquidità, le loro molecole o parti integranti conservano la lor durezza naturale, perchè sono compresse da tutte le parti, e non hanno niente al di dentro di se stesso, che s' opponga a questa pressione del fluido circumfuso.

Non pretendo per questo, che elleno sieno indivisibili, nè tampoco assolutamente inflessibili. Gli elementi che le compongono, come i due marmi lisci ed eguali, possono forse sdrucchiolare parallelamente ai loro piani, mutar figura ed anche separarsi.

Ma quello ch' io dico qui per le parti, diventa
for-

forse un'obbiezione contro la durezza totale del volume? se più laminette sdruciolano facilmente, e facilmente si separano, quando tiransi parallelamente ai loro piani, non sembra egli, che la pressione dell'aria sottile dovrebbe rendere i corpi duri solo in un senso, e relativamente ad una forza impiegata in una direzione perpendicolare al piano del contatto?


Questa obbiezione averrebbe tutta la sua forza, se si trattasse d'un corpo; che avesse sol due o tre parti solide, posate parallelamente le une sopra l'altre, ma questa supposizione non ha luogo nè men ne' più piccoli volumi di materia. Quanti pezzi al contrario non s'attribuiscono a codeste porzioncelle di materia, che più non si dividono nè per mezzo dell'arte, nè per mezzo della natura? e quante posizioni differenti non si può egli credere; che affettino? Prendiamo in esempio quell'ammassamento rozzo e grossolano, che è rappresentato nella Fig. 22. E' vero, che il pezzo *a* sdruciolerebbe con facilità nella direzione *a d*, se s'attenesse solo agli altri due pezzi *b*, *c*, ma questo movimento è perpendicolare alle superficie di *f*, e di *e*, e per separarnelo, bisogna vincere la pressione, che lo ritiene. Il pezzo *g* potrebbe parimenti moversi con facilità verso *a*, se la sua aderenza in *b* non vi si opponesse. Quindi giudicar si può di quello, che avviene nella composizione naturale de' corpi, ove il gran numero delle parti, e gli ordini differenti ch'elleno prendono, producono la durezza in tutte le fatte di direzioni.

Da questa stessa risposta nasce una difficoltà, che convien rimuovere. Se i corpi, dirà taluno,

sono duri da tutti i lati, perchè sono composti d'un gran numero di parti differentemente disposte; dovrebbe seguire, che la durezza per tutti i versi scema, a misura che si dividono i corpi, e che le più piccole masse sono più facili a dividersi che le più grandi: cosa affatto opposta alle idee che abbiamo della divisibilità de' corpi, che tanto più appar difficile, quanto più oltre è portata.

1. Non si tratta qui del maggior numero; basta un numero sufficiente di parti, e schierate in guisa, che vi sia sempre qualcuna delle loro superficie applicate perpendicolarmente alla direzione d'una forza esterna, adoperata per disfarle; e non si può addurre alcuna divisione praticata, o praticabile, che c'interdica questa supposizione; l'idea che si ha, e che si deve avere in Fisica, del numero prodigioso di parti contenute sotto il più piccol volume di materia, che possa soggiacere alle nostre prove, dee metterci al sicuro da ogni rimprovero per tal verso.

2. Quand'anche fosse vero, che i corpi infinitamente piccioli fossero composti di parti più idonee alla divisione, o perchè presentano meno di superficie alla pressione esterna che le contengono, o perchè una disposizione più semplice permette loro di sdruciolare l'una sull'altra; come potremmo noi saperlo? Noi giudichiamo della durezza de' corpi dalla difficoltà che proviamo in dividerli: secondo che ci van mancando i mezzi per operare questa divisione, eziandio s'ella fosse più facile in se stessa, cioè per parte del corpo divisibile, noi ne fermiamo altro giudizio, e codesto corpo ci sembra tanto più duro, quanto meno



no sopra di lui hanno i nostri sforzi efficace valore. Quando separiamo due marmi aderescenti, col farli sdruciolare l'un sopra l'altro, la facilità con la quale si fa questa separazione, nasce forse, perchè questi due corpi, servata la proporzione, sono meno aderenti insieme, che nol son altri corpi, picciolissimi, e similmente applicati l'uno all'altro? O non nasce ella piuttosto, perchè noi possiamo facilmente adoperarci forze, che li tirano per verso contrario? Così la durezza de' corpi che noi consideriamo come attualmente indivisibili, esser potrebbe verisimilmente eguale, e forse inferiore a quella d'una massa più grande della stessa materia, tuttochè rispetto a noi ella sia eccessiva, perchè non conosciamo alcun agente che intacar la possa.

I due stati opposti, voglio dire la solidità e la fluidità, dipendono dunque dalla medesima cagione; l'aria sotile è che fissa le parti d'una materia, quando la sua pressione esterna eccede la reazione, ch'ella fa dentro; e questo stesso fluido rende e mantiene mobili le parti, introducendosi fra esse in sufficiente quantità. Per questo senza dubbio tutte le materie: che passano da uno stato all'altro, mutan di grandezza; imperocchè, poichè un corpo solido diventa fluido, per l'introduzione d'una materia straniera, che lo penetra in maggior quantità, ed ei non ritorna alla sua prima consistenza, se non quando questa materia cessa di dilatarlo; egli è naturale e manifesto, che più di luogo egli occupa essendo liquido, che quando è solido. E questo infatti succede ordinariamente; e io faronne conoscere de' curiosissimi esempj, quando tratterò del fuoco. Co-

328 LEZIONI DI FISICA

testa è la regola generale, che ha però alcune notabili eccezioni, delle quali ragionerò altrove.

Alcune materie, che hanno dall'aria sottile la loro liquidità, la comunicano per se medesime a' corpi solidi. L'acqua, esempigrazia, ammolisce la terra; e la converte in limo; disunisce le parti del sale, del zucchero ec. Lo spirito di vino, e gli oli disciolgono le gomme, ed i bitumi; il mercurio s'amalgama col piombo, collo stagno, coll'oro e coll'argento: ma non essendo la fluidità, altro che un modo d'essere, tosto che la causa cessa, che il dissolvente s'evapora, ciò che reso aveva fluido, ritorna ordinariamente alla sua prima consistenza.

Tutti questi effetti sono altrettanti mezzi, che l'Arti han saputo volgere in lor profitto; due soli esempi io qui n'addurrò.

L'indoratura, che chiamasi d'oro *macinato*, o *spolverizzato*, è certamente la più bella e la più durevole di tutte quelle che sono in uso. Ella non è altro, che oro estremamente diviso, le di cui parti sono come incastrate ne' pori stessi del metallo; sul quale va applicato; ed ecco come ciò s'eseguisce. Mettesi una certa quantità d'oro fino nel mercurio; questi due metalli s'uniscono in tal maniera, che comunicando l'uno una parte della sua fluidità all'altro, questa mescolanza diventa come una pasta, la qual si chiama *amalgama*; s'applica, e si distende questa preparazione sul pezzo che si vuol dorare, quindi mercè l'azione del fuoco, si fa evaporar il mercurio, l'oro ch'è fisso, rimane; ed i pori del metallo dorato, che il calore ha dilatati, e che raffreddandosi si richiudono, rattengono in se, come piccioli castoni.

Roni, le particelle d'oro, che ivi son collocate.

La gomma lacca, la sandaraca, il mastice in lagrime ec. si dissolvono, e si estendono nello spirito di vino; il Karabe, o succino, e la gomma *copal* s'ammoliscono e si liquefanno nell'olio di lino, e si estendon poscia nell'olio grasso, e nello spirito di trementina. Tutte queste dissoluzioni, che chiamansi *vernici*, s'applicano sul legno, od altrove; e quando il dissolvente è svaporato, le gomme ch'egli avea rese liquide, ripigliano la loro durizie, e la loro lucentezza.

Da questi esempi si vede pertanto, che la liquidità non muta niente per se stessa nella natura de' corpi. Se la lor coerenza è tale, che ceder non possa fuor che ad una azione violenta per parte del dissolvente, può farsi ch'egli tolga loro qualche parte della sostanza, ma questi è un caso, e non una conseguenza necessaria della liquidità in generale.

Vi son de' casi, ne' quali si vede cessare o scemare la liquidità, senza che la causa, che l'avea prodotta, appaja cessar dalla sua azione. Due liquori mescolati insieme, prendono tutt' in un tratto una consistenza più o men grande, tuttochè non vi si osservi alcun grado di raffreddamento sensibile; quest' effetto, che chiamasi comunemente *coagulum*, può spiegarsi, supponendo che le parti son di tali figure, che s'intralciano reciprocamente, e fan cessare fra esse quella mobilità, in che consiste principalmente lo stato di liquore. Il più bel *coagulo*, che a me sia noto, è quello che si fa con l'olio di calce, e l'olio di tartaro per deliquio; quando si agita un poco questa mistura con una spazzola, ella si converte in

una massa bianca, a cui si fa prender la forma che si vuole, e che s'indura come la cera. Si coagula pure uno spirito volatile urinoso molto sottile, con lo spirito di vino ben rettificato; il bianco dell'uovo, con lo spirito di sale; il sangue con l'acqua vita. Quest'ultima esperienza insegna, di qual'importanza sia; l'usar sobriamente i liquori spiritosi, poichè eglino sono capaci d'alterare la fluidità del sangue.

Per quanto verisimile possa parere la spiegazione della durezza e della fluidità de' corpi, fondata sull'azione d'un fluido quasi generalmente ammesso, tuttocchè sotto nomi differenti: dissimular non devo tuttavia, che molti Fisici non ne convengono, e gliene sostituiscono un'altra. L'attrazione reciproca delle particelle di materia, dicono, è grandissima, quando elleno si toccano; ma fuori del punto del contatto talmente ella decresce, che ad una sensibile, ma picciolissima distanza, si converte in forza repulsiva. (*) I corpi sono solidi, finchè la virtù attrattiva delle loro parti è più forte che la virtù repulsiva, che il calore d'ordinario dà loro: ma s'ammoliscono a misura, che la virtù repulsiva diventa più forte, di maniera che quando questa forza la vince sull'attrazione, non solo la massa diventa liquore, ma si cangia bene spesso in un fluido che s'evapora (a).

Il Gravesande, e quelli che a par con esso puntualmente seguitano le idee Newtoniane, non danno tai leggi, se non se come fenomeni;

Hoc

(*) s' Gravesand. *Phys. Elem. Mathem.* p. 18. ed 1742.

(a) *ibid.* pag. 662.

Hoc nomine phenomenon, non causam designamus †: Non fanno difficoltà alcuna di confessare, che simili effetti possono provenire da qualche impulsione; *etsi forte hoc per impulsum fiat **. Ne dobbiam noi dubitare, ch'eglino non ricevano la pressione dell'aria sottile ed i suoi effetti, almeno come un'ipotesi probabilissima. Le pretensioni de' Cartesiani a nulla di più si estendono; e però si può dire che eglino sono appresso a poco d'accordo con cotesti primi difensori delle attrazioni.

In quanto a coloro che stimano le virtù attrattive e repulsive, come tanti principj, i quali non hanno cagion fisica; eglino non pretendono senza dubbio, che ciò che asseriscono sia una cosa dimostrata: in fatti non è che una supposizione, cui appoggiano a sole probabilità, e verisimiglianze. Se fosse vero, che non si avessero delle ragioni più forti, per ammettere l'aria sottile, pur ancor direi, che messa a rincontro un'ipotesi d'un'altra ipotesi, sembrane a me più sicuro quel raziocinio che ha la base sopra principj meccanici, e intelligibile, che quello il quale s'appoggia a novitadi, le quali non presentansi all'intelletto sotto idee familiari.

Del resto il principio delle attrazioni, nel divisamento particolare de' fenomeni, ha poi egli così felici applicazioni, come alcun potrebbe immaginarselo? Molto egli ha perduto della sua semplicità, nel passar dalle mani del Sig. Newton in quelle de' suoi discepoli. Ne' moti celesti, operando cotesta forza in ragion diretta delle masse, e in ragione inversa del quadrato della di-

stan-

† Ibidem p. 18. * ibid.

332 LEZIONI DI FISICA

stanza, basta a tutto, e somministra ragioni per
 ispiegare tutte quelle grandi rivoluzioni, che a-
 nimano l'universo: il progetto è bellissimo. Ma
 quando si tratta de' fenomeni sullunari, di que-
 gli effetti, che vediam più da presso, e l'esame
 de' quali ci è più facile ed alla mano, la virtù
 attrattiva è un Proteo, che muta spesso di for-
 ma. Le rupi e le montagne non danno alcun se-
 gno sensibile d'attrazione. „ Perchè, dicono i
 „ Neutoniani, coteste picciole attrazioni partico-
 „ lari, son come assorbite da quella del globo ter-
 „ restre, che è infinitamente più grande. „. Pure
 ne vien data per un effetto della virtù attrattiva,
 la schiuma, che ondeggia su d' una tazza di
 caffè, e che con velocità sensibilissima portasi
 verso gli orli del vaso. „ Quanto più le parti d'
 „ un corpo si toccano, tanto più s'attraگو-
 „ no. „. Perchè dunque, allorchè maggiormente
 si ravvicinano col comprimerle, tendon elleno
 per lo più a rimetterfi come erano avanti la com-
 pressione, (intendo una compressione eguale da
 ogni parte, che cambia sol la grandezza, e non
 già la figura). „ Perchè dopod' essere tirate quan-
 „ to esserlo possono, si rispingono vicendevol-
 „ mente. „. Perchè (dimando io) i vapori di-
 latati hanno tanta forza? „ La ragione si è, ris-
 „ pondono, perchè le parti che si attraevano, sotto
 „ lo stato di liquore, si rispingono con violenza
 „ sotto quel di vapori. „. Poichè la virtù attrat-
 tiva è una forza, compartita a tutto quello che
 è materia, perchè certi corpi, come l'acqua e
 l'olio, non possono insieme unirsi? „ Perchè ris-
 „ pondono, vi ha delle materie, le quali si rispin-
 „ gono naturalmente, &c.

E' egli

S P E R I M E N T A L E . 333

E' egli poi questo il linguaggio d'una buona Fisica? e non abbiám ragion di temere, che accostumandovici, è mettendo così le attrazioni e le ripulsioni ad ogni uso diverso, giungiamo finalmente a lasciar da canto quegli esami e quelle ricerche, che sono cotanto necessarie a' progressi delle nostre cognizioni; ed in cotal guisa chiudiam l'adito a parecchie scoperte, che di così fatti esami farebbono il frutto.

Fine del Tomo Secondo.



TA-

TAVOLA DELLE MATERIE

contenute in questo secondo Volume.

P PRIMA SEZIONE. Del moto composto, pag. 5
Legge del moto composto. 6

PRIMA ESPER. che fa vedere, che un Corpo, il quale prova nel medesimo tempo l'azione di due potenze opposte direttamente, ubbidisce alla più forte, secondo l'eccesso della sua forza. 11

II. ESP. che prova che un mobile il quale ubbidisce a due forze, che non sono direttamente opposte, prende una direzione media tra l'una e l'altra. 13

III. ESP. la qual prova, che il medesimo effetto succede quando le due forze non hanno un'azione continua. 17

IV. ESP. per provare, che il moto composto falli in una linea curva quando le potenze componenti mutano di continuo ordine fra esse. 22

V. ESPER. per confermare la Proposizione precedente. 26

SECONDA SEZ. Delle forze centrali. 30

I. ESP. per provare, che il moto circolare fa nascere la Forza centrifuga, e che questa Forza cresce a proporzione della velocità. 34

II. Fsp. che fa vedere che la Forza centrifuga ha luogo ne' Fluidi che si muovono circolarmente. 36

III. ESP. con la quale si vede, che la Forza centrifuga de' Fluidi cresce a proporzione della loro densità. 43

IV. ESP. immaginata dal Cartesio, per corroborare la sua 43

la sua ipotesi sopra la cagion Fisica della Gravità. 48

V. ESP. che prova, che la Forza centrifuga è come la massa moltiplicata per la velocità del mobile che circola. 52

VI. ESP. nella quale si vede un mobile descrivere una linea spirale, pel cambiamento d'ordine o relazione delle Forze centrali. 68

VII. ESP. nella quale si vede un mobile descrivere un' Ellissi, per le differenti relazioni, che fra loro prendono le Forze centripetae centrifuga, nel tempo della sua risoluzione. 70

LEZIONE SESTA.

Sopra la Gravità, o sia il peso de' Corpi.

PRIMA SEZIONE. De' Fenomeni, ne quali la Gravità adopera sola sopra il Mobile. 75

I. ESP. con la quale si vede, che non v'è alcun corpo assolutamente leggiero 77

II. ESP. per provare che la Gravità è eguale in tutti i corpi. 92

III. ESP. Effetto singolare dell' Acqua nel vuoto. 97

IV. ESP. che prova, che i Corpi cadono con un moto accelerato. 111

V. ESP. che prova, che l'accelerazione de' corpi gravi da loro una velocità proporzionale all'altezza della caduta. 112

VI. ESP. per provare, che l'accelerazione della caduta de' corpi gravi, si fa secondo i numeri impari 1, 3, 5, 7, ec. 114

SECONDA SEZIONE. De' Fenomeni, ne quali il moto è composto della Gravità, e di qualche altra potenza. 112

ARTIC. I. Della discesa de' corpi per piani inclinati. 125

I. ESP.

I. ESP. con la quale si prova, che il tempo della discesa per un piano inclinato, ha quella proporzione col tempo della discesa libera e verticale, che ha la lunghezza del piano colla sua altezza. 128

II. ESP. con la quale si vede, che un mobile, il quale cade per la corda d'un circolo; qualunque ella sia, mette tanto tempo, quanto per discendere per il diametro verticale del medesimo circolo. 130

III. ESP. che fa vedere, che un corpo grave cadendo, acquista tutta la velocità che gli fa di mestieri per rimontare così alto come il luogo donde è partito. 136

IV. ESP. per far conoscere la relazione che vi è tra il tempo della vibrazione d'un Pendulo, e la lunghezza di questo medesimo Pendulo. 141

ARTIC. II. Del moto de' corpi cagionato dalla Gravità, e da una Forza attiva ed uniforme. 150

V. ESP. per far vedere, che la Forza progettile operando con la gravità sopra un medesimo mobile, gli fa descrivere una curva parabolica. 153

LEZIONE SETTIMA.

Sopra l'Idrostatica.

PRIMA SEZIONE. Della gravità e dell'equilibrio de' Liquori, le cui parti sono omogenee. 160

PRIMA PROPOSIZ. I liquori pesano non solamente quanto alla loro massa totale; ma ancora in se stessi, cioè quanto alle parti che li compongono. ibid.

I. ESP. che prova la Proposizion precedente. 161

SECONDA PROPOSIZ. Le parti d'un medesimo liquore esercitano la loro gravità, indipendentemente le une dalle altre. 164

II. ESP.

II. ESP. che serve di prova a questa Proposizione. 165

TERZA PROPOS. I Liquori esercitano la loro gravità per ogni sorta di verso. 170

III. ESP. che lo prova. 172

IV. ESPER. che conferma la medesima Proposizione. 174

QUARTA PROPOSIZ. Le parti d' un medesimo Liquore sono in equilibrio tra esse, così in un vaso solo, come in molti che insieme comunicano. 177

V. ESP. del Sifone rivoltato. 179

VI. ESP. de' vasi che comunicano. 180

QUINTA PROPOSIZ. I Liquori esercitano la loro gravità sì perpendicolare come laterale, non in ragione della loro quantità, ma in ragione dell' altezza al di sopra del piano orizzontale, e della larghezza della base, che s' oppone alla loro caduta. 184

VII. ESP. che prova questa Proposizione in tutte le sue parti. 185

SECONDA SEZ. Della Gravità, e dell' Equilibrio di più liquori, le cui densità sono differenti. 195

PRIMA PROPOSIZ. La differenza del peso, o della densità, basta per separare le parti di due liquori, che si sono mescolati insieme, se altre ragioni più forti non impediscono quest' effetto. 196

I. ESP. dello Staccia-vino. 197

II. ESP. del tubo ripieno di differenti liquori, che ripigliano i luoghi loro quando si sono meschiati. 198

SECONDA PROPOSIZ. Più Liquori, o più Fluidi, quantunque di diverse nature, pesano gli uni sopra gli altri, in ragione della loro densità, e della loro altezza. 203

TERZA PROPOSIZ. Due Liquori di densità differenti sono in equilibrio, quando avendo la medesima base, le loro altezze perpendicolari all'orizzonte, sono in ragione reciproca delle loro densità o gravità specifiche. 203

III. ESP. del Sifone rivoltato, nel quale si paragona una colonna di Mercurio con una colonna d'acqua. ibid.

QUARTA PROPOSIZ. L'aria è un fluido pesante, che esercita la sua pressione per tutti i verbi, a modo de' liquori. 207

IV. ESP. col Tubo di Torricelli. ibid.

V. ESP. col Tubo di M. Pascal. Storia del Barometro, ed il suo uso. 212. e seg.

VI. ESP. che prova, che il peso dell' Aria è la cagion dell' ascender che fanno i liquori ne' tubi, ne quali si fa il vuoto. 217

VII. ESPER. che fa vedere, che il peso dell' aria fa salire i Liquori tanto meno alto, quanto eglino son più densi. 219

VIII. ESP. che prova, che le trombe aspiranti adoperano solo in virtù del peso dell' atmosfera. 222

IX. ESP. che prova la pression laterale dell' Aria. 225

X. ESP. con la quale si fa vedere, che l' Aria esercita la sua pressione da giù in su. 227

XI. ESP. nella quale si mostra e si spiega l'effetto de' Sifoni. 229

XII. ESP. che conferma la spiegazione de' Sifoni, e che mostra un getto d' acqua, al di sopra della sua sorgente. 231

LEZIONE OTTAVA.

Si continua a ragionare dell' Idrostatica.

TERZA SEZ. Della gravità e dell' equilibrio de' solidi

solidi immersi ne' liquori. 235

PRIMA PROPOSIZ. *Un Corpo solido intieramente immerso, è compresso da tutti i lati dal liquore che l'attornia, e la pressione ch'egli prova è tanto maggiore, quanto il Liquore ha più di densità, e quanto egli è più profondamente immerso.* 236

I. ESP. *che prova questa Proposizione in tutte le sue parti.* 237

SECONDA PROPOSIZ. *Se il Corpo immerso è più pesante che il volume di liquore ch'egli ha smesso la sua gravità rispettiva lo fa cadere al fondo del vase, se ha libertà d'ubbidirgli.* 243

II. ESP. *che serve di prova a questa Proposiz. ibid.*
Consequenza di questa Proposizione. 246

III. ESP. *della Bilancia nel vuoto.* 247

TERZA PROPOSIZ. *Quello che un solido immerso perde del suo peso, è eguale a quello del volume di liquore, da se sospinto.* 248

IV. ESP. *che prova questa Proposizione.* 249

Prima Conseg. di questa Proposizione. 250

VI. ESP. *che conferma questa prima Conseg. ibid.*

Seconda Conseguenza. 252

VI. ESP. *che la conferma.* ibid.

Terza Conseguenza. 254

VII. ESP. *che la conferma.* ibid.

VIII. ESP. *che prova di nuovo lo stesso.* 255

QUARTA PROPOSIZ. *Se il corpo solido è meno pesante, che un pari volume del liquore, nel quale egli è immerso galleggia in parte: quello che resta immerso, misura una quantità di liquore, che pesa quanto il corpo intero.* 263

IX. ESP. *che prova questa Proposizione.* 264

Consequenze di questa Proposizione. 265

X. ESP. *Effetti e spiegazione dell' Arcometro.* 265

Del-

<i>Della Bilancia idrostatica, e de' suoi usi.</i>	268
<i>Primo uso conoscere la gravità specifica d'un liquore.</i>	269
<i>Secondo uso, paragonare le gravità specifiche di due liquori.</i>	271
<i>Terzo uso, paragonare le gravità specifiche di due corpi solidi.</i>	ibid.
<i>Quarto uso, paragonare la gravità specifica d'un corpo solido con quella d'un liquore.</i>	272
<i>Osservazioni sopra l' Arcometro; o Pesa liquori.</i>	273
<i>Tavola alfabetica delle materie più note ec.</i>	277
<i>APPENDICE intorno a' Tubi capillari ec.</i>	280
<i>I. ESP. nella quale si vede la prima proprietà de' Tubi capillari.</i>	282
<i>II. ESP. che dà a conoscere la seconda proprietà de' Tubi capillari.</i>	ibid.
<i>III. ESP. ove si vede la terza proprietà.</i>	283
<i>IV. ESP. che mostra la quarta proprietà.</i>	284
<i>Diverse spiegazioni di questi effetti.</i>	289
<i>ARTIC. II. Sopra le cagioni della Fluidità e della Durezza de' Corpi.</i>	310
<i>PROPOSIZ. Più corpi possono attaccarsi insieme mercè la pressione d'un fluido che li copre, o che li attornia da tutte le parti.</i>	313
<i>I. ESP. che serve di prova a questa Proposiz.</i>	ibid.
<i>II. ESP. che prova di nuovo questa medesima Proposizione, e che apre la strada a molte altre, sopra le quali si fonda la spiegazione della fluidità e della durezza de' corpi.</i>	315

Fine della Tavola delle Materie.



056-0056532943



